



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



H.N. 991

H.N. 991



EEK GENT







for the translation of the

FLORAE MEGAPOLITANAE  
**PRODROMUS**

EXHIBENS

PLANTAS

DUCATUS MEGAPOLITANO-SUERINENSIS

SPONTANEAS.

MAXIME

SECUNDUM SYSTEMA LINNEANO.

THUNBERGIANUM DIGESTAS.

---

AUCTORE

IOACHIM CHRISTIAN TIMM.

---

LIPSIAE,

APUD HEREDES I. G. MULLERI

MDCCCXXXVIII.



10 11 12 13 14

V I R O  
CELEBERRIMO  
EXCELLENTISSIMO, EXPERIENTISSIMO  
ET DE SCIENTIA BOTANICA  
MAXIME MERITO  
IOANNI HEDWIGIO  
MEDICINAE DOCTORI  
PROFESSORI P. E. REGIAE SOCIETATIS  
SCIENTIARUM LONDINENSIS MEMBRO;  
HONORARIOQUE OECONOMICAE ELECT.  
SAX. ET NAT. SCRUT. BEROLI-  
NENSIIUM.

FAUTORI ET AMICO  
MAXIME COLENDO



# V I R C E L E B E R R I M E

**Q**uamquam ardui negotii res sit Tu-  
um inventum genuinorum Organo-  
rum sexualium in plantis, quae Linnacus  
cryptogamicarum titulo complexus est;  
tanti tamen momenti vere inter Botanicae  
scrutatores evasit, ut in hac scientiarum  
alea omnino Epocham constituat. Excita-  
tus inde, indagavi illa maxima cum volu-  
ptate,

ptate, et praesertim penes Muscos in mea regione degentes, conquisitosque secundum Methodum TUAM examinandi, et in ordinem redigendi studio incubui praedilecto.

Silentio vt praeteream TUA erga me Officia permulta, quae, sepositis gravioribus negotiis, mihi quavis data occasione, quam amicissime praestitisti; potius adducam, quod mea conamina suffulcire nunquam defueris factumque et inde sit, ut hoc opusculum nunc sub praeleo sudare potuerit.

Certe TUORUM in me sic collatorum officiorum plane immemor, ingratusque

que merito viderer, si intermitterem, **TIBI**  
pro hac benevolentia gratum animum pu-  
blice significare ac declarare. Atque inde  
cum profectum sit, quod hunc **Prödromum**  
**Florae megapolitanae TUO** nomine con-  
decorem, **TIBI**que dedicem, hoc inquam  
aequi bonique **TE** accepturum fore certissi-  
me confido.

Ceterum **Summum Numen** supplex  
praecor, ut **TE** salvum ac incolumem ad  
ultimos aetatis humanae terminos servet,  
quo de indefessis **TUIS** conatibus, fidissi-  
misque observationibus, tanto uberiores  
fructus in genuinam praeprimis rei herbariae,  
eiusque intimiorem cognitionem, quae fere  
adhuc deficere videtur, redundant. **Mihi**



vero ea singulari benevolentia, qua hactum  
ingenue amplexus es, in posterum favere ut  
pergas, enixe rogo atque obtestor, me  
nunquam defuturum.

**PRAECLARI  
TUI NOMINIS**

cultorem ingenuum

**I. C. TIMM**



## PRAEFAMEN.

**P**lantas in solo Saxoniae inferioris indigenas non eodem studio, quo eae, quae in ceteris Germaniae provinciis nascuntur, exploratas esse, a nonnullis rei herbariae scriptoribus iam dudum notatum est. Hoc studium praeter ceteris a civibus nostris oscitantius neglectum, vel inde satis superque liquet, quod ne unicuique quidem publicum documentum industriae proflaret, quod rem herbariam Patriae secundum botanices praecepta illustratam daret.

Hoc igitur vitio quo Patriam liberarem, simulque pro ingenii mei modulo studium rei herbariae adiuuarem, indicem plantarum, in terris Megapolitano-Suerinensibus, praesertim parte earum orientali, sponte crescentium, multorum annorum perpetuo ac indefesso studio indagatarum, collectarum, atque ad suos quosque locos revocatarum, concinnare institui, eundemque nunc typis excudere cura-

vi. Quo in negotio ego quidem mihi hanc legem praescripsi; nullas alias Plantas tradere, nisi eas, quas ipse oculis meis vidi, manu mea decerpsi, quarumque de constantia, omissis dubiis, persuasus sum. Atque hanc sanctissime a me observatam esse, quovis tempore vindicare possum ipsissimis exemplaribus siccatis, e loculis meis depromendis, quodsi quis unquam hac de re in dubitationem veniret. Nequaquam tamen ego id mihi sumo, ut crederem, me omne punctum tulisse, omnemque plantarum copiam, qua Natura propitia agrum megapolitanum instruxit, excussisse; quin potius lubens fateor, imo promitto, si qui sint, qui ibidem falcem immittere cupiant, audeant, ingentem adhuc, Muscorum frondosorum familiam si exceperis, messem petituros.

Et quod praeprimis graminum familiam concernit; hanc quoad maximam partem nondum satis exploratam esse existimo. Quae labes rei herbariae inde evenisse videtur, quod ista vegetantia, priusquam florem emittere valeant, a pecore depascuntur, vel foeni colligendi causa falce succiduntur messoria. Praeterea,  
cum

cum hodie ne minimus quidem agellus, culturae expers reperiatur, inde etiam factum esse arbitror, ut et aliae quam plures plantae notitiam nostram efugerint.

Nihilominus tamen provincia nostra, quoad plantarum copiam haud aliis, iisque regionibus, quae nec montibus nec locis desertis horrent, inferior reputanda est; quin imo eius indolis inibi reperiuntur plantae indigenae, quae in ceteris Germaniae tractibus raro obveniunt, quas hic loci habitare nemo facile crederet. Suertia perennis e. g. *Pedicularis Sceptum Carolinum* ac nova quaedam muscorum frondosorum, plantarumque cryptogamicarum genera et species, studio meo nuper reclusa, ita comparata sunt, ut rem herbariam Germaniae, si huius quidem ambitus ex celeberrimi ROTHII libro, *Tentamen florae germanicae* inscripto, metiendus est, egregie amplificare et exornare possent.

Libellus interea, quem nunc publici iuris facio, non ita celeriter conscriptus, sed opus multorum annorum est, quod colligendis et examinandis plantis insumsi. Quarum e numero cohortem Muscorum tanta assiduitate ac  
cir-

circumspectione inquisivi, quanta id quidem vix a quodam in ulla alia Germaniae provincia factum est. Labor autem, quo in omni hoc opere concinnando defunctus sum, eo difficilior mihi successit, quo minus aliquo duce, viam signante, aut aliquo adminiculo uti\*), sed proprio Marte hoc in negotio mihi eritendum fuerit. Nec opibus denique in persequendo cepto parcere licuit. Namque cum urbem nostram nulla Bibliotheca publica ornaret, grandi pecunia adparatum librorum, rem herbariam illustrantium, comparare coactus fui; cui accedit, quod propter plantas marinas recognoscendas etiam ad maris baltici littora invisenda, propriis sumptibus plus una vice iter facere oportuerim.

Omnem tamen hanc operam, omnes hos sumptus, alacri animo lubenter suscepi, publicae utilitatis causa promittoque insuper additam-

\*) Ne tamen a veritate plenarie aberrem, non praetereundum esse duxo: excursionibus meis me optimo cum successu quendam mercenarium, cui nomen Hacker, et scribendi et libros legendi botanicos insulam, adhibuisse, qui ad quaerendas plantas agros paludesque oculo armato perreptans, promptam sibi acquisivit facultatem, nova a iam detectis discernendi. Cui igitur nonnulla minutissima cryprogamica debeo.

tamenta, si praesens opella probaretur, lecti-  
pletiora. Id quod eo certius spondere valeo,  
quo Vir admodum venerabilis, ingenio scriptis-  
que clarus TODIUS, sacri ordinis in Dioecesi  
Wittemburgensi Antistes, maiorem in Ducatus  
nostri parte occidentali conquistam plantarum  
indigenarum copiam in oculis suis, olim in  
usus publicos referendis, repositam servat, unde  
tunc accessiones, quas fors mihi in posterum of-  
feret, augere licebit.

Quod ordinem in collocandis his meis stir-  
pibus attinet, servavi quidem illum, secundum  
genera systematis sexualis incliti LINNAEI, et  
celeberrimo REICHARDO annis 1778 et 1779  
Francofurti ad Moenum in lucem emissis. Ne-  
que tamen plane ad amissim. Siquidem *Gy-  
mandriae*, *Monoeciae*, *Dioeciae* et *Polygamiae* Clas-  
ses, utpote exigui, aut fere nullius usus, ad ex-  
emplum Ill. THUNBERGII praeferre et ad classes  
suas pro numero ac dispositione partium sexua-  
lium reducere placuit. Et hoc quidem consilio,  
praeter unum Anthoxanthum, cuncta gramina,  
graminibusque perquam adfinia confluxissent  
in classe tertia: malui tamen singularem hanc, a  
Natura

Natura ipsa quasi conditam familiam, Ludvigiana methodo, iunctim tradere, ne vel unica species inde diyelleretur.

Subinde Muscos frondosos ad Cl. HEDWIGII, qui nomen suum immortalitati scriptis et inventis iam dudum commendavit, Methodum, utpote firmum fundamentum, presso secutus pede, disposui; quandoquidem Is ad penitiorem Muscorum inspectionem viam aperuerit, omnium iudicio tutissimam. Horum pedissequi sunt hepatici; Iungermanniae nimirum, Marchantiae, Anthocerotis, nec non Blasiae et Ricciae genera.

Fungos, quod attinet, opus quidem quam maxime fuisset, ut nova ratione in sua genera distribuerentur, cum procul dubio eorum plura sint ac quidem a LINNAEO constituta reperiuntur. Sed ingenue fateor, me huic negotio plane imparem fuisse, quandoquidem subsidiis, quorum ope id effici debuisset, penitus destituerer. Tum et maxime ideo, quod artem figuris describendi ac pingendi, omnino non calleam, qua is, qui in Fungis explorandis et disponendis versatur, minime carere potest.

Vita

Vita enim his, dum sese oculis nostris manifestant, et brevis est et conservationem siccam ut plurimum omnino respuunt.

Quanquam igitur probe intellexerim, Fungorum genera minus rite esse disposita, nec omnes eorum species characteri generis, cui subscriptae sunt, exacte respondere; consulto tamen parum deflexia numero illorum, a LINNAEO stabilita; additis solummodo *Sphaeriis* et *Osiosporis* Cl. HEDWIGII. Id autem vel ideo praetermittendum duxi, quod clarissimus TONDIUS Fungos, quos patriae solum praefert, felici multorum annorum studio ac industria exploravit, et singulari libro propediem typis evulgando, uberiori descriptione illustraturus est. Nihilominus tamen adfirmare audeo, recensitos in libello meo Fungos, ita suis notis descriptos ac insignitos esse, ut eos quilibet certo dignoscere possit, qui illo in his plantis examinandis uti forsan velit.

Loca natalia Plantarum ea, qua par est, fide indicavi; ita tamen, ut vulgatoribus illum, quem in agro Malchinenti occupant, brevitatis studio, generalius, rarioribus vero specialissimum



sum, eundem scilicet ipsum de quo eas manu mea decerpsi, diligenter subscriberem. Addidi etiam tempus florendi, cui et usus medicus, si non latebat, accessit.

In Synonymis adiciendis parcus omnino fui, cum ista Floram provincialem non augeant, sed onerent, praeterea etiam in *Prodromo* eius, iisdem maxime incongruus fit locus.

Sunt haec, quae in libellum meum praefari volui, quo Lector sciret, vnde natales ducat opusculum, et quonam conscriptum sit consilio. Reliquum nihil magis in votis habeo, quam, ut conamina mea, qualiacunque hoc scripto exhibita, Patriae commodum augeant, ac civibus suis profint, hique illis ad rerum naturalium, earum imprimis, quas solum provinciae nostrae fovet, acriorem perscrutationem incitarentur.

Dabam *Malchini* IX. ante Calendas Octobris  
 c1010cclxxxviii.

---

CLAS.

---

CLASSIS I.  
MONANDRIA  
MONOGYNIA.

A. FLORE HERMAPHRODITO.

APHANES

*Cal.* 1 - phyllus. 4 - dentatus *Cor.* o.

1. APHANES *Linn. Syst.* 1. p. 351.

*aruenfis.*

In agnis arenosis; hinter dem Haynholze an  
der gelowfschen Scheide. Aestate.

SALICORNIA L. G. 10.

*Cal.* 1 - phyllus. *Cor.* o. *Stigm.* bifidum.

2. SALICORNIA patula, articulis apice com- herbacea  
pressis, emarginato-bifidis *Linn. Syst.* 1.  
p. 8.

Ad littora maris baltici; praesertim bey War-  
nemünde.

HIPPURIS L. G. 11.

*Cal.* o. *Cor.* o. *Stigma* simplex.

3. HIPURIS foliis octonis subulatis *Linn. Suppl.* vulgaris  
81.

In fossis, bey dem Schiefshause vor dem Müh-  
lenthor et alibi copiose.

B. FLORE MONOIEO,

CHARA L. G. 1127.

♂ *Cal.* o. *Cor.* o. *Anth.* germini subiecta.

A

♀ *Cal.*

♀ *Cal.* 4 - phyllus. *Cor.* o. *Stigm.* 5 - fidum.  
*Sem.* 1.

- vulgaris* 4. CHARA caulibus laevibus, foliis interne dentatis. *Linn. Syst.* 4. p. 90.  
In fossis, aquis stagnantibus vbique; *bey Malchin in dem Torfgraben* copiose. *Iunio.*
- bispida* 5. CHARA aculeis caulinis capillaribus, confertis. *Linn. Syst.* 4. p. 90.  
*Iisdem locis.* *Iunio.*
- flexilis* 6. CHARA caulium articulis inermibus diaphanis, superne latioribus *Linn. Syst.* 4. p. 90.  
In fossis, aquis stagnantibus. *Bey Malchin im Graben am Pfort.* *Majo.*

ZANNICHELLIA L. G. 1124.

♂ *Cal.* o. *Cor.* o.

♀ *Cal.* 1 - phyllus. *Cor.* o. *Pist.* circa 4  
*Sen.* 4.

- palustris* 7. ZANNICHELLIA *Linn. Syst.* 4. p. 88.  
In lacubus: *bey Warnemünde in den klaren Pfützen rechts vom Wege.* *Julio.*

### DIGYNIA

CALLITRICHE L. G. 13.

*Cal.* o. *Cor.* 2 - petala. *Caps.* 2 - locularis.

- verna* 8. CALLITRICHE foliis superioribus ovalibus, floribus androgynis *Linn. Syst.* 1. p. 10.  
β. Foliis omnibus lanceolato - ouatis,  
Habitat in fossis *vor dem Steinthor am Pfort*; β *am Bornberge.*

CLAS.

**CLASSIS II.**  
**D I A N D R I A**  
**MONOGYNIA.**

**A. FLORE HERMAPHRODITO.**

*a. Flores inferi 1-petali regulares.*

LIGVSTRUM L. G. 18.

*Cor.* 4 - fida. *Anth.* longitudine fere corollae. *Bac.* 4 - sperma.

9. LIGVSTRUM Linn. *Syst.* 1. p. 18.

*vulgare*

In dumetis bey *Bafedow.*

*b. Flores inferi monopetali irregulares.*

VERONICA L. G. 26.

*Cal.* 4 - partitus. *Cor.* limbo 4 - partito, lucinia infima angustiore *Caps.* 2 - locularis, cordata.

\* *Spicatae.*

10. VERONICA spica terminali, foliis oppositis crenatis obtusis, caule adscendente simplicissimo. *Linn. Syst.* 1. p. 25.

In campis frequens.

11. VERONICA spicis lateralibus pedunculatis, *officinalis*: foliis oppositis, caule procumbente *Linn. Syst.* 1. p. 26.

In sylvis vbique. Junio, Julio. *Officinis*  
Veronicae herba.

A 2

\*\* Ra-

\*\* *Racemosae.*

- Serpyllifolia.* 12. VERONICA racemo terminali subspectato, foliis ovatis, glabris crenatis. *Linn. Syst.* 1. p. 39.

In pratis, pascuis frequens.

- Beccabunga.* 13. VERONICA racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule reperto. *Linn. Syst.* 1. p. 30.

In fossis copiose. Junio, Julio. *Officinis* Beccabungae herba.

- Anagallis aquatica.* 14. VERONICA racemis lateralibus, foliis lanceolatis, serratis; caule erecto. *Linn. Syst.* 1. p. 30.

In fossis et riuiis frequens.

- Scutellata.* 15. VERONICA racemis lateralibus alternis, pediculis pendulis, foliis linearibus rarius denticulatis. *Linn. Syst.* 1. p. 30.

In inundatis; *bey dem Schiefshaufe vor dem Mühlenthor bey Malchin.* Julio.

- Teucrium.* 16. VERONICA racemis lateralibus longissimis, foliis ovatis, rugosis, dentatis, obtusiusculis; caule erecto. *Linn. Syst.* 1. p. 31.

In nemorosis. *Auf dem Walle bey Malchin,* et alibi frequens. Junio. *Officinis* Veronicae Teucrii herba.

- Chamaedrys.* 17. VERONICA racemis lateralibus, foliis ovato — sessilibus; rugosis, dentatis; caule bifariam piloso. *Linn. Syst.* 1. p. 30.

*In den Tannen bey Bafedow.* Majo.

\*\*\* *Pe.*

\*\*\* *Pedunculis unifloris.*

18. VERONICA floribus solitariis; foliis cor- *agrestis*  
 datis incis, pedunculo brevioribus. *Linn.*

*Syst.* 1. p. 36.

In arvis frequens. Aprili.

19. VERONICA floribus solitariis; foliis corda- *arvensis*  
 tis incis, pedunculo longioribus. *Linn.*

*Syst.* 1. p. 36.

In hortis, arvis passim. Aprili.

20. VERONICA floribus solitariis; foliis corda- *hederifolia*  
 tis, planis, quinquelobis. *Linn. Syst.* 1.

p. 36.

In agris cultis copiose. Aprili.

21. VERONICA floribus solitariis; foliis digi- *triphyllis*  
 tato-partitis; pedunculis calyce longiori-  
 bus. *Linn. Syst.* 1. p. 37.

In agris copiose. Aprili.

22. VERONICA floribus solitariis; foliis digita- *verna*  
 to-partitis; pedunculis calyce brevioribus.

*Linn. Syst.* 1. p. 37.

In apricis: *an der Stadtmauer bey Malchin et*  
*alibi.* Majo.

GRATIOLA L. G. 30.

*Cal.* 5 - partitus. *Cor.* limbo 4 - partito,  
 irregulari. *Stam.* 4; 2. sterilia. *Caps.*  
 2 - locularis, ovata.

23. GRATIOLA foliis lanceolatis, serratis; flo- *officinalis*  
 ribus pedunculatis. *Linn. Syst.* 1. p. 47.

In pratis *bey dem Dorfe Schlage im Eller-*  
*bruch.* Julio. *Officinis.* Gratiolae herba.

## PINGVICULA L. G. 33.

*Cor.* ringens, calcarata. *Caps.* 1 - locularis.

*vulgaris* 24. PINGVICULA nectario cylindraceo, longitudine petali. *Linn. Syst.* 1. p. 50.

In vlginosis: am Damm hinter der Zugbrücke.  
Aprili.

## VTRICVLARIA L. G. 34.

*Cal.* 2 - phyllus. *Cor.* ringens, calcarata.

*Caps.* vnilocularis.

*vulgaris* 25. VTRICVLARIA nectario conico, scapo paucifloro. *Linn. Syst.* 1. p. 51.

In stagnis bey der gültzer Ziegeley.

c. *Flores inferi, monopetali irregulares; fructus gymnospermi.*

## VERBENA L. G. 35.

*Cal.* 5 - dentatus, denticulo superiore intermedio truncato. *Cor.* subaequalis curva, limbo semi 5 - fido; *Stam.* saepe 4.

*officinalis* 26. VERBENA tetrandra, spicis filiformibus, paniculatis; foliis multifido - lanceolatis; caule solitario. *Linn. Syst.* 1. p. 45.

In ruderatis, ad vias, sepes frequens. Julio, Augusto. *Officinis.* Verbenae herba.

## LYCOPVS L. G. 36.

*Cor.* subaequalis, limbo 4 - fido; lacimia superiore emarginata. *Stamina* distantia.

*europeus* 27. LYCOPVS foliis sinuato - serratis. *Linn. Syst.* 1 p. 56.

Vbique; am Damm vor dem Steinthor.

d. Flo-

*d. Flores superi.*

CIRCAEA L. G. 25.

*Cal.* 2 - phyllus. *Cor.* 2 - partita, obcordata.

28. CIRCAEA caule erecto, racemis pluribus, *lusitana*  
foliis ovatis, (capsulis dispermis). *Linn.*  
*Syst.* 1. p. 33.

In nemoribus, ad sepes: *bey dem Jäger-  
hause wenn man nach Remplin gehet.*

29. CIRCAEA caule prostrato, racemo unico, *alpina*  
foliis cordatis (capsulis monospermis)  
*Linn. Syst.* 1. p. 23.

*Bey Dobberan. Mist Dn. DETHARGIVS.*

B. GYNANDRIA L.

ORCHIS L. G. 1094

*Nectarium* corniforme pone florem.

\* *Bulbis indivisis.*

30. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio *bifolio*  
lanceolato integerrimo; cornu longissi-  
mo, petalis patentibus. *Linn. Syst.* 4. p. 5.

In Syluaticis et nemoribus: *bey Malchin im  
Hayenholze et alibi frequens. Majo. Junio.*

*Officin Satyrii Radix.*

31. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio qua- *morio*  
drifido crenulato; cornu obtuso adscen-  
dente, petalis obtusis conniuentibus. *Linn.*  
*Syst.* 4. p. 8.



In pratis humidis ; in Collibus et pascuis.

*Am Lalaerberge bey Malchin* et alibi passim. Majo. Junio.

*Officin Salep Radix ?*

**\*\* Bulbis palmatis.**

- latifolia* 32. ORCHIS bulbis subpalmatis rectis, nectararii cornu conico; labio trilobo lateribus reflexo, bracteis flore longioribus. *Linn.*

*Syst.* 4. p. 12.

In pratis humidis vbique. Majo.

- maculata* 33. ORCHIS bulbis palmatis patentibus, nectararii cornu germinibus breuiore; labio plano, petalis dorsalibus patulis. *Linn. Syst.* 4. p. 13.

Iisdem locis *bey Pifide auf den Wiesen* copiose. Iunio.

*Officin.* Palmatae Radix.

- conopsea* 34. ORCHIS bulbis palmatis, nectararii cornu fetaceo germine longiore; labio trifido petalis duobus patentissimis. *Linn. Syst.* 4. p. 14.

In pratis nemorosis, *in der gilowischen Bentz am Tannen-Kamp* et alibi rarius. Majo. Junio.

SATYRIVM L. G. 1095.

*Nectarium* scrotiforme, seu inflato didymum pone florem.

- repens* 35. SATYRIVM bulbis fibrosis, foliis ouatis, radicalibus, floribus secundis.

*Im*

*Im Gehölze bey Kittendorf am Wege nach  
Rottmanshagen rarius. Junio.*

OPHRYS L. G. 1096.

*Nectar. pestice subearinatum.*

\* *Bulbis ramosis.*

36. OPHRYS bulbis fibroso-fasciculatis, caule *Nidus avis*  
vaginato aphylo, nectarii labio bifido.  
*Linn. Syst. 4. p. 21.*

*In nemoribus umbrosis. Im Kahldischen Hol-  
ze et alibi non rarius. Majo. Junio.*

37. OPHRYS bulbis aggregatis oblongis, caule *spiralis*  
subfoliofo, floribus spirali-secundis, ne-  
ctarii labio indiviso crenulato. *Linn. Syst.*  
*4. p. 22.*

*In Tractu Rostochiensis legit Dom: DETHAR-  
DING locum non adnotavit. Augusto.*

38. OPHRYS bulbo fibroso, caule bifolio, fo-  
liis ovatis, nectarii labio bifido. *Linn. Syst.*  
*4. p. 22.*

*Am Wallgraben bey Rostech vbi Dom. DE-  
THARDING legit, mihi non obuia.  
Majo. Junio.*

*Officin: Bifolia Herba.*

39. OPHRYS, bulbo subrotundo, pentagono, *paludosa*  
foliis apice scabris, nectarii labio integro  
*Linn. Syst. 4. p. 24.*

*In prutis paludosis sphagno repleto. Im  
Moor in der Scheide, zwischen Malchin und  
Leuschentin; auch auf den Mooren bey der  
Gielitzer Ziegeley. Julio. Augusto.*

In pratis humidis; in Collibus  
*Am Lalaerberge bey Malchin*  
 sim. Majo. Junio.  
 Officin Salep Radix?

latifolia 32. ORCHIS bulbis subpalmatis  
 cornu conico; labio trilobato  
 flexo, bracteis flore longioribus  
 Syst. 4. p. 12.

maculata 33. ORCHIS bulbis palmatis  
 rii cornu germinibus  
 no, petalis dorsalibus  
 4. p. 13.

In pratis humidis ubique.  
 piose. Junio.  
 Officin. Palmatae

canopsea 34. ORCHIS bulbis  
 setaceo germinibus  
 petalis duobus  
 P. 14.

In pratis nemorosis  
 am Tannen-  
 Junio.

repens 35. SATYRIUM  
 radicalibus

*Im Gehölze bey Kittendorf am Wege nach Rottmanshagen rarius. Junio.*

OPHRYS L. G. 1096.

*Nectar. pestice subearinatum.*

\* *Bulbis ramosis.*

36. OPHRYS bulbis fibroso-fasciculatis, caule *Nidus avis* vaginato aphylo, nectarii labio bifido.

*Linn. Syst. 4. p. 21.*

*In nemoribus umbrosis. Im Kahldischen Holze et alibi non rarius. Majo. Junio.*

37. OPHRYS bulbis adgregatis oblongis, caule *Spiralis* subfoliofo, floribus spirali-secundis, nectarii labio indiuiso crenulato. *Linn. Syst. 4. p. 22.*

*In Tractu Roslochiensi legit Dom: DETHARDING locum non adnotauit. Augusto.*

38. OPHRYS bulbo fibroso, caule bifolio, foliis ouatis, nectarii labio bifido. *Linn. Syst. 4. p. 22.* *ouata*

*Am Wallgraben bey Rosstech vbi Dom. DETHARDING legit, mihi non obuia. Majo. Junio.*

*Officin: Bifolia Herba.*

39. OPHRYS, bulbo subrotundo, pentagono, *paludosa* foliis apice scabris, nectarii labio integro *Linn. Syst. 4. p. 24.*

*In prutis paludosis sphagno repleto. Im Moor in der Scheide, zwischen Malchin und Leuschentin; auch auf den Mooren bey der Gielitzer Ziegeley. Julio. Augusto.*

In pratis humidis ; in Collibus et pascuis.

*Am Lalaerberge bey Malchin* et alibi passim. Majo. Junio.

*Officin Salep Radix ?*

**\*\* Bulbis palmatis.**

- latifolia* 32. ORCHIS bulbis subpalmatis rectis, nectararii cornu conico; labio trilobo lateribus reflexo, bracteis flore longioribus. *Linn.*

*Syst.* 4. p. 12.

In pratis humidis vbique. Majo.

- maculata* 33. ORCHIS bulbis palmatis patentibus, nectararii cornu germinibus breuiore; labio plano, petalis dorsalibus patulis. *Linn. Syst.* 4. p. 13.

Lisdem locis *bey Pifide auf den Wiesen* copiose. Iunio.

*Officin.* Palmatae Radix.

- conopsea* 34. ORCHIS bulbis palmatis, nectararii cornu fetaceo germine longiore; labio trifido petalis duobus patentissimis. *Linn. Syst.* 4. p. 14.

In pratis nemorosis, *in der gilowfchen Bentz am Tannen-Kamp* et alibi rarius. Majo. Junio.

SATYRIVM L. G. 1095.

*Nectarium* scrotiforme, seu inflato didymum pone florem.

- repens* 35. SATYRIVM bulbis fibrosis, foliis ovatis, radicalibus, floribus secundis.

*Im*

*Im Gehölze bey Kittendorf am Wege nach  
Rottmanshagen rarius. Junio.*

OPHRYS L. G. 1096.

*Nectar. pestice subearinatum.*

\* *Bulbis ramosis.*

36. OPHRYS bulbis fibroso-fasciculatis, caule *Nidus avis*  
vaginato aphyllis, nectarii labio bifido.

*Linn. Syst. 4. p. 21.*

*In nemoribus umbrosis. Im Kahldischen Hol-  
ze et alibi non rarius. Majo. Junio.*

37. OPHRYS bulbis aggregatis oblongis, caule *spiralis*  
subfolioso, floribus spirali-secundis, ne-  
ctarii labio indiviso crenulato. *Linn. Syst.*  
*4. p. 22.*

*In Tractu Rostochiensis legit Dom: DETHAR-  
DING locum non adnotavit. Augusto.*

38. OPHRYS bulbo fibroso, caule bifolio, fo-  
liis ovatis, nectarii labio bifido. *Linn. Syst.*  
*4. p. 22.*

*Am Wallgraben bey Rostech ubi Dom. DE-  
THARDING legit, mihi non obuia.  
Majo. Junio.*

*Officin: Bifolia Herba.*

39. OPHRYS, bulbo subrotundo, pentagono, *paludosa*  
foliis apice scabris, nectarii labio integro  
*Linn. Syst. 4. p. 24.*

*In prutis paludosis sphagno repleto. Im  
Moor in der Scheide, zwischen Malchin und  
Leuschentin; auch auf den Mooren bey der  
Gielitzer Ziegeley. Julio. Augusto.*

*menorcbis* 40. OPHREYS bulbo globoso, scapo-nudo, nectarii labio trifido cruciato. *Linn. Syst. 4.* p. 25.

In pratis viginosis. *Bey Malchin auf der Wiese am Eisenberge.* Junio.

SERAPIAS L. G. 1097.

*Nectar.* ovatum, subtus gibbum: labio ovato.

*latifolia* 41. SERAPIAS bulbis fibrosis, foliis ovatis amplexicaulibus, floribus pendulis. *Linn. Syst. 4.* p. 28.

In pratis humidis nemorosis; *bey Malchin im Mühlenbruch* passim, copiose *bey Dobberan an dem Büchenberge in dem Bruch.* Junio.

*longifolia* 44. SERAPIAS bulbis fibrosis, foliis ensiformibus sessilibus, floribus pendulis. *Linn. Syst. 4.* p. 29.

In humidis turfosis. *Bey Malchin am Lalaerberge et alibi* passim. Junio.

*ensifolia* 45. SERAPIAS bulbis fibrosis, foliis ensiformibus, distichis, bracteis minutissimis; floribus erectis *Linn. Syst. ed. 14.* p. 815. *Serapias Xiphophyllum.* *Linn. Suppl. 404.* *Serapias grandiflora* *Linn. Syst. 4.* p. 30. β.

In nemoribus graminosis. *Bey Remplin hin und wieder in der Plantage: auch in dem Lustholze auf dem Berge.* Majo. Junio.

*lancifolia* 46. SERAPIAS bulbis fibrosis, foliis ovato-lanceolatis; bracteis longitudine capsulae; flori-

floribus erectis; nectarii labio obtuso, petalis brevioribus. *Linn. Syst. ed. 14. p. 815.*

*Serapias lonchophyllum. Linn. Suppl. 405.*

*Serapias grandiflora. Linn. Syst. 4. p. 30. α.*

In nemoribus montosis bey Dobberan auf der rechten Seite des Büchenberger. Maj. Junio.

C. MONOECIA.

LEMNA G. L. 1130.

♂ *Cal. 1-phyllus. Cor. o.*

♀ *Cal. 1-phyllus. Cor. o. Styl. 1. Caps. 1-locularis.*

47. LEMNA foliis petiolatis lanceolatis. *Linn. trifolca Syst. 4. p. 92.*

In aquis. Bey Malchin in dem Graben bey der Zugbrücke. Junio. Julio.

48. LEMNA foliis sessilibus vtrisque planiusculis, radicibus solitariis. *Linn. Syst. minor 4. p. 92.*

In eisdem locis. Junio. Julio.

*Officin. Lentis palustris herba.*

49. LEMNA foliis sessilibus, radicibus confertis. *polyrbiza Linn. Syst. 4. p. 93.*

In fossis, stagnis; bey Malchin in den Fischteichen bey dem Peen-Garten. Junio. Julio.

D. DIOECIA.

SALIX L. G. 1201.

♂ *Cal. Amentum imbricatum squamis unifloris. Cor. o. Nect. glandula baseos.*

♀ *Cal.*



♀ *Cal.* et *Cor.* maris. *Styl.* 2 - fidus.  
*Caps.* bivaluis, 1 - locularia. *Sem.* pap-  
 posa.

*triandra* 50. *SALIX* foliis ferratis glabris, floribus trian-  
 dris. *Linn. Syst.* 4. p. 223.

In fossis humidis; *bey Malchin hinter dem*  
*Bornberge im Scheidegraben.* Majo.

*pentandra* 51. *SALIX* foliis ferratis, glabris, floribus pen-  
 tandris. *Linn. Syst.* 4. p. 223.

In pratis paludosis; *bey Malchin* copiose. Ma-  
 jo: *Officin.* *Salicis lauræ* Cortex.

*visellina* 52. *SALIX* foliis ferratis, ovatis, glabris, fer-  
 raturis cartilagineis, petiolis calloso-pun-  
 ctatis. *Linn. Syst.* 4. p. 224.

In pratis humidis; *bey Malchin vor dem Stein-*  
*thor*, infrequens, culta. Aprili.

*fragilis* 53. *SALIX* foliis ferratis, glabris, ovato-lan-  
 ceolatis, petiolis dentato-glandulosis. *Linn.*  
*Syst.* 4. p. 125.

In aquosis vbique. Aprili.

*Officin.* *Salicis fragilis* Cortex.

*purpurea* 54. *SALIX* foliis ferratis glabris lanceolatis, in-  
 ferioribus oppositis. *Linn. Syst.* 4. p. 226.

*S. monandra* Hoffm. *Histor. Salic.* p. 18.

Ad ripas. *Bey Rostock vor dem Kröpliner*  
*Thor am Wallgraben* rarius. Aprili.

\*\* *Foliis integerrimis villosis.*

*aurita* 55. *SALIX* foliis integerrimis, vtrinque villo-  
 sis, obovatis, appendiculatis. *Linn. Syst.* 4.  
 p. 230.

In

In humidis turfosis; *auf den Wiesen bey Remplin* et alibi frequens. Aprili.

56. SALIX foliis integerrimis lanceolato-line-*rosmarini-*  
aribus, strictis, sessilibus, subtus tomento-*folia*  
fis. Linn. Syst. 4. p. 232.

Iisdem locis; *auch auf dem neuen Rücken bey Malchin* passim. Aprili.

\*\*\* *Foliis subserratis villosis.*

57. SALIX foliis ovatis, rugosis: subtus tomen-*caprea*  
tosis, undatis, superne denticulatis. Linn.  
Syst. 4. p. 232.

S. caprea. Hoffm. Hist. Salic. p. 25.

In nemorosis, dumetis, ad margines sylva-  
rum. *Bey Malchin im Hayenholtze* et ali-  
bi passim. Aprili.

58. SALIX foliis ovato-oblongis, subtus to-*acuminata*  
mentosis; superioribus integris, inferioribus  
crenatis. Hoffm. Histor. Salic. p. 39.

In nemorosis humidis copiose. Aprili.

59. SALIX foliis subintegerrimis, lanceolato-*viminalis*  
linearibus longissimis, acutis, subtus se-  
riceis, ramis virgatis. Linn. Syst. 4.  
p. 233.

In humidis, ad ripas; *bey Malchin vor dem Steinthor* et alibi frequens. Aprili. Majo.

\*\* *Racemosae.*

- Serpyllifolia.* 12. VERONICA racemo terminali subspicato, foliis ovatis, glabris crenatis. *Linn. Syst.* 1. p. 39.

In pratis, pascuis frequens.

- Beccabunga.* 13. VERONICA racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule reperto. *Linn. Syst.* 1. p. 30.

In fossis copiose. Junio, Julio. *Officinis* Beccabungae herba.

- Anagallis aquatica* 14. VERONICA racemis lateralibus, foliis lanceolatis, serratis; caule erecto. *Linn. Syst.* 1. p. 30.

In fossis et rivulis frequens.

- Scutellaria* 15. VERONICA racemis lateralibus alternis, pediculis pendulis, foliis linearibus rarius denticulatis. *Linn. Syst.* 1. p. 30.

In inundatis; bey dem Schießhause vor dem Mühlenthor bey Malchin. Julio.

- Teucrium* 16. VERONICA racemis lateralibus longissimis, foliis ovatis, rugosis, dentatis, obtusiusculis; caule erecto. *Linn. Syst.* 1. p. 31.

In nemorosis. Auf dem Walle bey Malchin, et alibi frequens. Junio. *Officinis* Veronicae Teucrii herba.

- Chamaedrys* 17. VERONICA racemis lateralibus, foliis ovatis — sessilibus; rugosis, dentatis; caule bifariam piloso. *Linn. Syst.* 1. p. 30.

In den Tannen bey Bafedow. Majo.

\*\*\* *Pe.*

\*\*\* *Pedunculis unifloris.*

18. VERONICA floribus solitariis; foliis cordatis incis, pedunculo brevioribus. *Linn.*

*Syst.* 1. p. 36.

In arvis frequens. Aprili.

19. VERONICA floribus solitariis; foliis cordatis incis, pedunculo longioribus. *Linn.*

*Syst.* 1. p. 36.

In hortis, arvis passim. Aprili.

20. VERONICA floribus solitariis; foliis cordatis, planis, quinquelobis. *Linn. Syst.* 1.

p. 36.

In agris cultis copiose. Aprili.

21. VERONICA floribus solitariis; foliis digitatis, pedunculis calyce longioribus. *Linn. Syst.* 1. p. 37.

In agris copiose. Aprili.

22. VERONICA floribus solitariis; foliis digitatis, pedunculis calyce brevioribus.

*Linn. Syst.* 1. p. 37.

In apricis: an der Stadtmauer bey Malchin et alibi. Majo.

GRATIOLA L. G. 30.

*Cal.* 5 - partitus. *Cor.* limbo 4 - partito, irregulari. *Stam.* 4; 2. sterilia. *Capf.* 2 - locularis, ovata.

23. GRATIOLA foliis lanceolatis, serratis; floribus pedunculatis. *Linn. Syst.* 1. p. 47.

In pratis bey dem Dorfe Schlage im Ellerbrück. Julio. *Officinis.* Gratiolae herba.

## PINGVICULA L. G. 33.

*Cor.* ringens, calcarata. *Caps.* 1 - locularis.

*vulgaris* 24. PINGVICULA nectario cylindraceo, longitudine petali. *Linn. Syst.* 1. p. 50.

In vliginosis: am Damm hinter der Zugbrücke.  
Aprili.

## VTRICULARIA L. G. 34.

*Cal.* 2 - phyllus. *Cor.* ringens, calcarata.  
*Caps.* unilocularis.

*vulgaris* 25. VTRICULARIA nectario conico, scapo paucifloro. *Linn. Syst.* 1. p. 51.

In stagnis bey der gültzer Ziegeley.

c. Flores inferi, monopetali irregulares;  
fructus gynnospermi.

## VERBENA L. G. 35.

*Cal.* 5 - dentatus, denticulo superiore intermedio truncato. *Cor.* subaequalis curva, limbo semi 5 - fido; *Stam.* saepe 4.

*officinalis* 26. VERBENA tetrandra, spicis filiformibus, paniculatis; foliis multifido - lanceolatis; caule solitario. *Linn. Syst.* 1. p. 45.

In ruderatis, ad vias, sepes frequens. Julio, Augusto. *Officinis.* Verbenae herba.

## LYCOPVS L. G. 36.

*Cor.* subaequalis, limbo 4 - fido; lacimia superiore emarginata. *Stamina* distantia.

*europaeus* 27. LYCOPVS foliis sinuato - serratis. *Linn. Syst.* 1 p. 56.

Vbique; am Damm vor dem Steinthor.

d. Flo-

*d. Flores superi.*

CIRCAEA L. G. 25.

*Cal.* 2 - phyllus. *Cor.* 2 - partita, obcordata.

28. CIRCAEA caule erecto, racemis pluribus, *lucetiana*  
foliis ovatis, (capsulis dispermis). *Linn.*  
*Syst.* 1. p. 33.

In nemoribus, ad sepes: *bey dem Jäger-  
haufe wenn man nach Remplin gehet.*

29. CIRCAEA caule prostrato, racemo unico, *alpina*  
foliis cordatis (capsulis monospermis)  
*Linn. Syst.* 1. p. 23.

*Bey Dobberan. Misit Dn. DETHARGIVS.*

B. GYNANDRIA L.

ORCHIS L. G. 1094

*Nectarium* corniforme pone florem.

\* *Bulbis indiuisis.*

30. ORCHIS bulbis indiuisis, nectarii labio *bifolia*  
lanceolato integerrimo; cornu longissi-  
mo, petalis patentibus. *Linn. Syst.* 4. p. 5.

In Syluaticis et nemoribus: *bey Malchin im  
Hayenholze* et alibi frequens. Majo. Junio.  
*Officin Satyrii Radix.*

31. ORCHIS bulbis indiuisis, nectarii labio qua- *morio*  
drifido crenulato; cornu obtuso adscen-  
dente, petalis obtusis conniuentibus. *Linn.*  
*Syst.* 4. p. 8.

In pratis humidis; in Collibus et pascuis.

*Am Lalaerberge bey Malchin* et alibi passim. Majo. Junio.

*Officin Salep Radix?*

**\*\* Bulbis palmatis.**

- latifolia* 32. ORCHIS bulbis subpalmatis rectis, nectararii cornu conico; labio trilobo lateribus reflexo, bracteis flore longioribus. *Linn.*

*Syst.* 4. p. 12.

In pratis humidis vbique. Majo.

- maculata* 33. ORCHIS bulbis palmatis patentibus, nectararii cornu germinibus breuiore; labio plano, petalis dorsalibus patulis. *Linn. Syst.* 4. p. 13.

Iisdem locis *bey Pifide auf den Wiesen* copiose. Iunio.

*Officin.* Palmatae Radix.

- conopsea* 34. ORCHIS bulbis palmatis, nectararii cornu fetaceo germine longiore; labio trifido petalis duobus patentissimis. *Linn. Syst.* 4. p. 14.

In pratis nemorosis, *in der gilowfchen Bentz am Tannen-Kamp* et alibi rarius. Majo. Junio.

SATYRIVM L. G. 1095.

*Nectarium* scrotiforme, seu inflato didymum pone florem.

- repens* 35. SATYRIVM bulbis fibrosis, foliis ovatis, radicalibus, floribus secundis.

*Im*

*Im Gehölze bey Kittendorf am Wege nach  
Rottmanshagen rarius. Junio.*

OPHRYS L. G. 1096.

*Nectar. postice subearinatum.*

\* *Bulbis ramosis.*

36. OPHRYS bulbis fibroso-fasciculatis, caule *Nidus avis*  
vaginato aphylo, nectarii labio bifido.  
*Linn. Syst. 4. p. 21.*

*In nemoribus umbrosis. Im Kahldischen Hol-  
ze et alibi non rarius. Majo. Junio.*

37. OPHRYS bulbis adgregatis oblongis, caule *spiralis*  
subfolioso, floribus spirali-secundis, ne-  
ctarii labio indiviso crenulato. *Linn. Syst.*  
*4. p. 22.*

*In Tractu Rostochienfi legit Dom: DETHAR-  
DING locum non adnotavit. Augusto.*

38. OPHRYS bulbo fibroso, caule bifolio, fo-  
liis *ouata*, nectarii labio bifido. *Linn. Syst.*  
*4. p. 22.*

*Am Wallgraben bey Rostech vbi Dom. DE-  
THARDING legit, mihi non obuia.*  
*Majo. Junio.*

*Officin: Bifolia Herba.*

39. OPHRYS, bulbo subrotundo, pentagono, *paludosa*  
foliis apice scabris, nectarii labio integro  
*Linn. Syst. 4. p. 24.*

*In prutis paludosis sphagno repleto. Im  
Moor in der Scheide, zwischen Malchin und  
Leuschentin; auch auf den Mooren bey der  
Gielitzer Ziegeley. Julio. Augusto.*



♀ *Cal.* et *Cor.* maris. *Styl.* 2 - fidus.  
*Caps.* biualuis, 1 - locularia. *Sem.* pap-  
 posa.

*triandra* 50. *SALIX* foliis ferratis glabris, floribus trian-  
 dris. *Linn. Syst.* 4. p. 223.

In fossis humidis; *bey Malchin hinter dem  
 Bornberge im Scheidegraben.* Majo.

*pentandra* 51. *SALIX* foliis ferratis, glabris, floribus pen-  
 tandris. *Linn. Syst.* 4. p. 223.

In pratis paludosis; *bey Malchin* copiose. Ma-  
 jo. *Officin.* *Salicis lauræ* Cortex.

*visellina* 52. *SALIX* foliis ferratis, ouatis, glabris, fer-  
 raturis cartilagineis, petiolis calloso-pun-  
 ctatis. *Linn. Syst.* 4. p. 224.

In pratis humidis; *bey Malchin vor dem Stein-  
 thor*, infrequens, culta. Aprili.

*fragilis* 53. *SALIX* foliis ferratis, glabris, ouato-lan-  
 ceolatis, petiolis dentato-glandulosis. *Linn.*  
*Syst.* 4. p. 125.

In aquosis vbique. Aprili.

*Officin.* *Salicis fragilis* Cortex.

*purpurea* 54. *SALIX* foliis ferratis glabris lanceolatis, in-  
 ferioribus oppositis. *Linn. Syst.* 4. p. 226.

*S. monandra* Hoffm. *Histor. Salic.* p. 18.

Ad ripas. *Bey Rostock vor dem Kröpliner  
 Thor am Wallgraben* rarius. Aprili.

\*\* *Foliis integerrimis villosis.*

*aurita* 55. *SALIX* foliis integerrimis, vtrinque villo-  
 sis, obouatis, appendiculatis. *Linn. Syst.* 4.  
 p. 230.

In

In humidis turfosis; *auf den Wiesen bey Remplin* et alibi frequens. Aprili.

56. SALIX foliis integerrimis lanceolato-line-*rosmarini-*  
aribus, strictis, sessilibus, subtus tomento-*folia*  
fis. Linn. Syst. 4. p. 232.

Iisdem locis; *auch auf dem neuen Rücken bey Malchin* passim. Aprili.

\*\*\* *Foliis subserratis villosis.*

57. SALIX foliis ovatis, rugosis: subtus tomen-*caprea*  
tosis, undatis, superne denticulatis. Linn.  
Syst. 4. p. 232.

S. caprea. Hoffm. Hist. Salic. p. 25.

In nemorosis, dumetis, ad margines sylva-  
rum. *Bey Malchin im Hayenholtze* et ali-  
bi passim. Aprili.

58. SALIX foliis ovato-oblongis, subtus to-*acuminata*  
mentosis; superioribus integris, inferioribus crenatis. Hoffm. Hist. Salic. p. 39.

In nemorosis humidis copiose. Aprili.

59. SALIX foliis subintegerrimis, lanceolato-*viminalis*  
linearibus longissimis, acutis, subtus fe-  
riceis, ramis virgatis. Linn. Syst. 4.  
p. 233.

In humidis, ad ripas; *bey Malchin vor dem Steinthor* et alibi frequens. Aprili. Majo.

*alba*

60. *SALIX* foliis lanceolatis acuminatis, serratis, vtrinque pubescentibus: serraturis infimis glandulosis. *Linn. Syst.* 4. p. 234.

In Viis publicis copiose. Aprili.

*Offic.* Salicis albae Cortex.

### E. POLYGAMIA DIOECIA.

*FRAXINUS* L. G. 1273.

- ♂ *Cal.* 0. *Stam.* 2. *Pist.* 1. *Sem.* 1. lanceolatum.

- ♀ *Cal.* *Pist.* *Sem.* vt in hermaphradito.

- excelsior* 61. *FRAXINUS* foliolis serratis, floribus apetalis. *Linn. Syst.* 4. p. 556. —

Ad pagum Schlage passim, in dumetis rarius  
Aprili. *Officinis* Fraxini lignum, cortex,  
folia, semina (Lingua avis.)

CLAS.

CLASSIS III.  
TRIANDRIA  
MONOGYNIA.

A. FLORE HERMAPHRODITO.

a. Flores superi.

VALERIANA L. G. 48.

Cal. 6. Cor. 1 - petala tubo gibbo; limbo 5. fido. Sem. 1.

62. VALERIANA floribus triandris dioicis Linn. *dioica*  
Syst. 1. p. 85.

In pratis humidis vbique; auf den Wiesen an der Peene. Majo.

63. VALERIANA floribus triandris, foliis *officinalis*  
omnibus pinnatis. Linn. Syst. 1. p. 86.

In nemorosis humidis frequens bey Witzers-  
hof. Junio.

Officin: Valerianae Herba.

64. VALERIANA floribus triandris, caule di- *Locusta*  
chotomo, foliis linearibus.

a. Locusta olitoria, fructu simplici.

In agris, cultis vbique. Iunio.

IRIS L. G. 65.

Cal. Spatha: Cor. 6 - partita, petalis alter-  
nis reflexis. Stigm. 3 - partitum, petal-  
iforme.

- Pseudacorus* 65. *IRIS* corollis imberbibus: petalis interioribus stigmate minoribus; foliis ensiformibus. *Linn. Syst.* 1. p. 107.  
*An der Peene vbiq̃ue. Majo. Officinis Acori palustris radix.*

## TRIGYNIA.

MONTIA L. G. 104.

- Cal.* 2 - phyllus. *Cor.* 1 - petala - irregularis.  
*Caps.* 1 - locularis, 3 - valuis.  
*fontana* 66. *MONTIA* *Linn. Syst.* 1. p. 244. *α.*  
*In agris arenosis bey Witzerhoff am Rande des Ackers sogleich hinter den Tannen.*  
*HOLOSTEVM* L. G. 110.

- Cal.* 5 - phyllus. *Cor.* 5 - petala irregularis.  
*Sem.* plurima.  
*umbellatum* 67. *HALOSTEVM* floribus umbellatis. *Linn. Syst.* 1. p. 246.  
*In aggeribus bey Malchin an dem Ufer vor dem Pfort. Aprili.*

## B. MONOECIA.

SPARGANIVM L. G. 1132.

- ♂ *Amentum* subrotundum. *Cal.* 3 - phyllus. *Cor.* α.  
 ♀ *Amentum* *Cal.* *Cor.* vt in mare *Stigm.* 2.  
*Drupa* exsucca 1 - 2 - sperma.  
*erectum* 68. *SPARGANIVM* foliis erectis triquetris.  
*Linn. Syst.* 4. p. 95.

In

# TRIANDRIA

§ 17

In fossis piscinis: *bey Malchin am Pfort et alibi passim.* Junio. Julio.

69. SPARGANIVM foliis decumbentibus planis. *natans*  
Linn. Syst. 4. p. 95.

In fossis. *In dem Graben zwischen Remplin, Pifde ohnweit dem Jägerhaus.* Julio. Augusto.

## TYPHA L. G. 1131.

♂ amentum cylindricum. Cal. 3-phyllus, fetaceus. Cor. o.

♀ amentum cylindricum infra masculum.  
Cal. capillaris papposus. Cor. o. Styl. 1.  
Sem. 1. infidens pappo capillari.

70. TYPHA foliis subensiformibus, spica ma- *latifolia*  
scula femineaque approximatis. Linn. Syst.  
4. p. 94.

In paludibus, stagnis. *Bey Malchin am Gerichtsbruch.* Julio.

71. TYPHA foliis semicylindricis spica mas- *angustifolia*  
cula femineaque remotis. Linn. Syst. 1. <sup>lia</sup>  
p. 94.

In aquis stagnantibus. *Bey Malchin hinter der Stadtmauer am Herrenbruch.* Julio.

## AMARANTHVS L. G. 1157.

♂ Cal. 3-phyllus. Cor. o. Stan. 4.

B

♀ Cal.

♀ Cal. et Cor. Maris. Styl. 3. Caps. circumscissa 3-locularis. Sem. 1.

*Blitum* 72. AMARANTHVS glomerulis lateralibus, floribus trifidis, foliis ouatis retusis, caule diffuso. *Linn. Syst.* 4. p. 145.

In cultis; unico saltem adhuc horto in *Malchin*. Julio, Augusto. *Officinis* Bliti herba.

CLAS.

CLASSIS IV.  
TETRANDRIA  
MONOGYNIA.

A. FLORE HERMAPHRODITO.

a. *Adgregati, floribus 1- petalis, 1- sper-  
mis, superis.*

DIPSACVS. L. G. 120.

*Cal.* communis polyphyllus, foliosus; pro-  
prius vix manifestus; receptaculum coni-  
cum patelaceum. *Sem.* columnaria.

73. DIPSACVS foliis petiolatis appendiculatis. *pilosus*  
*Linn. Syst. 1 - p. 275.*

In humidiusculis. *Bey Malchin in den Gär-  
ten am Kahldischen Thore auf der linken  
Seite am Graben. Julio.*

SCABIOSA. L. G. 121.

*Cal.* communis polyphyllus: proprius du-  
plex. Recept. eleuatum. *Sem.* corona-  
ta, involuta.

\* *Corollulis quadrifidis.*

74. SCABIOSA corollulis quadrifidis aequalibus, *suicisa*  
caule simplici, ramis approximatis, fo-  
liis lanceolato - ouatis. *Linn. Syst. 1.*  
*P. 277.*

B 2

In



In pratis Syluaticis et nemorosis humidis.  
*Bey Malchin auf dem neuen Rücken; auch  
 in den Tannen an dem Wege nach Jessin.*  
 Julio.

*Officinis.* Succisae: f. Morfus Diaboli Her-  
 ba, Radix.

*eruenfis* 75. SCABIOSA corollulis quadrifidis radiantibus,  
 foliis pinnatifidis incisis, caule hispido.  
*Linn. Syst. I. p. 279.*

In Pratis versuris frequens. Junio. Julio.  
*Officinis.* Scabiosae Radix, Herba et Flores.

\* \* *Corollulis quinquefidis.*

*Columba-* 76. SCABIOSA corollulis quinquefidis radiantibus,  
*ria* foliis radicalibus ovatis crenatis;  
 caulinis pinnatis fetaceis. *Linn. Syst. I.*  
*p. 280.*

In montosis ficciotibus. *In der Gilowfschen  
 Heide am Schneiderkamp am Wege.*

*b. Flores monopetali, monocarpi, in-*  
*feri.*

CENTUNCVLVS. L. G. 151.

*Cal.* 4 - fidus, *corolla* longior. *Cor.* 4 - fi-  
 da, rotata. *Filam.* breuia. *Capsul.* 1-  
 locularis, circumscissa.

*minimus* 77. CENTUNCVLVS *Linn. Syst. I. p. 326.*

In pascuis. *In der Basedowfschen Heide rechts  
 wo der Weg nach Lipen abgeht; auch  
 bey*

bey *Malchin am Scheidegraben am Wege nach Duckow.* Julio. Augusto.

PLANTAGO L. G. 148.

*Cal.* 4 - fidus, coralla breuior. *Cor.* 4 - fida: limbo reflexo. *Filam:* longissima. *Caps.* 2 - locularis, circumscissa.

78. PLANTAGO foliis ouatis glabris, scapo *maior* tereti, spica flosculis imbricatis. *Linn.*

*Syst.* 1 - p. 319.

In pratis siccis, pomariis, versuris vbique aestate.

*Officin.* Plantaginis Radix, Herba, Semina.

79. PLANTAGO foliis ouato-lanceolatis pubescentibus, spica cylindrica, scapo tereti. *media*

*Linn. Syst.* 1. p. 319.

Iisdem locis cum praecedente. Majo, Junio.

80. PLANTAGO foliis lanceolatis, spica sub-lanceolata vata scapo angulato. *Linn. Syst.* 1, p. 321.

In Versuris, pratis, vulgatissima, Majo et tota aestate.

81. PLANTAGO foliis semicylindricis integer, *maritima* rimis basi lanatis, scapo tereti. *Linn. Syst.*

1. p. 322.

In littoribus maris baltici bey *Warnemünde* copiose aestate.

82. PLANTAGO foliis linearibus dentatis, sca- *coronopifolia* po tereti. *Linn. Syst.* 1. p. 323.

Ad littora maris baltici, am *heiligen Damm so gleich links am Wege wenn man von Dobberan kömmt.* Julio.

c. *Flores monopetali, dicocci, superi.*  
*Stellatae.*

GALIVM L. G. 132.

*Cor. rotata: tubo vix villo. Fruct. subglo-*  
*bosi.*

\* *Fructibus glabris.*

*palustre* 83. GALIVM foliis quaternis obouatis, in-  
 aequalibus, caulibus diffusis. *Linn. Syst.* 1.  
 p. 299.

*Bey Malchin auf der Wiese am Pfort; auch im*  
*Rohrbruch. Junio.*

*uliginosum* 84. GALIVM foliis senis lanceolatis retrorsum  
 serrato aculeatis mucronatis rigidis, co-  
 rollis fructu maioribus. *Linn. Syst.* 1.  
 p. 300.

*In pratis humidis. Auf den Wiesen hinter den*  
*Peen-Gärten bey Malchin. Junio.*

*verum* 85. GALIVM foliis octonis linearibus fulcatis,  
 ramis floriferis brevibus. *Linn. Syst.* 1-  
 p. 302.

*In pratis, versuris, ad vias, an den Zäunen bey*  
*Gilow; auch bey Kessin am Berge. Julio.*  
*Officin. Galii lutei Herba Flores.*

*Malluge* 86. GALIVM foliis octonis ovato-linearibus,  
 sub-serratis patentissimis, mucronatis,  
 caule flaccido, ramis patentibus. *Linn. Syst.*  
 1. p. 303.

*In dumetis, versuris, ad sepes copiosissime.*  
*Junio.*

87. GALIUM foliis octonis laevis subtus sca- *sylvaticum*  
bris: floribus binis, pedunculis copillari-  
bus caule laevi. *Linn. Syst. 1. p. 303.*

In nemoribus montosis, infrequens. *Auf dem*  
*Büchenberge bey Dobberan. Julio.*

*\*\* Fructibus hispidis.*

88. GALIUM foliis octonis lanceolatis, carina- *Aparina*  
tis, scabris, retrorsum aculeatis, geniculis  
villosis, fructibus hispidis. *Linn. Syst. 1.*  
*p. 306.*

In cultis vulgarissima. Majo. Junio.

ASPERULA. L. G. 128.

*Cor. tubulosa, infundibuliformis: limbo*  
*obtus. Fruct. sub-globosi.*

89. ASPERULA foliis octonis, lanceolatis, flo- *odorata*  
rum fasciculis pedunculatis. *Linn. Syst. 1.*  
*p. 294.*

In nemoribus et sylvaticis, *Bay Malchin im*  
*Hayenholze* copiose. Majo.

*Officin* Matrifyluae f. Hepaticae stellatae  
Herba.

SHERARDIA. L. G. 127.

*Cor. tubulosa infundibuliformis: limbo acu-*  
*to. Fruct. oblongus coronatus. Sem. 3-*  
*dentata.*

90. SHERARDIA foliis omnibus verticillatis, *arvensis*  
floribus terminanibus. *Linn. Syst. 1.*  
*p. 292.*

In arvis et agris; *an der Feldscheide bey Ge-*  
*schendorf links am Wege. Aestate.*

B 4

d. Flo-

*d. Flores tetrapetali superi.*

CORNVS. L. G. 155.

*Cal.* 4 - dentatus, deciduus. *Drupa* nucleo  
2 - loculari.*sanguinea* 91. CORNVS arborea, cymis nudis, ramis re-  
ctis. *Linn. Syst.* 1. p. 331.In sepibus dumetis. *Auf dem Wall bey Mal-*  
*chin.* Majo.*e. Flores incompleti inferi.*

ALCHEMILLA. L. G. 177.

*Cal.* 8 - fidus. *Cor.* 0. *Sem.* 1. calyce in-  
clusum.*vulgaris* 92. ALCHEMILLA foliis lobatis, *Linn. Syst.* 1.  
p. 349.In pratis, syluis; passim *bey Piside im Ge-*  
*hölze.* Junio.*Officin;* Alchemillae Radix, Herba.

## DIGYNIA.

CVSCVTA L. G. 182.

*Cal.* 4 - 5 fidus, *Cor.* 1 - petala, ovata 4 - 5 - fi-  
da. *Caps.* 2 locularis, circumscissa.*europaea* 93. CVSCVTA floribus sessilibus. *Linn. Syst.*  
1. p. 352. α.Parasitica in Humulo Lupulo etc, in sepibus  
vbique.*Offic.* Cuscutae Herba.

TETRA.

## TETRAGYNIA.

ILEX. L. G. 184.

*Cal.* 4. *dentatus*. *Cor.* rotata. *Styl.* o. *Bacca* 4 - sperma.

94. ILEX foliis ovatis acutis spinosis. *Linn. Syst.* *Aquifolium*  
I. p. 354.

Habitat in dumetis passim, praesertim bey den  
Dörfern wenn man von Rostock nach Dob-  
beran auch nach Warnemünde reiset. Flo-  
ret —

POTAMOGETON. L. G. 186,

*Cal.* o. *Pet.* 4. *Styl.* o. *Sem.* 4. nuda.

95. POTAMOGETON foliis oblongo - ovatis, *natans*  
petiolatis natantibus, *Linn. Syst.* I. p. 355.

In stagnis, fossis. *Bey Malchin vor dem Stein-  
thore in den Pfützen.* Junio.

96. POTAMOGETON foliis cordatis amplexi- *perfolia-*  
caulibus. *Linn. Syst.* I. p. 355. *tum*

In fluviis passim, *bey Bützow auf dem Fluss  
im botanischen Garten.* Junio.

97. POTAMOGETON foliis lanceolatis planis in *lucens*  
petiolo desinentibus, *Linn. Syst.* I. p.  
356.

In piscinis. *Bey Güstrow in Gärten, Fisch-  
teichen vor dem Hagebüschchen - Thore.* Ju-  
nio.

98. POTAMOGETON foliis lanceolatis alternis *crispum*  
oppositisque undulatis serratis. *Linn. Syst.*  
I. p. 356.

In fossis, rivulis, ad oppidum bey *Malchin* vor dem *Steinthore* in der *Pfütze* hinter dem *Schlagbaum*; auch in dem *Graben* am *Pfort*, et alibi. Majo.

*compressum* 99. POTAMOGETON foliis linearibus obtusis, caule compresso. *Linn. Syst.* 1. p. 357.

In fossis paludosis: in dem *Rohrbruch* bey *Malchin*. Junio.

*pettinatum* 100. POTAMOGETON foliis setaceis parallelis adproximatis destichis. *Linn. Syst.* 1. p. 357.

In fluviis, v. g. bey *Malchin* in der *Peene* am *Kornbring*. Junio.

*gramineum* 101. POTAMOGETON foliis lineari-lanceolatis, alternis, sessilibus, stipula latioribus. *Linn. Syst.* 1. p. 358.

In paludis: bey *Malchin* im *Rohrbruch*, in dem *Otterlöchern*, floret Aestate.

SAGINA. L. G. 188.

*Cal.* 4 - phyllus. *Pet.* 4. *Capf.* 4 - valvis, polysperma.

*procumbens* 102. SAGINA ramis procumbentibus. *Linn. Syst.* 1. p. 359.

In pascuis humidis, arvis, frequens. Aestate.

## B. MONOECIA.

URTICA. L. G. 1149.

♂ *Cal.* 4 - phyllus. *Cor.* o. *Nectar.* centrale, cyathiforme.

♀ *Cal.*

♀ *Cal.* 4-phyllus, foliolis 2 oppositis exiguis. *Cor.* o. *Stigm.* villosum. *Sem.* 1. ouatum, nitidum.

103. URTICA foliis oppositis ovalibus. *Linn.* *urens*  
*Syst.* 4. p. 130.

In cultis, aruis, ad sepes, fimeta vbique aestate.

*Officin.* Urticae minoris Herba.

104. URTICA foliis oppositis cordatis, racemis geminis. *Linn.* *Syst.* 4. p. 230. *dioica*

In ruderatis, ad sepes vulgaris. Aestate.

*Officin.* Urticae maioris Radix Herba, Semina.

BETULA. L. G. 1147.

♂ amentum squamis 3, 3-floris. *Cor.* 4-partita.

♀ amentum squamis 3, 2-floris. *Cor.* o.  
*Styl.* 2. *Sem.* 2-3, vtrinque alata.

105. BETULA foliis ouatis acuminatis ferratis. *alba*  
*Linn.* *Syst.* 4. p. 125.

In syluaticis et nemoribus vliginosis frequens.  
Aprili, Majo.

*Officinis:* Betulae lignum, epidermis, folia, lymph.

106. BETULA pedunculis ramosis. *Linn.* *Syst.* *Alnus*  
4. p. 127.

In vliginosis frequens. Aprili. *Officinis:*  
Alni cortex.

B. MO-



## C. MONOECIA POLYGAMIA.

PARIETARIA. L. G. 1259.

♂ *Cal.* 4-fidus. *Cor.* o. *Stam.* 4. *Styl.* 1. *Sem.* 1. superum ouatum.♀ *Cal.* *Cor.* *Styl.* *Sem.* hermaphroditi.*officinalis* 107. PARIETARIA foliis lanceolato-ouatis pedunculis dichotomis, calycibus diphyllis.*Linn. Syst.* 4. p. 321.In ruderatis: *bey Malchin an der Cämmerey-Wiese* et alibi passim. Junio, Julio.*Officinis*: Parietariae f. Helxines herba.

## D. DIOECIA.

VISCUM. L. G. 1209.

♂ *Cal.* 4-partitus. *Cor.* o. *Filamenta* cum Antheris calyci adnatae.♀ *Cal.* 4-phyllus, superus. *Cor.* o. *Styl.* o. *Stigm.* obtusum, *Bacca* 1-sperma. *Sem.* cordata.*album* 108. VISCUM foliis lanceolatis obtusis, caule dichotomo, spicis axillaribus. *Linn. Syst.* 4. p. 240.In arboribus parasitica: in Pyro sylvestri, *bey Remplin* passim; rarius in quercubus, Martio. *Officin*: Visci lignum.

CLAS-

CLASSIS V.  
PENTANDRIA  
MONOGYNIA.

A. FLORE HERMAPHRODITO.

a. *Flores monopetali, inferi tetragymnospermi. Asperifolia.*

ECHIVM. L. G. 203.

Cor. campanulata, fauce nuda, limbo irregulari, laciniis superioribus longioribus.

109. ECHIVM caule tuberculato hispido, foliis *vulgare* caulinis lanceolatis hispidis, floribus spicatis lateralibus. *Linn. Syst. I. p. 403.*

In Ruderatis ficcis, ad vias *bey Remplin an den Gräben* et alibi copiose. Junio, Julio.

PVLMONARIA. L. G. 190.

110. PVLMONARIA foliis radicalibus ovato-*officinalis* cordatis scabris. *Linn. Syst. I. p. 393.*

In syluaticis: *im Hainholze bey Malchin* et alibi: *α.*

*Officin Pulmonariae Herba.*

LITHOSPERMVM. L. G. 193.

Cor. infundibuliformis: fauce perforata nuda.

*officinale* 111. LITHOSPERMUM feminibus laevibus, corollis vix calycem superantibus, foliis lanceolatis. *Linn. Syst.* 1. p. 385.

In nemoribus, ad margines, *auf dem Stadtwall bey Malchin.* Junio.

*Officin:* Lithospermum. f. Milii - folis femina.

*arvense* 112. LITHOSPERMUM feminibus vagis, corollis vix calycem superantibus. *Linn. Syst.* 1. p. 385.

In agris, cultis vbique. Majo. Junio.

SYMPHYTUM. L. G. 197.

*Cor.* campanulata, fauce clausa radiis subulatis; limbo tubulato, ventricoso.

*officinale* 113. SYMPHYTUM foliis ovato - lanceolatis decurrentibus. *Linn. Syst.* 1. p. 394.

In pratis humidis vbique aestate.

*Officin.* Consolidae maioris f. Symphyti Radix, Herba, Flores.

BORRAGO. L. G. 200.

*Cor.* rotata: fauce coronata, prominentiis emarginatis.

*officinalis* 114. BORRAGO foliis omnibus alternis; calycibus patentibus. *Linn. Syst.* 1. p. 397.

In reiectamentis hortorum *bey Malchin vor den Peen - Gärten.* Junio.

*Officin:* Borraginis Herba, Flores.

LYCOPSIS. L. G. 202.

*Cor.* infundibuliformis: tubo curvato flexo, fauce clausa squamalis.

115. *LYCOPSIS* foliis lanceolatis hispidis, calycibus florescentibus erectis. *Linn. Syst.* 1. p. 400.

In agris inter segetes, in cultis hortorum vbi-  
que. Aestate.

ASPERVGO. L. G. 201.

*Cor.* infundibuliformis fauce clausa squa-  
mulis. *Cal.* fructus compressus lamellis  
plano - paralelis, sinuatis.

116. *ASPERVGO* calycibus fructus compressis. *procumbens*  
*Linn. Syst.* 1. p. 399.

In ruderatis, ad sepes, vbiq. in *Malchin vor*  
*dem wargentinschen Thore an den Garten-*  
*zäunen.* Majo.

CYNOGLOSSVM.

*Cor.* infundibuliformis, tubo limb breui-  
ore; fauce clausa squamulis. *Sem.* in-  
teriore tantum latere stylo adfixa.

117. *CYNOGLOSSVM* flaminibus coralla breui- *officinale*  
oribus, foliis lato - lanceolatis tomentosis  
sessilibus. *Linn. Syst.* 1. p. 390.

In Ruderatis ad sepes, vias copiose. Majo.  
Junio.

*Officin:* *Cynoglossae Radix, Herba.*

ANCHUSA. L. G. 194.

*Cor.* infundibuliformis: tubo longitudine  
calycis, basi prismatico; fauce clausa  
squamulis oblongis. *Sem.* oblonga ob-  
tusa.

*officinalis* 118. *ANCHUSA* foliis lanceolatis, spicis imbricatis secundis. *Linn. Syst.* 1. p. 387.

In arenosis ad vias *bey Remplin am Wege* copiose et alibi.

*Officin:* Buglossi Radix, Herba, Flores.

*Myosotis*, L. G. 192.

*Cor.* hypocrateriformis, emarginata: fauce clausa squamalis. *Semin.* ovata acuminata.

*scorpioides* 119. *MYOSOTIS* feminibus laevibus, foliorum apicibus callosis. *Linn. Syst.* 1. p. 383.

*α.* *Myosotis arvensis*, foliis hirsutis.

*β.* — palustris foliis glabris.

*α.* in campis arenosis, pratis et pascuis aridis ubique.

*β.* in paludibus et fossis frequens aestate.

*b. Flores monopetali, inferi; angiospermi.*

*ANAGALLIS*. L. G. 220.

*Cor.* rotata: filam. inferne hirsuta. *Stigma* capitatum. *Caps.* 1-locatis circumscissa.

*arvensis* 120. *ANAGALLIS* foliis indivisis, caule procumbente. *Linn. Syst.* 1. p. 422.

*LYSIMACHIA*. L. G. 219.

*Cor.* rotata. *Stigma* obtusum. *Caps.* 1-locularis 10-valvis.

*vulgaris* 121. *LYSIMACHIA* paniculata, racemis terminalibus. *Linn. Syst.* 1. p. 419.

In

In pratis humidis: *bey Malchin auf den Wiesen hinter den Peengärten.* Julio. Augusto.

122. *LYSIMACHIA* racemis lateralibus, pedunculatis. *thyrsiflora* Linn. Syst. 1. p. 420.

In paludibus: *bey Malchin vor dem Mühlen-Thor in der Seebänke* et alibi passim. Junio.

123. *LYSIMACHIA* foliis subcordatis, floribus solitariis, caule repente. Linn. Syst. 1. p. 422. *Nummularia*

In nemorosis humidis vbique. Junio. Julio.

PRIMULA. L. G. 210.

Involucrum umbellulae. Cor. infundibuliformis, tubo cylindrico, fauce peruia; ore patulo. Stigma globosum. Caps. 1-locularis.

124. *PRIMULA* foliis dentatis rugosis. Linn. veris Syst. 1. p. 411. n.

In pratis, pascuis, sylvis vbique. Aprili.

Officin: *Primulae-veris*. f. *Paralyseos Radix*. Herba, Flores.

HOTTONIA. L. G. 216.

Cor. hypocrateriformis. Stam. laciniis corollae opposita, tubo corollae superimposita. Stigm. globosum. Caps. 1-locularis.

125. *HOTTONIA* pedunculis verticillato-multifloris. Linn. Syst. 1. p. 416.

In fossis: *bey Malchin in den Gräben am Pfort* et alibi. Majo. Junio.

C

MENY.

## MENYANTHES. L. G. 215.

*Cor.* villosa. *Stigm.* 2-fidum. *Caps.* 1-locularis.

*trifoliata* 126. MENYANTHES foliis ternatis. *Linn. Syst.* 1. p. 416.

In pratis paludosis. *Bey Malchin auf den Wiesen hinter den Peengärten et alibi.*  
Majo.

*Officin.* Trifolii febrini. f. aquatici Radix.  
Herba.

## CONVOLVULUS. L. G. 231.

*Cor.* campanulata, plicata. *Stigmata* 2.  
*Capsul.* 2-3 locularis: loculis 2-spermis.

*arvensis* 127. CONVOLVULUS foliis sagittatis vtrinque acutis, pedunculis subunifloris. *Linn. Syst.* 1. p. 434.

In agris, aruis, cultis aggeribus vbique, aestate.

*sepium* 128. CONVOLVULUS foliis sagittatis postice truncatis, pedunculis tetragonis vnifloris.  
*Linn. Syst.* 1. p. 434.

In dumetis sepibus, hortis vbique. Aestate.

## DATURA. L. G. 263.

*Cal.* tubulosus angulatus, deciduus; basi orbiculata, persistente. *Cor.* infundibuliformis; limbo plicato, acuminato. *Caps.* 3-locularis, 4-valvis.

*Stramonium* 129. DATURA pericarpis erectis, spinosis, ovatis; foliis ovatis glabris. *Linn. Syst.* 1. p. 497.

In

In ruderatis. *Bey Malchin an den Gärten und Scheunen vor dem Steinhore et alibi.*  
Julio.

*Officin.* Daturae. f. Stramonii Herba, Semina.

HYOSCYAMVS. L. G. 264.

*Cor.* infundibuliformis; limbo obtuso. *Stam.* inclinata. *Stigm.* capitatum. *Capsf.* circumscissa, bilocularis.

130. HYOSCYAMVS foliis amplexicaulibus sinuatis, floribus sessilibus. *Linn. Syst.* 1. p. 499. *niger*

In ruderatis ad pagos. *Bey Malchin vor dem Steinhore an den Gärten.* Junio. Julio.

*Officin.* Hyoscyami. Radix, Herba, Semen.

VERBASCUM. L. G. 262.

*Cor.* rotata subinaequalis. *Filam.* inclinata, villosa. *Stigma.* obtusum. *Capsf.* 2 - locularis, 2 - valuis.

131. VERBASCUM foliis decurrentibus vtrinque tomentosis caule simplici. *Linn. Syst.* 1. p. 492. *Thapsus*

In ruderatis, versuris: *bey Remplin an der Landstrasse et alibi frequens.* Julio. Augusto.

*Officin.* Verbasci Herba, Flores.

132. VERBASCUM foliis cordato-oblongis petiolatis. *Linn. Syst.* 1. p. 494. *nigrum*

In nemoribus, siccis, praesertim in der Gegend um Rostoch bey Kessin am Wege et alibi frequens. Julio, Augusto.



*Officin.* Verbasci nigri Radix, Flores.

VINCA. L. G. 322.

Contorta. *Cor.* hypocrateriformis. *Stigma*  
duplex, vnum alteri superimpositum.  
*Folliculi* 2. erecti. *Sem.* nuda.

*minor*

133. VINCA caulibus procumbentibus, foliis lanceolato - ouatis, floribus pedunculatis.

*Linn. Syst.* 1. p. 593.

*Auf dem Stadtwall bey Malchin passim.*  
*Aprili. Majo.*

*Officin* Vincae peruincae Herba.

SOLANUM. L. G. 268.

*Cor.* rotata. *Anth.* subcoalitae, apice poro  
gemino dehiscentes. *Bacca* subrotunda,  
2 - locularis.

*Dulca-  
mara*

134. SOLANVM caule inermi frutescente flexu-  
oso, foliis superioribus hastatis, racemis  
cymosis. *Linn. Syst.* 1. p. 511.

*In sepibus, locis montosis et aquosis: auf*  
*den Bergen bey Gofchendorff am Gölitzer*  
*Wege, im Rohrbruch bey Malchin, auch*  
*hin und wieder in hollen Weiden. Junio.*  
*Julio.*

*Officin:* Dulcamarae Radix, Stipites.

*nigrum*

135. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis  
ouatis dentato - angulatis, racemis distichis  
nutantibus. *Linn. Syst.* 1. p. 514.

*In cultis. ruderatis vbique.*

*Officin:* Solani Herba.

*c. Flo-*

c. *Flores monopetali, superi.*

PHYTEUMA. L. G. 236.

*Cor. corniculata*, ad basin fere 5 - partita;  
laciniis linearibus. *Stigma* 2 - f. 3 - fidum.  
*Caps.* 2 - f. 3 - locularis, polysperma.

136. PHYTEUM spica oblonga, capsulis bilo- *spicata*  
cularibus foliis radicalibus cordatis. *Linn.*  
*Syst.* 1. p. 471.

In sylvis. *Bey Pifide im Holze*, passim, Majo.  
Junio.

*Officin*: Rapunculi Radix.

CAMPANULA. L. G. 234.

*Cor. campanulata*, fundo clauso valvis stami-  
niferis. *Stigma* 3 - partitum. *Capsul.*  
3 - f. 5 - locularis foraminibus lateralibus  
dehiscens.

\* *Foliis laevioribus.*

137. CAMPANULA foliis radicalibus reniformibus; caulinis linearibus. *Linn. Syst.* 1. *rotundifolia*  
p. 455.

In pascuis, nemoribus, collibus: *bey Malchin*  
*am Berge vor dem Haynholze*, aestate.

138. CAMPANULA foliis radicalibus obouatis, *persicifolia*  
caulinis lanceolato - linearibus serratis sub-  
sessilibus remotis. *Linn. Syst.* 1. p. 456.

In nemoribus, montibus: *bey Malchin auf*  
*dem Wall, auch am Rande des Haynhol-*  
*zes et alibi passim.* Julio. Augusto.

**\*\* Foliis scabris latioribus.**

- Trachelium* 139. CAMPANULA caule angulato, foliis petiolatis, calycibus ciliatis, pedunculis trifidis.  
*Linn. Syst. 1. p. 460.*

In nemoribus inter dumeta: *bey Malchin auf dem Wall, auch am Hayenholze.* Julio. Augusto.

- glomerata* 140. CAMPANULA caule angulato simplici, floribus sessilibus, capitulo terminali.  
*Linn. Syst. 1. p. 460.*

In aridis montosis: *bey Malchin neben den jungen Tannen et alibi,*

LONICERA. L. G. 250.

*Cor. irregularis. Stigma capitatum. Bacca subrotunda bilocularis.*

- Periclymenum* 141. LONICERA capitulis ovatis imbricatis, terminalibus, foliis omnibus distinctis. *Linn. Syst. 1. p. 481.*

Ad sepes, in syluaticis: *bey Malchin am Scheidegraben nach Basedow hin; auch im Hayenholze passim.* Junio. Julio.

*Officin: Caprifolii Herba.*

- Xylosteum* 142. LONICERA pedunculis bifloris, baccis distinctis, foliis integerrimis pubescentibus.  
*Linn. Syst. 1. p. 482.*

In nemoribus, *bey Pifide.* In dumetis *bey Pifide auf dem Felde links des Hofes auf dem sterilen Hügel, rarius.* Majo.

*d. Flo.*

*d. Flores pentapetali, inferi.*

RHAMNVS. L. G. 284.

*Cal. corollinus tubulosus, squamae oris con-*  
*niventes, flamina munientes. Bacca sub-*  
*rotunda*

143. RHAMNVS spinis terminalibus, floribus *europaeus*  
quadrifidis dioicis, foliis ovatis. Linn.

*Syst. 1. p. 539.*

*In sepibus, dumetis: bey Malchin vor dem Stein-*  
*thore an den Hellengrund; auch im Scheide-*  
*graben vor dem Wargentinschen Thore.*

Majo,

*Officin. Spinæ ceruinæ Baccae.*

144. RHAMNVS inermis, floribus monogynis *Frangula*  
hermaphroditis, foliis integerrimis. Linn.

*Syst. 1. p. 543.*

*In nemorosis humidis, in sylvis: bey Malchin*  
*hin und wieder in den Ellerbrüchen; auch*  
*im Hayenholze et alibi. Majo. Junio.*

*Officin. Frangulae Cortex.*

EVONYMUS. L. G. 291.

*Cal. patens. Bacca capsularis lobata, colo-*  
*rata. Sem. baccato. arillata.*

145. EVONYMUS floribus plerisque quadrifi *europaeus*  
dis, foliis acutis. Linn. *Syst. 1. p. 554.*

*Ad sepes in nemoribus: bey Malchin auf*  
*dem Wall; auch in den Scheidegräben.*  
Majo.

e. *Flores pentapetali, Superi.*

RIBES. L. G. 301.

*Pet. et Stam. calyci inferta. Styl. bifidus.**Bacca polysperma.*\* *Ribesia inermia.*

*rubrum* 146. RIBES inermis, racemis glabris pendulis, floribus planiusculis. *Linn. Syst. I. p. 564.*

*Ad sepes bey Malchin auf dem Wall; auch in hollen Weiden. Aprili, Majo.*

*Officin. Ribium rubrorum Baccae.*

*nigrum* 147. RIBES inermis, racemis pilosis, floribus oblongis. *Linn. Syst. I. p. 565.*

*Ad sepes: bey Malchin vor dem Kahldischen Thore, vor der Kämmerer - Wiese et alibi. Aprili. Majo.*

*Officin. Ribium nigrorum stipites, Folia, Baccae.*

\*\* *Grossulariae aculeatae.*

*Grossularia* 148. RIBES ramis aculeatis, petiolorum ciliis pilosis, baccis hirsutis. *Linn. Syst. I. p. 566.*

*Ad sepes: bey Malchin hin und wieder an den Zäunen. Aprili, Majo.*

*Uva-crispa.* 149. RIBES ramis aculeatis, baccis glabris, pedicellis bractea monophylla. *Linn. Syst. I. p. 566.*

*Iisdem locis. Aprili.*

*Officin. Uvae crispae Baccae.*

HEDE-

HEDERA. L. G. 304.

- Inuoluer.* umbellae minimum. *Pet.* oblonga. *Stigm.* simplex. *Bacca.* calyce cincta.  
 150. HEDERA foliis ouatis lobatisque. *Linn.* *Helix*  
*Syst.* I. p. 568.  
 In syluis. In dem Holze bey *Pifide* copiose  
 et alibi. Augusto. Septembri.  
*Officin.* Hederae arboreae Lignum, Folia,  
 Baccae.

*f. Flores incompleti, inferi.*

GLAUX. L. G. 314.

- Cal.* o. *Cor.* 1 - petala, persistens. *Capsf.*  
 1 - locularis, 5 - valuis, 5 - sperma.  
 151. GLAUX maritima, *Linn.* *Syst.* I. p. 585. *maritima*  
 Ad littora maris baltici, bey *Warnemünde* pas-  
 sim. Junio.

## DIGYNIA,

*a. Flores monopetali, inferi.*

SWERTIA. L. G. 351.

- Cor.* rotata: Nectariferi pori ad basin lacri-  
 niarum corollulae. *Capsf.* unilocularis,  
 2 - vuluis.  
 152. SWERTIA corollis quinquefidis, foliis ra- *perennis*  
 dicalibus ovalibus. *Linn.* *Syst.* I. p.  
 635.  
 Auf der *Basedowschen Wiese* so gleich hinter  
 dem *Scheidegraben* rechts nach der *Peena*  
 hin. Septembri.

## GENTIANA. L. G. 352.

*Cor.* inferne tubulosa, varia. *Capsul.* 2-valvis. 1 - locularis. *Receptaculis.* 2 longitudinalibus.

*Centaureum* 153. GENTIANA corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo, pistillo simplici. *Linn. Syst.* 1. p. 642.

In syluaticis: *bey Malchin im Kahldischen Holze an dem sterilen Berge am Mühlenbruch et alibi.* Julio.

*Officin.* Centaurii minoris Herba.

*campestris* 154. GENTIANA corollis quadrifidis fauce barbatis. *Linn. Syst.* 1. p. 644.

In Montosis ficcis: *bey Malchin auf dem Lalaerberge.* Septembri, Octobri.

*cruciata* 155. GENTIANA corollis quadrifidis, imberbibus, floribus verticillatis sessilibus. *Linn. Syst.* 1. p. 645.

In Montosis ficcis *bey Malchin im Mühlenfelde am Lausebusch; auch am Scheidegraben nach Scharpzwow hin.* Julio.

## b. Flores incompleti.

## SALSOLA. L. G. 339.

*Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 0. *Caps.* 1 - sperma. *Sem.* cochleatum.

*Kali* 156. SALSOLA herbacea decumbens, foliis subulatis spinosis, calycibus marginatis, exillaribus. *Linn. Syst.* 1. p. 624.

Habi.

Habitat in littoralibus maris; *bey Warnemünde* frequens. Julio.

CHENOPODIUM. L. G. 337.

*Cal.* 5 - tagonus, profunde 5 - fidus, concavus. *Sem.* 1. lenticulare superum.

\* *Foliis angulosis.*

157. CHENOPODIUM foliis triangularibus, *Bonus sagittatis, integerrimis, spicis compositis aphyllis axillaribus. Linn. Syst. 1. p. 617. Henricus*

In ruderatis frequens. Junio. Julio.

*Officin.* Boni Henrici Herba.

158. CHENOPODIUM foliis cordato triangularibus obtusiusculis dentatis, racemis compositis subfoliosis, caule brevioribus. *rubrum*  
*Linn. Syst. 1. p. 617.*

In ruderatis, cultis: *bey Malchin am langen Damm* et alibi frequens. Julio. Augusto.

*Officin:* Artiplicis sylvestris Herba.

159. CHENOPODIUM foliis ovatis nitidis dentatis acutis, racemis ramosis nudis. *murale*  
*Linn. Syst. 1. p. 618.*

In ruderatis, adaggeres, in cultis passim. Augusto, Septembri.

160. CHENOPODIUM foliis rhomboideo-triangularibus erosis, postice integris: summis oblongis, racemis erectis. *album*  
*Linn. Syst. 1. p. 618.*

In



In cultis, agris, verfuris: *bey Malchin an den Gartenzäunen vor dem Wargentinschen Thore et alibi.* Augusto.

- viride* 161. CHENOPODIUM foliis rhomboideis dentato-sinuatis, racemis ramosis subfoliatis. *Linn. Syst.* 1. p. 619.

In cultis, agris, hortis, ad sepēs vulgatissima. Aestate.

- hybridum* 162. CHENOPODIUM foliis cordatis, angulato-acuminatis racemis ramosis nudis. *Linn. Syst.* 1. p. 619.

In cultis oleraceis, ad sepēs: *an den Gartenzäunen bey Malchin.* Julio. Augusto.

- glauum* 163. CHENOPODIUM foliis ovato-oblongis repandis, racemis nudis, simplicibus, glomeratis. *Linn. Syst.* 1. p. 621.

In ruderatis cultis, ad domos, fimeta: *bey Malchin an den Scheunen; hin und wieder an der Staudtmauer.* Julio. Augusto.

**\*\* Foliis integris.**

- Vulvaria* 164. CHENOPODIUM foliis integerrimis rhombo-ouatis, floribus conglomeratis axillaribus. *Linn. Syst.* 1. p. 621.

In Plateis Rastochii: *in der Strandstrasse bey dem Münchthor rarius.* Julio, Augusto.

*Officin.* Vulvariae Herba.

- polyspermum* 165. CHENOPODIUM foliis integerrimis ovatis, caule decumbente, cymis dichotomis aphyllis axillaribus. *Linn. Syst.* 1. p. 621.

In

In Cultis oleraceis copiose aestate.

166. CHENOPODIUM foliis subulatis seminibus *marissimum* cylindricis. *Linn. Syst.* 1. p. 622.

Ad littora maris baltici *bey Warnemünde.*

Julio. Augusto.

HERNIARIA. L. G. 336.

*Cal.* 1-phyllus, 5-partitus. *Cor.* o. *Stam.*

10: 5. sterilia. *Caps.* 1-sperma.

167. HERNIARIA glabra, glomerulis multifloris. *Linn. Syst.* 1. p. 615. *glabra*

In apricis glareosis, siccis collibus. *Auf dem Lalaerberge bey Malchin et alibi.* Junio.

*Officin.* Herniariae Herba.

ULMUS. L. G. 345.

*Cal.* 1-phyllus, 5-fidus. *Cor.* o. *Stigm.*

pubescentia, *Pericarp.* exsuccum compresso-membranaceum 1-spermum.

168. ULMUS foliis duplicato ferratis basi inaequalibus. *Linn. Syst.* 1. p. 631. *campestris*

*Auf dem Malchinschen Sadtwall; auch im Scheidegraben.* Aprili.

*Officin:* Ulmi Cortex.

c. Flores pentapetali, superi, dispersi.  
*Umbellatae.*

1A. Involucro uniuersali et partiali.

ERYNGIUM. L. G. 354.

169. ERYNGIUM foliis radicalibus subrotundis plicatis spinosis, capitulis pedunculatis, *marissimum*

tis, paleis tricuspidatis. *Linn. Syst.* 1. p. 649.

Ad littora maris. *In Warnemünde vorne in den Strassen* copiose. Junio. Julio.

HYDROCOTYLE. L. G. 355.

*Flor.* Subumbellati, fertiles. Umbella simplex. *Involucr.* totidem foliola quot flores. *Pst.* integra. *Sem.* semi-orbiculata, compressa, alata.

*vulgaris* 170. HYDROCOTYLE foliis peltatis, umbellis quinquefloris. *Linn. Syst.* 1. p. 651.

*In inundatis pratis, aquosis: bey Malchin auf den Damm-Wiesen.* Junio. Julio.

SANICULA. L. G. 356.

*Flor.* subumbellati: disci masculi. *Umb.* conferta, subcapitata. *Sem.* muricata.

*europaea* 171. SANICULA foliis radicalibus simplicibus, fasciculis omnibus sessilibus. *Linn. Syst.* 1. p. 652.

*In sylvis, nemoribus umbrosis. Bey Pifide im Gehölze, nicht weit von dem Hofe.* Majo. Junio.

*Officin:* Saniculae Herba.

HERACLEUM. L. G. 375.

*Involucr.* caducum. *Flor.* difformes, hermaphroditi; petalis inflexo-emarginatis. *Frukt.* ellipticus compressus, striatus, marginatus.

*Splendy-* 172. HERACLEUM foliis pinnatifidis laevibus, *kum* floribus uniformibus. *Linn. Syst.* 1. p. 686.

*In*

In nemoribus et pratis humidis frequens.  
Julio.

*Officin.* Brancae vrsinae Herba.

OENANTHE. L. G. 382.

*Invol.* uniuers. 1 - polyllum rarius 0. *Flor.*  
subsessiles, difformes: radii masculi. *Sem.*  
subouata, perianthio subulato et pistillis  
coronata.

173. OENANTHE stolonifera, foliis caulinis *fistulosa*  
pinnatis filiformibus fistulosis. *Linn. Syst.*  
1. 699.

In fossis vbique *bey Malchin in den Gräben*  
*am Gerichtsbruch.* Junio.

174. OENANTHE foliis radicalibus cuneatis *pimpinell-*  
fissis, caulinis integris, linearibus, longif- *loides*  
simis, simplicibus. *Linn. Syst.* 1. p. 700.  
*Bey Warnemünde rechts auf einer kleinen In-*  
*sel in einer Pfütze.* Julio.

DAUCUS. L. G. 364.

*Invol.* pinnatifida. *Umb.* fructifera conca-  
vo - connuens. *Flor.* subradiati: radii  
saepe feminei. *Sem.* subouata, pilis hi-  
spida.

175. DAUCUS feminibus hispidis, flosculo cen- *Carex*  
trali carnosio, receptaculo communi he-  
misphaerico. *Linn. Syst.* 1. p. 667.

In dumetis sepibus frequens. Junio. Julio.  
*Officin.* Dauci sylvestris Semina.

TOR-

## TORDYLIUM. L. G. 361.

*Invol.* simplicia: parziale umbella fere longius. *Flor.* radiati hermaphroditi. *Sem.* subrotunda; margine crenata.

*Anthriscus* 176. TORDYLIUM umbellis confertis, foliolis ovato-lanceolatis pinnatifidis. *Linn. Syst.* 1. p. 663.

Ad sepes, dumeta copiose. Junio. Julio.

## CONIUM. L. G. 367.

*Invol.* partial. dimidiata subtriphylla. *Flor.* subuniformes hermaphroditi. *Sem.* gibba subhemisphaerica, costato sulcata.

*maculatum* 177. CONIUM feminibus striatis. *Linn. Syst.* 1. p. 672.

In ruderatis, ad sepes: bey *Malchin an den Zäunen bey der Hellengrund* et alibi. Julio. Augusto.

*Officin.* Conii maculati. f. *Cicutae Störkii* Herba.

## ATHAMANTHA. L. G. 369.

*Invol.* polyphylla. *Flor.* uniformes hermaphroditi. *Pet.* inflexo-emarginata. *Sem.* ovato-oblonga, conuexa, striata.

*Oreoselinum* 178. ATHAMANTHA foliolis diuaticatis. *Linn. Syst.* 1. p. 677.

In apricis siccis: bey *Malchin in der Tanneneide am Schneiderkamp.* Julio.

*Officin:* Oreoselini Radix, Herba.

BUPLEA-

## BUPLEURUM. L. G. 358.

*Invol.* umbellae majora. 5 -phylla. *Flor.* uniformes, hermaphroditi. *Pet.* inuoluta. *Sem.* ouato-oblonga, compressa, striata.

179. BUPLEURUM inuolucris vniuersalibus nul-<sup>rotundifo-</sup>  
lis, foliis perfoliatis. *Linn. Syst.* 4. p. <sup>lium</sup>  
654.

Adaggeres rarius: *bey Malchin vor dem Pfort,*  
*am Ufer des Weges.* Junio, Julio.

*Officin:* Perfoliatae Herba, Semina.

## SIUM. L. G. 378.

*Invol.* polyphylla: vniuers. reflexum. *Flor.*  
uniformes, hermaphroditi. *Sem.* suboua-  
ta, striata.

180. SIUM foliis pinnatis, umbella terminali. <sup>latifolium</sup>  
*Linn. Syst.* 1. p. 693.

In fossis copiose: *bey Malchin in den Gärten*  
*am Gerichtsbruch.* Julio.

181. SIUM foliis pinnatis, umbellis axillari-<sup>angustifo-</sup>  
bus, pedunculatis inolacris, pinnatifidis. <sup>lium</sup>  
*Linn. Syst.* 1. p. 693.

In fossis aquosis: *bey Witzerhof in dem*  
*Graben an der Wiese.* Julio.

## SELINUM. L. G. 368.

*Invol.* reflexum. *Flor.* uniformes, herma-  
phroditi. *Sem.* ouali-oblonga, com-  
presso-plana, medio striata, lateribus  
membranaceis.

182. SELINUM sublaetescens, radice vnica. <sup>palustre</sup>  
*Linn. Syst.* 1. p. 673.

In paludibus: *bey Malchin in dem Ellerbruch am Mühlenteich.* Julio.

*Officin.* Oelsnitii Radix.

ANGELICA. L. G. 377.

*Invol.* partial. polyphylla. Umbellulae globosae. *Flor.* uniformes hermaphroditi. *Sem.* ovata, angulata, marginata sulcis 3-exasperata.

*archangelica*

183. ANGELICA foliorum impari lobato. *Linn. Syst.* 1. p. 691.

*Bey Malchin auf den Wiesen hinter den Peen-Gärten copiose.* Julio.

*Officin:* angelicae Radix, Herba, Semina.

*sylvestris*

184. ANGELICA foliolis aequaliter ovato-lanceolatis ferratis. *Linn. Syst.* 1. p. 691.

In pratis humidis: *bey Malchin auf der Weide bey dem Lalaerberge.* Julio, Augusto.

*Officin:* Angelicae sylvestris Radix.

*b. Involucris partialibus: nec univervali.*

AETHUSA. L. G. 385.

*Involucella* dimidiata, 3 - phylla, pendula.

*Flor.* subuniformes hermaphroditi. *Sem.* subrotunda, sulcata.

*Cynapium*

185. AETHUSA foliis conformibus. *Linn. Syst.* 1. p. 703.

In cultis, agris, frequens aestate.

CHAE.

## CHAEROPHYLLUM. L. G. 388.

*Inuolucella* reflexa, concava. *Flor.* subuni-  
formes, disci masculi. *Sem.* oblonga,  
superne attenuata, laeui.

186. CHAEROPHYLLUM caule striato, genicu- *Syluestre*  
lis tumidiusculis. *Linn. Syst.* 1. p. 708.

In pomariis, pratis, ad sepes, vbique. Majo.  
Junio.

*Officin.* Cicutariae Herba.

187. CHAEROPHYLLUM caule laeui, geniculis *bulbosum*  
tumido, basi hirtio. *Linn. Syst.* 1. p. 709.

In dumetis ad sepes: *bey Malchin an den*  
*Feldzäunen im Mühlenfelde.* Junio.

*Chaerophyllum* caule scabro: geniculis tumidis. *remulentum*  
*Linn. Syst.* 1. p. 709.

Ad sepes, in dumetis, ruderatis vulgare.  
*Bey Malchin an den Gartenzäunen vor dem*  
*Wärgentinschen Thore.* Aestate.

## PHELLANDRIUM. L. G. 393.

*Flor.* subdifformes, hermaphroditi. *Sem.*  
ouata, glabra, leuiter striata, coronata pe-  
rianthio et pistillis.

188. PHELLANDRIUM foliorum ramificationi- *aquaticum*  
bus diuaticis. *Linn. Syst.* 1. p. 701.

In fossis: *bey Malchin in den Gärten am Ge-  
richtsbruch; auch in den Teichen vor dem*  
*Steinthor.* Junio.

*Officin:* Phellandrii Semina.



CICUTA. L. G. 384.

*Umbell.* vniu. et partial. subrotunda. Inuolucella polyphylla, fetosa. *Flor.* vniformes, hermaphroditi. *Styli* corolla longiores, persistentes. *Sem.* subouata, striata.

*virens* 189. CICUTA umbellis oppositifoliis, petiolis marginatis obtusis. *Linn. Syst.* 1. p. 702. In aquis stagnantibus alnetorum: *bey Malchin im Gerichtsbruch* et alibi. Julio.

*Officin.* Cicutae aquaticae Herba.

PASTINACA. L. G. 392.

*Flor.* vnifemes, hermaphroditi. *Sem.* elliptica, compresso-plano-marginata.

*sativa* 190. PASTINACA foliis simpliciter pinnatis. *Linn. Syst.* 1. p. 719.

In Pomariis, versuris, *bey Kessin am Wege an dem hohen Ufer; auch bey Malchin an den Wallgärten.* Julio. Augusto.

*Officin:* Pastinacae Radix, Semina.

AEGOPODIUM. L. G. 398.

*Umb.* vniuersal. conuexa; partial. plana. *Flor.* vniformes, hermaphroditi. *Styli.* longitudine corollulae. *Sem.* ouato-oblonga, gibba, striata.

*Podagra-  
ria* 191. AEGOPODIUM foliis caulinis summis ternatis. *Linn. Syst.* 1. p. 726.

Ad sepes, in pomariis frequens. Junio.

APIUM. L. G. 397.

*Inuolucr.* sub 1-phylo. *Flor.* vniformes: disci masculi. *Sem.* minuta, ouata, striata.

192.

192. *APIUM* foliis caulinis cuneiformibus. *graucolens*  
 umbellis sessilibus. *Linn. Syst.* 1. p. 726.

In fossis aquosis: *bey Malchin am Bollwer-*  
*cke, hinter der Freyarche.* Julio.

*Officin.* Apii Radix, Herba, Semina.

*PIMPINELLA.* L. G. 396.

*Umbellae* ante florescentiam nutantes. *Flor.*

subuniformes, herinaphroditi. *Stigm.*

subglobosa. *Sem.* ouato-oblonga striata.

193. *PIMPINELLA* foliis pinnatis, foliolis ra- *Saxifraga*  
 dicalibus subrotundis; summis linearibus.

*Linn. Syst.* 1. p. 720.

In collibus apricis, pascuis, vulgaris. Julio.  
 Augusto.

*Officin.* Pimpinellae albae Radix, Herba,  
 Semina.

194. *PIMPINELLA* foliis omnibus pinnatis, pin- *diffracta*  
 nis multipartitis, segmentis subfoliatis  
 acutis. *Rez Fasc. Obs.* III. p. 30. n. 46.

In sylvis. *Im Kahldischen Holze, rechts am*  
*Wege; auch bey Malchin im Haynholze.*  
 Julio.

## TRIGYNIA.

a. *Flores superi.*

*VIBURNUM.* L. G. 400.

*Cor.* campanalata, 5-fida. *Bacca* 1-sperma.

195. *VIBURNUM* foliis lobatis petiolis glandu- *Opulus*  
 losis. *Linn. Syst.* 1. p. 734.

In nemorosis subhumidis: *bey Malchin überall in den Ellerbrüchern et alibi.* Majo.

SAMBUCUS. L. G. 402.

Cor. rotato-concaua, 5-fida. 3-sperma.

*Ebulus* 196. SAMBUCUS cymis tripartitis, stipulis foliaceis, caule herbaceo. *Linn. Syst.* 1. p. 736.

In sepibus: *Bey Goshendorf an beyden Seiten.* Junio.

*Officin.* Ebuli Radix, Cortex, Herba, Bacca.

*nigra* 197. SAMBUCUS cymis quinquepartitis, caule arboreo. *Linn. Syst.* 1. p. 337.

In sepibus vbique. Junio.

*Officin.* Sambuci Cortex interior, Folia, Flores, Baccæ.

### b. Flores inferi.

ALSINE. L. G. 411.

Cal. 5-phyllus. Pet. 5. aequalia. Capsul. 1-locularis, polysperma.

*media* 198. ALSINE petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis. *Linn. Syst.* 1. p. 746.

In hortis, agris vbique; aestate.

### TETRAGYNIA.

PARNASSIA. L. G. 415.

Cal. 5-partitus. Pet. 5. Nectar. 5. cordata ciliato-glandulosa. Caps. 4-valuis.

*palustris* 199. PARNASSIA. *Linn. Syst.* 1. p. 749.

In

In pratis humidis et vliginosis: *bey Malchin auf den neuen Rücken; auch bey den Torfgruben*, et alibi. Augusto.

*Officin:* Hepaticae albae Herba, Flores.

PENTAGYNIA.

LINUM. L. G. 419.

Cor. 5-phyllus. Pet. 5. Caps. 5. valuis.  
10-locularis. Sem. solitaria.

200. LINUM calycibus capsulisque mucronatis, *vsitariffi-*  
petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, *mum*  
caule subsolitario. *Linn. Syst.* 1. p. 758.

Ad versuras, in pascuis, inter segetes passim.

Iunio. Iulio. An indegena?

*Officin:* Lini sativi Semina.

201. LINUM foliis oppositis ovato-lanceolatis, *catharti-*  
caule dichotomo, corollis acutis. *Linn. cum*  
*Syst.* 1. p. 765.

In pratis succulentis: *bey Malchin im Hayenholze bey den Sandgruben; auch auf der Weide bey dem Lalaerberge.* Aestate.

*Officin:* Lini cathartici Herba.

202. LINUM foliis oppositis, caule dichotomo, *Radiola*  
floribus tetrandris tetragynis. *Linn. Syst.*  
1. p. 765.

*Bey Malchin so gleich links am Scheidegraben am Wege nach Duckow.* Aestate.

DROSERA. L. G. 421.

Cal. 1-phyllus, 5-fidus. Pet. 5. Capsul.  
1-locularis, apice 5-vuluis, polysperma.

*rotundifolia* 203. DROSERA scapis radicatis, foliis orbiculatis. *Linn. Syst.* 1. p. 766.

In paludosis: *auf dem Moor in der Scheide zwischen dem Malchin und Scharpzeuschen Felde et alibi.*

*Officin.* Roris folis. f. Korellae Herba.

*longifolia* 204. DROSERA scapis radicatis, foliis ovali-oblongis. *Linn. Syst.* 1. p. 766.

*Isdem locis, praelertim bey Malchin hinter dem Eisenberge nach der Peene hin.*

STATICE. L. G. 418.

*Cal.* propr. 1 - phyllus, integer, plicatus, scarious. *Sem.* 1. calyce infundibuliformi vestitum.

*Armeria* 205. STATICE scapo simplici capitato, foliis linearibus. *Linn. Syst.* 1. p. 753.

In pascuis, aggeribus ad Vias: *bey Malchin vorn am Hayenholze.* Julio. Augusto.

## POLYGYNIA.

MYOSURUS. L. G. 426.

*Cal.* 5 - phyllus, supra basin adnatus. *Ne-ctar.* 5. lingulata, petaliformia. *Recept.* longissimum. *Sem.* numerosis tectum.

*minimus* 206. MYOSURUS *Linn. Syst.* 1. p. 778.

In agris, cultis frequens. Majo.

B. MO.

# MONOECIA. DIOECIA. 57

## B. MONOECIA.

XANTHIUM L. G. 1152.

♂ *Cal.* communis imbricatus. *Cor.* composita: propria 1 - petala infundibuliformis. *Filam* coalita. *Recept.* paleaceum.

♀ *Cal.* involucrium 2 - phyllum 2 - florum. *Cor.* o. *styl.* 2. Drupa sicca, muricata, bifida: nucleo biloculari.

207. XANTHIUM caule inermi; foliis cordatis trineruatis. *Linn. Syst.* 4. p. 137. <sup>nm</sup>

In ruderatis frequens. Julio. *Officinis* Xanthii Semina.

## C. DIOECIA.

CANNABIS L. G. 1220.

♂ *Cal.* 5.-partitus. *Cor.* o.

♀ *Cal.* 1-phyllus, oblique patens. *Cor.* o. *Styl.* 2. Nux biualvis intra calycem clausum.

208. CANNABIS foliis digitatis. *Linn. Syst.* *facius* 4. p. 251.

Ad sepes in cultis vbique. Julio. *Officinis.* Cannabis Semina.

HUMULUS. L. G. 1221.

♂ *Cal.* 5-partitus. *Cor.* o.

♀ *Cal.* 1-phyllus, oblique patens. *Cor.* o. *Styl.* 2. *Sem.* 1. intra calycem foliatum.

209. HUMULUS. *Linn. Syst.* 4. p. 252.

*Lupulus*

In sepibus, dumetis frequens. Julio. Augusto. *Officinis.* Lupuli Radix, Turiones Coni f. Strobili.

D 5

D. PO.

# 56. PENTANDRIA POLYGAM.

## D. POLYGAMIA.

ATRIPLEX. L. G. 1260.

♂ *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 0. *Stam.* 5. *Styl.* bipartitus. *Sem.* 1, depressum.

♀ *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* *Styl.* *Sem.* hermaprodit.

*bastata* 210. ATRIPLEX caule herbaceo, calycinis valvulis femineis magnis deltoïdibus, finuatis. *Linn. Syst.* 4. p. 324.

In hortis, ruderatis, ad vias frequens. Julio, Augusto.

*putula* 211. ATRIPLEX caule herbaceo patulo, foliis subdeltoideo-lanceolatis calycibus feminum disco dentatis. *Linn. Syst.* 4. p. 325.

In ruderatis, agris, sepibus vbique. Julio, Augusto.

CLAS-

CLASSIS VI.  
H E X A N D R I A  
M O N O G Y N I A.

A. FLORE HERMAPHRODITO.

*a. Flores calyculati, calyce corrolaque instructi.*

BERBIRIS. L. G. 476.

*Cal.* 6 - phyllus inferus. *Pet.* 6. ad basin glandulis nectariferis 2. *Styl.* 6. *Bacca* 2 - sperma.

212. BERBIRIS pedunculis racemosis. *Linn. vulgaris*  
*Syst.* 1. p. 106.

In sepibus: *bey Malchin an den Gärten vor dem Steinhore* rarius. *Majo.*

*Officin.* Berberis baccae.

*b. Flores spathacei.*

ALLIUM. L. G. 422.

*Spatha* multiflora. *Umbella* congesta. *Cor.* infera. 6 - petala, patens.

\* *Folii* caulinis plantis. *Umbella* bulbifera.

213. ALLIUM caule plantifolio bulbifero, foliis *Scorodo-*  
crenulatis: vaginis ancipitibus, flammii- *prafum*  
bus tricuspidatis, *Linn. Syst.* 2. p. 32. α.

In



In pratis: bey Warnemünde auf der rechten Seite; auch unten am Rostockſchen Stadt-wall zwischen dem Kröpliner und Brandthore. Junio.

carinatum, 214. ALLIUM caule planifolio bulbifero, flaminibus subulatis. Linn. Syst. 2. p. 33.

In montosis nemorosis: am Rande des Holzes bey Pifide an der Scheide nach Goschendorf. Julio.

\*\* Foliis caulinis teretibus umbella bulbifera.

vineale 215. ALLIUM caule teretifolio bulbifero, flaminibus tricuspидatis. Linn. Syst. 2. p. 36.

In pascuis, ad versuras: bey Malchin vor dem Pfort; auch an dem Wege nach Rempſin. Junio. Julio.

### c. Flores nudi inferi.

CONVALLARIA. L. G. 459.

Cor. 6-fida. Bacca ante maturitatem maculata, 3-locularis, 3-sperma.

\* Lilium convallium. Tournef.

maialis 216. CONVALLARIA scapo nudo. Linn. Syst. 2. P. 73.

In nemoribus montosis umbrosis: bey Malchin im Hayenholze. Majo.

Officin. Lilii convallii Flores.

\*\* Po-

\*\* *Polygonata* Tour.

217. CONVALLARIA foliis alternis amplexi-*Polygona-*  
caulibus, caule ancipiti, pedunculis axil-<sup>rum</sup>  
laribus subunifloris. *Linn. Syst. 2. p. 74.*

In syluaticis et nemoribus: *bey Malchin im  
Kahlschen Holze vor dem hohlen Wege* et  
alibi frequens. Majo.

*Officin.* Sigilli Salomonis Radix.

218. CONVALLARIA foliis alternis amplexi-*multiflora*  
caulibus, caule tereti, pedunculis axilla-  
ribus multifloris. *Linn. Syst. 2. p. 74.*

Iisdem locis, praesertim *bey Malchin im  
Hayenholze hinter dem Jägerhause.* Majo.

\*\*\* *Smilax* Tourn.

219. CONVALLARIA foliis cordatis, floribus *bifolia*  
tetrandris. *Linn. Syst. 2. p. 75.*

In syluis vmbrosis copiosissime vbique.  
Majo.

*Officin:* Unifolii Herba.

ANTHERICUM. L. G. 455.

Corall. 6-petala, patens. *Caps.* ouata.

220. ANTHERICUM foliis planis, pistillo de-*Liliago*  
clinato. *Linn. Syst. 2. p. 69.*

*Bey Malchin in der Tannenheyde rechts am  
jessenschen Wege.* Majo, Junio.

Scapus interdum ramosus.

ORNITHOGALUM. L. G. 451.

Cor. 6-petala, erecta, persistens supra me-  
dium patens.

*luscum* 221. ORNITHOGALUM scapo anguloso diphylo, pedunculis umbellatis simplicibus. *Linn. Syst.* 2. p. 53.

In pomariis, cultis, agris vbique. Martio. Aprili.

*minimum* 222. ORNITHOGALUM scapo angulato diphylo, pedunculis umbellatis ramosis. *Linn. Syst.* 2. p. 53.

In agris: bey Malchin auf dem Wargentinschen Felde rarius.

ASPARAGUS. L. G. 457.

Cor. 6 - partita erecta, Styl. breuiffimius. Bacca globosa, 3 - locularis. 6 - sperma.

*officinalis* 223. ASPARAGUS caule herbaceo tereti erecto, foliis fetaceis, stipulis paribus. *Linn. Syst.* 2. p. 68.

In nemoribus syluaticis, in den Tannen bey Witzerhof.

Officin: Asparagi Radix, Baccae, Semina.

#### d. Flores incompleti.

ACORUS. L. G. 468.

Spadix ex margine folii, cylindricus, tectus flosculis. Styl. o. Caps. 3 - locularis.

*Calamus* 224. ACORUS. *Linn. Syst.* 2. p. 92.

In fossis paludosis: bey Malchin vor dem Mühlenthor am Rosengarten. Junio. Julio.

Officin. Calami vulgaris. f. aromatici Radix.

JUN

JUNCUS. L. G. 471.

Cal. 6-phyllus, persistens. Cor. o. Caps.

1-loc.

\* *Culmis nudis.*225. JUNCUS culmo nudo stricto, capitulo late. *conglomeratus*  
rali. Linn. Syst. 2. p. 94.In viginosis: links am Wege nach Dempzin  
vorne in der Bentz. Junio. Julio; rarius.226. JUNCUS culmo nudo stricto, panicula la. *effusus*  
terali. Linn. Syst. 2. p. 94.In viginosis, aquis stagnantibus frequens.  
Junio. Julio.227. JUNCUS culmo nudo, foliis setaceis, ca. *squarrosus*  
pitulis glomeratis, aphyllis. Linn. Syst.  
2. p. 96.In cespitosis: bey der Rostocher Fehre rechts  
auf der Wiese; rarius. Junio.\*\* *Culmis foliosis.*228. JUNCUS foliis nodoso-articulatis, petalis *articulatus*  
obtusis.α. Juncus articulatus aquaticus, foliis articula-  
tis compressis panicula semel ramosa. Hall.  
heluet. 1322.

β. Juncus viviparus. Weigel p. 222.

γ. Juncus articul. syluaticus fol. teretibus ar-  
ticulatis, panicula repetito-ramosa Hall.  
heluet 1323.α. In pratis vbique: bey Malchin auf dem  
Bornberge copiose. β. auf der Weide  
bey

bey dem Lalaerberge. γ. in dem Graben  
bey Witzerkoff. Junio. Julio.

*bulbosus* 229. JUNCUS foliis linearibus canaliculatis,  
capsulis obtusis. Linn. Syst. 2. p. 97.

Abundat in pratis et pascuis humidis. Ju-  
nio, Julio.

*buxifolius* 230. JUNCUS culmo dichotomo, foliis angu-  
latis, floribus solitariis sessilibus. Linn.  
Syst. 2. p. 98.

α. Gramen nemorosum, calyculis palea-  
ceis, erectum. Scheuchz. gram. 327.

β. Gramen nemorosum calyculis paleaceis,  
species altera procerior. l. c. 328.

α. In humidis vbique. β. in nemorosis:  
praesertim bey Pifide im Holze an der  
Brücke bey dem Walmstorffer Soll.

*senecioides* 231. JUNCUS annuus, culmo ramoso panicu-  
lato, floribus solitariis sessilibus, petalis  
ovato-oblongis, capsula subglobosa. Linn.  
Suppl. p. 208.

Iisdem locis ni fallor. Locus proprius in me-  
moriā non redit.

*capitatus* 232. JUNCUS foliis setaceis, capitulo termi-  
nali alarique subfoliosis, petalis acutis in-  
tegris, pericarpio aequantibus. Weigel  
observ. 28. t. 3. f. 5.

In subhumidis: bey Malchin sogleich hinter  
dem Scheidegraben links am Duskowschen  
Wege; auch auf dem Tannenkamp an dem  
Wege nach Lipen. Junio. Julio.

233. *Juncus foliis planis pilosis corymbo ramoso. Linn. Syst. 2. p. 100.*

Abundat in nemoribus, Majo. JUNIO.

234. *Juncus foliis planis subpilosis, spicis campestris sessilibus pedunculatisque. Linn. Syst. 2. p. 101.*

In siccis vbique: *bey Malchin am Hayenholze*, cum varietatibus frequens. Aprili. Majo.

PEPLIS L. G. 482.

*Cal. campanulatus: ore 12-fido; sed 6. minutissima, fugacissima, calyci inserta. Caps. 2-locularis.*

235. *PEPLIS floribus apetalis. Linn. Syst. 2. Portula p. 112.*

In paludosis: *bey Malchin auf dem Gerichts bring hinc inde in den Löchern; in den Löchern bey den Scheiben - Pfosten rarius.* Julio. Augusto.

## TRIGYNIA.

TRIGLOCHIN. L. G. 488.

*Cal. 3-phyllus. Pet. 3. calyciformia. Styl. o. Stigmata. 3-f. 6, Capsul. basi dehiscens.*

236. *TRIGLOCHIN, capsulis trilocularibus palustre sublinearibus. Linn. Syst. 2. p. 125.*

In pratis humidis: *bey Malchin auf den Dammsiesen et alibi frequens.* Junio.

*maritimum* 237. TRIGLOCHIN capsulis sexlocularibus ovatis. *Linn. Syst. 2. p. 126.*

Cum praecedente, praesertim *am Pfort bey Malchin.* Julio.

RUMEX. L. G. 485.

*Cal.* 3-phyllus. *Pet.* 3-conniuentia. *Sem.* 1. triquetrum, in coralla coniuente.

\* *Hermaphroditi: valvulis granulo notatis.*

*crispus* 238. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integris graniferis, foliis lanceolatis undulatis acutis. *Linn. Syst. 2. p. 115.*

In humidiusculis, ad pagos: *bey Malchin am langen Damm* frequens. Junio.

*nemolapathum* 239. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis linearibus obtusis integerrimis graniferis, verticillis remotis, ramis patentibus, foliis infexioribus cordato-lanceolatis subundulatis basi integris. *Linn. Suppl. p. 212.*

In pascuis humidis. *An den Gartenzäunen vor dem Steinthor an der linken Seite bey Malchin et alibi.* Julio. Augusto.

*maritimus* 240. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis linearibus. *Linn. Syst. 2. p. 117.*

In palustribus: *bey Malchin am Pfort; auch am Damm vor dem Steinthor.* Junio.

241. RUMEX floribus hermaphroditis: valuu- *acutus*  
lis dentatis graniferis, foliis cordato-ob-  
longis acuminatis. *Linn. Syst. 2. p. 117.*

Abundat in humidis. Junio.

*Officin:* Lapathi acuti Radix.

**\*\* Hermaphroditi: valvulis grnnulo desti-  
tutis, f. nudis.**

242. RUMEX floribus hermaphroditis: valuu- *aquaticus*  
lis intergerrimis nudis, foliis cordatis  
glabris acutis. *Linn. Syst. 2. p. 119.*

In fossis: *beg Malthin in dem Graben am Pfort;*  
*auch in den Teichen vor dem Steinthore.*  
Junio. Julio.

**\*\*\* Floribus diclinis.**

243. RUMEX floribus dioicis, foliis oblongis *acetosa*  
sagittatis. *Linn. Syst. 2. p. 122.*

In pomariis, sylvis, pratis vulgaris. Majo.

*Officin:* Acetosae nostratis Radix, Semina.  
Majo.

244. RUMEX floribus dioicis, foliis lanceola- *acetosella*  
to-hastatis. *Linn. Syst. 2. p. 123,*

In aruis, sylvis, pascuis abunde. Majo.  
Junio.

SCHEUCHZERIA. L. G. 487.

*Cal. 6.-partitus. Cor. o. Capsulae 3. 4.*  
*inflatae 1-spermae.*

245. SCHEUCHZERIA. *Linn. Syst. 2. p. 126. palustris*



*In dem Soll zwischen der Malchin - und Leuschentinschen Feldscheide; auch in dem andern Soll in der Scharpzwowschen Scheide; ferner auf dem Moor bey der Gültzer Ziegeley. Aprili. Majo.*

## POLYGYNIA.

ALISMA. L. G. 495.

*Plantago  
aquatica*

- 246 ALISMA foliis ovatis acutis, fructibus obtuse trigonis. *Linn. Syst. 1. p. 132.*

*In aquosis ad fossas frequens: bey Malchin am langen Damm. Julio.*

*natans*

247. ALISMA foliis ovatis obtusis pedunculis folitariis. *Linn. Syst. 2. p. 133.*

*Bey Lipen in den Tannen auf dem alten Moor; auch vor dem Kreuzwege. Junio. Julio.*

## GYNANDRIA HEXAGYNIA.

ARISTOLOCHIA. L. G. 1111.

*Cal. o. Cor. 1 - petala, lingulata integra. Caps. 6 - locularis infera.*

*Clematidis*

248. ARISTOLOCHIA foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis. *Linn. Syst. 4. p. 61.*

*Ad sepes: bey Malchin an den Gärten vor dem Steinthor. Junio. Julio.*

CLAS-

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA  
MONOGYNIA.

TRIENTALIS. L. G. 496.

*Cal.* 7-phyllus. *Cor.* 7-partita aequalis,  
plana, stellata, *Bacca* capsularis exsucca.

249. TRIENTALIS foliis lanceolatis integerri- *europaea*  
mis. *Linn. Syff.* 2. p. 136.

In syluaticis, apud nos rarius; vnicum speci-  
men in itinere tertio Chloridi sacro ad  
littora maris baltici Anno 1787. instituto,  
mihi occurrit: *auf dem Büchenberge bey*  
*Dobberan.* Amicissimus Dn. Dethardin-  
gius, Rosstochiensis, harum rerum indaga-  
tor indefessus, copiosius habuit in tractu  
Ribnicensi. Majo. Junio.

---

**CLASSIS VIII.**  
**OCTANDRIA**  
**MONOGYNIA.**

**A. FLORE HERMAPHRODITO.**

EPILOBIUM. L. G. 507.

*Cal.* 4-phyllus, superus, *Pet.* 4. *Capsul.* oblonga, 4-locularis. *Sem.* paposa.

*birsutum* 250. EPILOBIUM foliis alternis lanceolato-ouatis, floribus inaequalibus. *Linn. Syst.* 2. p. 152.

In fossis *bey Pifide* et alibi abunde. Julio.

*montanum* 251. EPILOBIUM foliis oppositis, ouatis dentatis. *Linn. Syst.* 2. p. 152.

In sylvis montosis: *bey Malchin im Hayenholze* passim. Julio.

*palustre* 252. EPILOBIUM foliis oppositis lanceolatis, integerrimis, petalis emarginatis, caule erecto. *Linn. Syst.* 2. p. 153.

In nemorosis humidis, fossis frequens: *bey Malchin in den Gräben vor dem Steinhore* passim. Julio.

VACCINIUM. L. G. 523.

*Cal.* superus. *Cor.* 1-petala. *Filam.* receptaculo inserta. *Anth.* bicornes. *Bacca* polysperma.

• *Fo.*

\* *Foliis annotinis f. deciduis.*

253. VACCINIUM pedunculis vnifloris, foliis *myrtillus* ferratis ouatis deciduis, caule angulato.  
*Linn. Syst. 1. p. 164.*

In syluaticis et nemoribus umbrosis: *bey Malchin im Hayenholze rechts am Clavierwege* et alibi frequens. Majo,  
*Officin. Myrtill Folia, Baccae.*

254. VACCINIUM pedunculis vnifloris, foliis *vliginosum* integerrimis obouatis obtusis lacuibus.  
*Linn. Syst. 2. p. 165.*

In *vliginosis: bey Grammentin in dem Holze in dem grossen Moor.* Majo. Junio.

\*\* *Foliis semper virentibus.*

255. VACCINIUM foliis integerrimis reuolutis *oxicoccos* ouatis, caulibus repentibus filiformibus nudis. *Linn. Syst. 2. p. 167.*

In paludosis Sphagno repletis. *In dem Moor zwischen Malchin und Scharpzwow* et alibi. Majo. Junio.

ERICA. L. G. 524.

*Cal. 4-phyllus, inferus, coloratus. Cor. 1-petala 4-fida. Filam. receptaculo inserta. Anth. bifidae. Capsul. 4-ocularis.*

256. ERICA antheris aristatis corollis campanulatis, subaequalibus, calycibus duplicatis foliis oppositis sagittatis. *Linn. Syst. 2. p. 168.* *vulgata*

E 4

In

In campestribus. In den Tannen bey Witzers-  
hoff copiosissime. Variat floribus rubris et  
albis. Augusto.

Officin. Ericae Herba.

### TRIGYNIA.

POLYGONUM. L. G. 537.

Cal. o. Coroll. 5-partita, calycina: Sem.  
1. triquetrum, nudum.

\* *Bistorta, spica unica.*

*bistorta* 257. POLYGONUM caule simplicissimo mono-  
stachio, foliis ovatis in petiolum decur-  
rentibus. Linn. Syst. 2. p. 204.

In pratis humidis: bey Malchin auf der Wei-  
de bey dem Lalaerberge. Majo. Junio.

Officin. Bistortae Radix.

\*\* *Perficariae pistillo bifido, aut stamina  
minus 8.*

*amphibium* 258. POLYGONUM floribus pentandris semidi-  
gynis, spica ovata. Linn. Syst. 2. p. 205.

α. P. aquaticum.

β. terrestre.

α. In fossis, piscinis. β. in pascuis et cul-  
tis: bey Malchin in den Teichen vor dem  
Steinthor β. vor und in den Peengarten co-  
piose, aestate.

*hydropiper* 259. POLYGONUM floribus hexandris semidi-  
gynis, foliis lanceolatis, stipulis submu-  
ticis. Linn. Syst. 2. p. 206.

Is

In fossis, sylvis, aquis stagnantibus abunde  
Julio, Augusto.

260. POLYGONUM, floribus hexandris digy- *Perficaria*  
nis, spicis ovato-oblongis, foliis lanceo-  
latis, stipulis ciliatis. *Linn. Syst. 2. p.*  
207.

In subhumidis, cultis agris, copiosissime.  
Julio. Augusto.

\*\*\* *Polygonum foliis indivisis, floribus*  
*octandris.*

261. POLYGONUM floribus octandris trigynis *auiculare*  
axillaribus, foliis lanceolatis caule pro-  
cumbente herbaceo. *Linn. Syst. 2. p.*  
209.

Ad vias, in plateis, cultis pro foli natura  
varians. Aestate.

*Officin. Centumnodiæ Herba.*

\*\*\*\* *Helxine foliis subcordatis.*

262. POLYGONUM foliis cordatis, caule volu- *Convolvulus*  
bili angulato, floribus obtusatis. *Linn.*  
*Syst. 2. p. 213.*

Ad sepes, in hortis: *bey Malchin an Hecken*  
*und Gartenzäunen.* Julio. Augusto.

263. POLYGONUM foliis cordatis, caule vo- *dumetorum*  
lubili laeui, floribus carinato-alatis. *Linn.*  
*Syst. 2. p. 213.*

Ad pagos, sepes, in sylvis: *bey Malchin im*  
*Hayenholze bey dem Jägerhause et alibi*  
*frequens.* Julio. Augusto.

E §

TETRA-

## TETRAGYNIA.

ADOKA. L. G. 543.

*Cal.* 2 - fidus, inferus. *Cor.* 4. f. 5 - fida, supera. *Bucca* 4. f. 5 - locularis inter calycem et corollam.

*Moschatel* 264. ADOKA. *Linn. Syst.* 2. p. 222.

*lina*

In nemoribus. *Im Hayenholze, auch auf dem Wall bey Malchin, et alibi frequens.* Aprili.

## D. DIOECIA.

POPULUS. L. G. 1228.

♂ *Cal.* amentum laxè imbricatum squamis laceris. *Cor.* o. *Nest.* turbinatum obliquum, integrum. *Stam.* 8 - 16.

*alba*

265. POPULUS foliis subrotundis, dentato-angulatis, subtus tomentosis. *Linn. Syst.* 2. p. 262.

Ad pagos, in sylvis: *bey Pifide am Berge, im Holze et alibi rarius.* Martio. Aprili.

*cremula*

266. POPULUS foliis subrotundis, dentato-angulatis, vtrinque glabris. *Linn. Syst.* 4. p. 262.

In nemorosis succulentis et aridis vbique. Martio.

*nigra*

267. POPULUS foliis deltoidibus acuminatis serratis. *Linn. Syst.* 4. p. 263.

Ad prata in sylvis: *bey Malchin an der Krebmühle, auch im Holze bey Pifide.* Martio, Aprili. *Officin:* Populi oculi (gemmae rectius.)

POLY.

## E. POLYGAMIA.

ACER., L. G. 1266.

♀ *Cal.* 5 - fidus. *Pet.* 5. *Stam.* 8. *Pistil.*1. *Capf.* 2. rarius 3, 1 - spermae alatae.♂ *Cal.* *Cor.* *Stam.* hermaphroditi.268. ACER foliis quinquelobis inaequaliter serratis, floribus racemosis. *Linn. Syst.* 4.

p. 331.

In syluaticis montosis: bey *Pifide* im Holze  
auf dem ersten Berge passim. Majo.

269. ACER foliis quinquelobis acuminatis, aculeatis, glabris; floribus corymbosis.

*Linn. Syst.* 4. p. 332.In syluaticis: im *Remplinschen* Holze am Wege  
nach *Mistorf* et alibi passim culta.  
Majo.270. ACER foliis lobatis, obtusis, emarginatis *Pseudoplatanus*  
*Linn. Syst.* 4. p. 333.In dumetis, sepibus: bey *Malchin* auf dem  
Wall et alibi frequens. Majo.



## CLASSIS IX.

## ENNEANDRIA

## HEXAGYNIA.

## A. FLORE HERMAPHRODITO.

BUTOMUS. L. G. 550.

*Cal.* o. nisi Inuolucrum velis. *Pst.* 6: alternis maioribus. *Capsf.* 6. polyspermae.

*umbellatus* 271. BUTOMUS. *Linn. Syst.* 2. p. 233.

In fossis et piscinis: in den Gräben am langen Damm bey Malchin. Julio.

## B. DIOECIA.

MERCURIALIS. L. G. 1230.

♂ *Cal.* 3-partitus. *Cor.* o. *Stam.* 9. f. 12.

♀ *Cal.* et *Cor.* maris. *Styl.* 2. *Capsf.* didyma bilocularis 1-sperma.

*nua* 272. MERCURIALIS caule brachiato, foliis glabris; floribus spicatis. *Linn. Syst.* 4. p. 265.

In hortis: vnicum exemplar legi im remplichen Garten. Aestate.

*Officinis:* Mercurialis Herba, Semina.

CLAS.

CLASSIS X.  
 DECANDRIA  
 MONOGYNIA.

A. FLORE HERMAPHRODITO.

MONOTROPA. L. G. 583.

*Cor.* 0. nisi Petala exteriora calycem ditas.

*Pet.* 10. opice ferrata, 5. exteriora: basi  
 excavato-mellifera. *Capf.* 5-valuis.

274. MONOTROPA floribus lateralibus octan- *Hypopitrys*  
 dris; terminali decandro. *Linn. Syst.* 2.  
 p. 280.

In nemoribus umbrosis. *Im Holze bey Pif-*  
*de et alibi passim. Aestate.*

PYROLA. L. G. 598.

*Cal.* 5-partitus, persistens. *Pet.* 5. *Anth.*  
 sursum bicornes. *Capf.* 5-locularis, an-  
 gulis dehiscens.

275. PYROLA flaminibus adscendentibus, pi- *retundifo-*  
 stillo declinato. *Linn. Syst.* 2. p. 299. *lia*

In nemoribus umbrosis, *in der Gilowsthen*  
*Bentz an dem Graben bey der Koppel.*  
*Junio.*

*Officin.* Pyrolae Herba.

- minor* 276. *Pyrola* floribus racemosis dispersis, staminibus pistillisque rectis. *Linn. Syst.* 2. p. 299.  
In sylvis: bey Malchin im Hayenholze; auch bey Pifide frequens. Junio. Julio.
- secunda* 277. *Pyrola* racemo unilaterali. *Linn. Syst.* 2. p. 300.  
Iisdem locis. Junio. Julio.
- umbellata* 278. *Pyrola* pedunculis subumbellatis. *Linn. Syst.* 2. p. 300.  
In nemoribus: bey Malchin im Hayenholze gleich vorne links am Wege nach Jessin. Junio. Julio.
- uniflora* 279. *Pyrola* scapo uniflora. *Linn. Syst.* 2. p. 300.  
In nemoribus: In der Gelowfchen Bentz bey der Koppel. Junio. Julio.  
LEDUM. L. G. 591.  
Cal. 5 - fidus, minimus. Cor. 5 - partita, plana. Capsul. 5 - locularis basi dehiscens.
- palustre* 280. LEDUM. *Linn. Syst.* 2. p. 289.  
In syluaticis vliginosis: auf dem Moor bey der Gölitzer Ziegeley copiose. Junio. Julio.  
Officin: Rosmarini sylvestris Herba.  
ADROMEDA. L. G. 593.  
Cal. 5 - partitus. Cor. ovata: ore 5 - fido. Capsula 5 - locularis.

281. *ANDROMEDA* pedunculis adgregatis, corollis ovatis, foliis alternis lanceolatis revolutis. *Linn. Syst.* 2. p. 293.

In paludibus turfosis: *bey Malchin in den Mooren die in der Scheide im Mühlenfelde find.* Majo. Junio.

DIGYNIA:

*SCLERANTHUS*. L. G. 611.

*Cal.* 5-fidus, persistens. *Cor.* o. *Sem.* 1. in fundo calycis:

282. *SCLERANTHUS* calycibus, fructus patulis. *annuus*  
*Linn. Syst.* 2. p. 323.

In aridis et agris vulgaris. Aestate.

283. *SCLERANTHUS* calycibus fructus clausis. *perennis*  
*Linn. Syst.* 2. p. 323.

In campis, collibus aridis frequens. Majo. Junio.

*CHRYSOSPLENIUM*. L. G. 607.

*Cal.* 4-5-fidus, coloratus, persistens. *Cor.* o. *Capsul.* birostris 1-lacularis polysperma.

284. *CHRYSOSPLENIUM* foliis alternis. *Linn. alternifolium*  
*Syst.* 2. p. 307.

In nemorosis humidis: *bey Witzerhoff in dem Euerbruch.* Aprili.

*Officin:* *Chrysosplenii* f. *Nasturtii petraei* Herba.

SAXI.

SAXIFRAGA. L. G. 608.

*Cal.* 5 - partitus. *Pet.* 5. *Capf.* birostris  
1 - locularis polysperma.

*hirculus* 285. SAXIFRAGA foliis caulinis lanceolatis alternis nudis inerimibus, caule erecto.  
*Linn. Syst.* p. 316.

In humidis turfosis: *bey Malchin auf der Weide bey dem Lalaerberge.*

*granulata* 286. SAXIFRAGA foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoso, radice granulata.  
*Linn. Syst.* 2. p. 317.

In collibus graminosis; *bey Malchin vor dem Hayenholze.* Majo.

*Officin:* Saxifragae, Radix, Herba, Flores.

*tridactylites* *Saxifraga* foliis caulinis reniformibus trifidis alternis, caule erecto ramoso. *Linn. Syst.* 2. p. 319.

In montibus graminosis: *bey Malchin auf dem Lalaerberge; auch am Berge vor dem Hayenholze.* Aprili. Majo.

GYP SOPHILA. L. G. 612.

*Cal.* 1 - phyllus, campanulatus angulatus. limbo. 5 - partito. *Pet.* 5 ovata subsessilia. *Capful.* globosa, 1 - locularis 5 - valvis, polysperma.

*muralis* 287. GYP SOPHILA foliis linearibus planis, calycibus aphyllis, caule dichotomo petalis crenatis. *Linn. Syst.* 2. p. 327.

In arvis frequens. Augusto. Septembri.

DIAN-

## DIANTHUS. L. G. 614.

*Cal.* 1 - phyllus cylindricus tubulosus; basi squamosus. *Pet.* 5 unguiculata. *Capful.* cylindrica 1-locularis, polysperma.

\* *Flores aggregati.*

288. DIANTHUS floribus subaggregatis: squamis calycinis ouatis aristatis tubum subaequantibus, foliis trineruiis. *Linn. Syst.* 2, p. 332. *carthusianorum*

In campis apricis, collibus: *bey Malchin vor dem Berge am Hayenholze.* Aestate.

*Officin.* Tunicae fylvestris Flores.

289. DIANTHUS floribus aggregatis fasciculatis, squamis calycinis lanceolatis villosis tubum aequantibus. *Linn. Syst.* 2. p. 333. *Armeria*

In nemoribus montosis. *Im Scheidegraben zwischen Malchin und Duckow.* Junio. Julio.

290. DIANTHUS floribus aggregatis capitatis: squamis calycinis ouatis obtusis muticis, tubum superantibus. *Linn. Syst.* 2. p. 333. *prolifer*

In collibus ficcis rarius: *bey Malchin an dem Ufer vor dem Pfort.* Julio. Augusto.

\*\* *Flores solitarii, plures in eodem caule.*

291. DIANTHUS floribus solitariis: squamis deltoideis calycinis lanceolatis binis, corollis crenatis. *Linn. Syst.* 2. p. 335.

In collibus, pascuis: *bey Malchin an dem Berge hinter dem Pfort. Aestate.*

*superbus*

292. DIANTHUS floribus paniculatis: squamis calycinis brevioribus acuminatis, corollis multifido - capillaribus, caule erecto. *Linn. Syst. 2. p. 337.*

In pratis humidis turfosis: *bey Malchin auf der Wiese bey dem Lalaerberge. Julio. Augusto.*

### TRIGYNIA.

ARENARIA. L. G. 618.

*Cal.* 5-phyllus, patens. *Pet.* 5. integra  
*Capsul.* ovata 1-locularis polysperma.

*erincuia*

293. ARENARIA foliis ovatis, acutis petiolatis nervosis. *Linn. Syst. 2. p. 364.*

In arvis, nemorosis et sylvis frequens. *Majo. Junio.*

*serpyllifolia*

294. ARENARIA foliis subovatis acutis sessilibus, corollis calyce brevioribus. *Linn. Syst. 2. p. 361.*

In arvis, cultis, glareosis: *bey Malchin auf magern Aeckern; auch auf der Kirchhoffsmauer vor dem Steinthor. Majo. Junio.*

*rubra*

295. ARENARIA foliis filiformibus, stipulis membranaceis vaginantibus. *Linn. Syst. 2. p. 362.*

*α. A. rubra campestris.*

*β. — marina.*

Habi-

Habitat. *α.* in arenosis campestribus: *auf dem Tannenkamp wo der Weg nach Lepin abgehet.* *β.* ad littora maris baltici: *bey Warnemünde passim. Aestate.*

296. ARENARIA foliis ouatis acutis carnosiss. *peplioides*  
Linn. Syst. 2. p. 359.

Ad littora maris: *bey Warnemünde copiose.*  
Aestate.

STELLARIA. L. G. 617.

Cal. 5 - phyllus, patens. Pet. 5 - bipartita  
patentia. Capsul. 1 - locularis, poly-  
sperma.

297. STELLARIA foliis lanceolatis ferrulatis, *holostea*  
petalis bifidis. Linn. Syst. 2. p. 357.

In Versuris: *am Wege nach Remplin.* Majo.

298. STELLARIA foliis linearibus integerrimis, *graminea*  
floribus paniculatis. Linn. Syst. 2. p. 357.

In sepibus, dumetis, aruis, cum varietatibus,  
frequens. Majo. Junio.

299. STELLARIA foliis ouato-lanceolatis *sef. crassifolia*  
filibus integerrimis crassiusculis glabris, pe-  
dunculis solitariis foliis calycinis ouato-  
lanceolatis, petalis multo brevioribus.  
Ehrharts *Hannöversches Magazin.* 8tes  
Stück. 1784.

In pratis aquosis: *bey Malchin auf der Wiese*  
*hinter dem Jägerhause.* Junio.

300. STELLARIA Murray Prodr. def. Stirp. *uliginosa*  
Götting. p. 55.



*Alfine* foliis lanceolatis, petalis bipartitis,  
petiolis unifloris Hall. Hist. n. 881.

In vliginosis: *im Kahldischen Holze am Graben  
auf dem Moor bey der Schlossstelle.* Ma-  
jo et Junio.

CUCUBALUS. L. G. 615.

*Cal.* inflatus 5-dentatus. *Pet.* 5. vnguicula-  
ta, absque corona faucis. *Capsf.* 3-locu-  
laris, polysperma.

*Behen* 301. CUCUBALUS calycibus subglobosis glabris  
reticulato-venosis, capsulis trilocularibus,  
corollis subnudis. *Linn. Syst.* 2. p. 340.

In pratis: *bey Malchin am Lalaerberge am  
Acker.* Majo. Junio.

*Officin:* Behen alibi Radix.

*Orites* 302. CUCUBALUS floribus dioicis, petalis li-  
nearibus indivisis. *Linn. Syst.* 4. p. 343.

In sylvis: *bey Pifde im Holtze am Kahldi-  
schen Wege, rechts.* Majo. Junio.

SILENE. L. G. 616.

*Cal.* ventricosus, 5-dentatus. *Pet.* 5. saepe  
bifida, fauce coronata denticulis. *Capsul.*  
3-locularis, polysperma.

*nutans* 303. SILENE petalis bifidis, floribus lateralibus  
secundis cernuis, panícula nutante. *Linn.*  
*Syst.* 2. p. 347.

In nemorosis montosis: *bey Malchin an den  
jungen Tannen et alibi frequens.* Majo.  
Junio.

PEN.

## PENTAGYNIA.

SEDUM. L. G. 629.

*Cal.* 5-fidus. *Pet.* 5. *Nectar.* squamae 5.  
ad basin germinorum. *Capitul.* 5. poly-  
spermae.

\* *Planifolia.*

304. SEDUM foliis planiusculis ferratis, co- *Telephium*  
rimbo folioso, caule erecto. *Linn. Syst.*  
2. p. 380.

In ficcis agris: *auf den Bergen bey Goschen-*  
*dorff.* Augusto.

*Officin:* Thelephii Radix.

\*\* *Teretifolia.*

305. SEDUM foliis subulatis sparsis, basi solu- *reflexum*  
tis, inferioribus recurvatis. *Linn. Syst.* 2.  
p. 382.

In montosis ficcis: *bey Witzerhoff an dem*  
*Sandberge hinter den jungen Tannen.* Junio.  
Julio.

306. SEDUM foliis subovatis adnato-fessilibus *acre*  
gibbis erectiusculis alternis, cyma trifida.  
*Linn. Syst.* 2. p. 384.

In<sup>3</sup> ficcis, collibus, muris, vbique. Junio.  
*Officin:* Sedi minoris, Herba.

307. SEDUM foliis subovatis adnato-fessilibus *sexangu-*  
gibbis erectiusculis sexfariam imbricatis. *lare*  
*Linn. Syst.* 2. p. 384.

In siccis apricis cum praecedente: *an dem Wege nach der Gilowfchen Mühle* et alibi frequens. Junio. Julio.

SPERGULA. L. G. 638.

*Cal.* 5 - phyllus. *Pét.* 5. integra. *Capsul.* ouata, 1 - locularis. 5 - valuis.

*aruenfis* 308. SPERGULA foliis verticillatis, floribus decandris. *Linn. Syst.* 2. p. 403.

In aruis, agris: *hinter dem Jägerhause* copiose. Aestate.

*nodosa* 309. SPERGULA foliis oppositis fabulatis laevibus, caulibus simplicibus. *Linn. Syst.* 2. p. 404.

In pratis humidis: *bey Malchin auf dem neuen Rücken* et alibi frequens. Julio. Augusto.

CERASTIUM. L. G. 637.

*Cal.* 5 - phyllus. *Pét.* bifida. *Caps.* 1 - locularis, apice 5 - dentato dehiscens.

\* *Capsulis oblongis.*

*vulgatum* 310. CERASTIUM foliis ouatis, petalis calyci aequalibus, caulibus diffusis. *Linn. Syst.* 2. p. 398.

In pratis, hortis, pomariis frequens. Majo. Junio.

*semidecandrum* 311. CERASTIUM floribus pentandris, petalis emarginatis. *Linn. Syst.* 2. p. 399.

In sterilibus, apricis, campis, aggeribus vulgatissimum. Aprili. Majo.

313.

312. CERASTIUM foliis lineari-lanceolatis obtusis glabris, corollis calyce majoribus. *arvense*  
*Linn. Syst. 2. p. 400.*

Ad vias: *am Wege bey dem Malchinschen Jägerhause* et alibi frequens. Majo.

**\*\* Capsulis subrotundis.**

313. CERASTIUM foliis cordatis sessilibus, floribus solitariis, fructibus pendulis. *aquaticum*  
*Linn. Syst. 2. p. 402.*

In fossis abundat vbique. Julio. Augusto.

AGROSTEMMA. L. G. 635.

Cal. 1 - phyllus, tubulosus, coriaceus, 5-dentatus. *Pet. 5. vnguiculata*, limbo patente obtuso. *Capsul. oblongo-ouata*, 1 - locularis. 5 - valvis, polysperma.

314. AGROSTEMMA hirsuta, calycibus corollam aequantibus, petalis integris nudis. *Githago*  
*Linn. Syst. 2. p. 393.*

In agris inter segetes vbique. Junio.

*Officin:* Lolii officinarum Semina.

LYCHNIS. L. G. 636.

Cal. 1 - phyllus, oblongus, membranaceus, 5-dentatus. *Pet. 5, vnguiculata*, limbo subbifido. *Capsul. subouata polysperma.*

315. LYCHNIS petalis quadrifidis, fructu sub-flos cuculi rotundo. *Linn. Syst. 2. p. 395.*

In pratis humidiusculis copiose. Majo.

316. LYCHNIS petalis integris. *Linn. Syst. 2. p. 396.* *viscaria*

Ad fepes, in pratis: *am Scheidegraben zwischen Malchin und Bafedow; auch am Pfort.*

*dioica* 317. *LYCHNIS floribus dioicis.* *Linn. Syst.* 1. p. 397.

*α.* *L. fyluestris, seu aquatica purpurea simplex.* *Bauhin Pin.* 204.

*β.* *L. fyluestris alba simplex ibidem.*

Ad pagos, fepes, aggeres frequens. *Majo. Junio.*

*OXALIS. L. G.* 634.

*Cal.* 5-partitus, *Cor.* 5-partita, vnguibus cohaerens. *Capsf.* 5-gona, 5-locularis, angulis dehiscens.

\* *Scapo radicali.*

*Acetofella* 318. *OXALIS* scapo vnifloro, foliis ternatis obcordatis, radice dentata. *Linn. Syst.* 2. p. 388.

In nemoribus: *im Hayenholze bey Malchin et alibi copiose.* *Aprili.*

*Officin:* *Acetofellae Herba.*

\*\* *Foliis caulinis alternis.*

*corniculata* 319. *OXALIS* corniculata pedunculis vmbelliferis, caule ramoso diffuso. *Linn. Syst.* 2. p. 392.

In hortis et cultis vbique. *Junio.*

CLAS-

## CLASSIS • XI.

## D O D E C A N D R I A

## M O N O G Y N I A.

## FLORE HERMAPHRODITO.

LYTHRUM. L. G. 660.

*Cal.* 12 - dentatus, denticulis alternis minoribus. *Pet.* 6. calyci inserta. *Capsf.* 2 - locularis, polysperma.

320. LYTHRUM foliis oppositis, cordato-lanceolatis, floribus spicatis dodecandris. *Salicaria*  
*Linn. Syst.* 2. p. 426.

In fossis frequens. Julio.

*Officin.* Salicariae f. Lyfimachiae purpureae  
Herba, Flores.

## DIGYNIA.

AGRIMONIA. L. G. 663.

*Cal.* 5 - fidus, superus, persistens, altero obvallatus. *Pet.* 5. *Sem.* 2.

321. AGRIMONIA foliis caulinis pinnatis: im-  
pari petiolato, fructibus hispidis. *eupatoria*  
*Linn. Syst.* 2. p. 430.

Ad vias, versuras, sepes frequens. Aestate.

*Officin.* Agrimoniae Herba.

## TRIGYNIA.

RESEDA. L. G. 664.

*Cal.* 1 - phyllus, partitus. *Pet.* inaequalia, nonnulla laciniata. *Capsf.* 1 - locularis, hians.

*Luteola* 322. RESEDA foliis, lanceolatis integris, basi vtrinque unidentatis, calycibus quadrifidis. *Linn. Syst.* 2. p. 431.

In ruderalis pomariis ad sepes: *bey Rostock vor dem Kröpliner Thor; auch in Kessin an den Zäunen.* Julio. Augusto.

*lutea* 323. RESEDA foliis omnibus trifidis: inferioribus pinnatis, *Linn. Syst.* 2. p. 433.

Ad vias: *auf der Ebene vor Warnemünde rarius.* Aestate.

EUPHORBIA. L. G. 665.

*Cal.* 1 - phyllus, ventricosus. *Pet.* 4 - crafiuscula, calyci infidentia. *Capsf.* 3 - cocca.

\* *Umbella trifida.*

*Peplus* 324. EUPHORBIA umbella trifida, dichotoma, involucellis ovatis, foliis integerrimis obovatis petiolatis. *Linn. Syst.* 2. p. 444.

In cultis oleraceis vulgaris. Augusto. Septembri.

\*\* *Umbella quinquefida.*

*belioscopia* 325. EUPHORBIA umbella quinquefida, trifida, dichotoma, involucellis obovatis, foliis cuneiformibus serratis. *Linn. Syst.* 2. p. 450.

In

In cultis copiose. Aestate.

*Officin*: Esulae Herba.

DODECAGYNIA.

SEMPERVIVUM. L. G. 667.

*Cal.* 12-partitus. *Pet.* 12. *Capsul.* 12. polyspermae.

326. SEMPERVIVUM foliis ciliatis, propagini-~~rectorum~~  
bus patentibus. *Linn. Syst.* 2. p. 459.

In muris, tectis hinc inde.

*Officin*: Sedi f. Semperuiui maioris Herba.

CLAS-



## CLASSIS XII.

## I C O S A N D R I A

## M O N O G Y N I A.

## A. FLORE HERMAPHRODITO.

PRUNUS. L. G. 675.

*Cal.* 5-fidus inferus. *Pet.* 5. *Drupa*: nux compressa, futuris prominulis.

*ovium* 327. PRUNUS umbellis sessilibus, foliis ovato-lanceolatis subtus pubescentibus conduplicatis. *Linn. Syst.* 2. p. 487.

In nemoribus: *bey Malchin im Scheidegraben im Mühlenfelde.* Aprili. Majo.

*Officin*: Cerasor, nigrorum Flores, Fructus.

*insutria* 328. PRUNUS pedunculis geminis foliis ovatis subtus villosis, conuolutis, ramis spinoscentibus. *Linn. Syst.* 2. p. 489.

Iisdem locis; *auch auf dem Stadtwall.* Aprili. Majo.

*spinosa* 329. PRUNUS pedunculis solitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis spinosis. *Linn. Syst.* 2. p. 489.

In sepibus, dumetis et alibi frequens. Aprili.

*Officin*: Acatiae, Radix, Cortex, Flores, Fructus.

DIGY:

## DIGYNIA:

*Cal.* 8-fidus, superus. *Pet.* 5. *Bacca* carnosa, 2-sperma.

330. CRATAEGUS foliis obtusis subtrifidis, fer- *Oxyacantha*  
ratis. *Linn. Syst.* 2. p. 494.

In syluis, sepibus, ad vias copiose. Majo.

*Officin:* Oxyacanthae f. Spinae albae Folia,  
Flores, Baccae.

## TRIGYNIA.

SORBUS. L. G. 679.

*Cal.* 5-fidus, superus. *Pet.* 5. *Bacca* 3-sperma.

331. SORBUS foliis pinnatis vtrimque glabris, *aucuparia*  
*Linn. Syst.* 2. p. 495.

In syluis, alnetis: *bey Malchin* et alibi passim.  
Majo.

*Officin:* Sorbi aucupariae Baccae.

## PENTAGYNIA,

PYRUS. L. G. 682.

*Cal.* 5-fidus, superus. *Pet.* 5. *Pomum* 5-loculare polyspermum.

332. PYRUS (pyrafter) foliis ferratis laeuibus, *communis*  
floribus corymbosis. *Linn. Syst.* 2. p. 500.

Ad pagos, vias, in syluis passim. Aprili. Majo.

*Officin:* Pyri syluestris Fructus.

333. PYRUS syluestris foliis ferratis, umbellis *Malus*  
sessilibus. *Linn. Syst.* 2. p. 501.

lisdem

Iisdem cum præcedente locis.

*Officin:* Mali sylvestris. Flores, Fructus.

SPIRAEA. L. G. 686.

*Cal.* 5-fidus, inferus. *Pet.* 5. *Caps.* plures congestae, acuminatae bivalves.

*Filipendula* 334. SPIRAEA foliis interrupte pinnatis, foliolis lineari-lanceolatis interrupte serratis. *Linn. Syst.* 2. p. 523. (*Linn. Suppl.* 262.)

In pascuis memorosis: *bey Gilow am Holze.*  
Junio. Julio.

*Officin:* Saxifragae rubrae f. Filipendulae Radix, Herba.

*Ulmaria* 335. SPIRAEA foliis interrupte pinnatis, foliolis ovatis biserratis subtus canis, floribus cymosis. (*Linn. Syst.* 2. p. 523) *Linn. Suppl.* 262.

In pratis humidis: *auf den Wiesen hinter den Peen-Gärten bey Malchin* et alibi passim.  
Junio. Julio.

*Officin:* Ulmariae f. Barbae caprinae Radix, Herba, Flores.

## POLYGYNIA.

ROSA. L. G. 687.

*Cal.* vrceolatus, 5-fidus, carnosus, collo coarctatus. *Pet.* 5. *Sem.* plurima hispida, intra calycem baccatum.

336. ROSA germinibus ouatis pedunculisque *canina*  
glabris, caule petiolisque aculeatis. *Linn.*

*Syst.* 2. p. 530.

In sepibus, dumetis, vulgatissima. Junio.

*Officin:* Rosae sylvestris Flores. Cynosbati

Fructus, Semina, Fungi (Bedegnor).

RUBUS. L. G. 688.

*Cal.* 5-fidus. *Pet.* 5. 'Bacca composita acinis, 1-spermis.

337. RUBUS foliis quinato-pinnatis ternatisque, *idaeus*  
caule aculeato, petiolis canaliculatis.

*Linn. Syst.* 2. p. 532.

In nemorosis, montosis, alnetis et sylvis.

Majo. Junio.

*Officin:* Rubi idaei Folia, Baccae.

338. RUBUS foliis ternatis subnudis: laterali- *caesus*  
bus bilobis, caule aculeato tereti. *Linn.*

*Syst.* 2. p. 534.

In nemorosis, dumetis, sepibus, agris vulgatissima. Junio.

*Officin:* Rubi caesii Baccae.

339. RUBUS foliis quinato-digitatis ternatis-*fruticosus*  
que, caule petiolisque aculeatis. *Linn.*

*Syst.* 2. p. 534.

In sylvis, nemoribus, dumetis vbique. Majo.

Junio.

*Officin:* Rubi fruticosi Baccae.

TOR-

## TORMENTILLA. L. G. 691.

*Cal.* 8 - fidus, lacyniis alternis minoribus.

*Pet.* 4. *Sem.* 8. subrotunda, nuda mutica, receptaculo paruo exsucco adfixa.

*erecta* 340. TORMENTILLA caule erectiusculo, foliis sessilibus. *Linn. Syst.* 2. p. 550.

In pascuis nemorosis, syluaticis: *im Hayenholze zwischen dem Clavier und Jessinschen Wege.* Aestate.

*Officin:* Tormentillae Radix, Herba.

## FRAGARIA. L. G. 689.

*Cal.* 10 - fidus, laciniis alternis angustioribus.

*Pet.* 5. *Sem.* plurima supra receptaculum ouatum, baccatum, deciduum.

*vesica* 341. FRAGARIA flagellis reptantibus. *Linn. Syst.* 2. p. 537.

In nemoribus, pascuis syluaticis copiose. Majo.

*Officin;* Fragariae Radix, Herba, Baccae.

## POTENTILLA. L. G. 690.

*Cal.* 10 - fidus lacinii alternis minoribus, re-  
flexis. *Pet.* 5. *Sem.* plurima receptaculo paruo exsucco adfixa.

\* *Folius digitatis.*

*Anserina* 342. POTENTILLA foliis pinnatis, serratis, caule repente pedunculis vnafloris. *Linn. Syst.* 2. p. 539.

In

In pascuis, ad vias vbique. Majo. Junio.

*Officin: Anserinae Herba.*

\*\*\* *Foliis pinnatis.*

343. *POTENTILLA* foliis quinatis cuneiformi. *argentea*  
bus incisfis subtus tomentosis. *Linn. Syst.*

2. p. 543.

In ruderalis, collibus, ad vias: *bey Malchin auf dem Kirchhofe vor dem Mühlenthor.*  
Junio.

344. *POTENTILLA* foliis radicalibus quinatis *verna*  
acute ferratis retusis; caulinis ternatis,  
caule declinato. *Linn. Syst. 2. p. 544.*

In collibus apricis: *bey Malchin an dem Berge hinter dem Pfort.* Aprili.

345. *POTENTILLA* foliis quinatis, caule re- *repens*  
pente, pedunculis vinctis. *Linn. Syst. 2.*  
p. 547.

In gramineis subhumidis, vbique. Julio.

*Officin: Pentaphylli Radix, Herba,*

*GEUM. L. G. 692.*

*Cal. 10-fidus: laciniis alternis minimis acutis, Pct. 5. Sem. plurima: hispida: aristata geniculata.*

346. *GEUM* floribus erectis, fructibus globosis *urbanum*  
villosis: aristis vncinatis nudis, foliis lyratis. *Linn. Syst. 2. p. 551.*

In umbrosis ad sepes, muros copiose. Junio.

*Officin: Caryophyllatae Radix.*

G

347.

*virale* 347. *GEUM* floribus nutantibus, fructu oblongo: aristis plumosis tortis. *Linn. Syst.* 2. p. 552.

In nemoribus humidis vbique. *Majø.*

*Officin:* Gei riuallis Herba.

*COMARUM.* L. G. 664.

*Cal.* 10-fidus coloratus persistens: laciniis alternis minoribus inferioribus. *Pet.* 5, *Sem.* plurima supra-receptaculum ovatum carnosum, persistens.

*palestre* 348. *COMARUM.* *Linn. Syst.* 2. p. 554.

In pratis uliginosis: *auf dem neuen Rücken bey Malchin* et alibi copiose. *Junio.*

**CLAS.**

**CLASSIS XIII.**  
**P O L Y A N D R I A**  
**M O N O G Y N I A.**

**A. FLORE HERMAPHRODITO.**

*a. Flores Tetrapetali,*

PAPAVER. L. G. 704.

*Cal.* diphyllus. *Caps.* semimultilocularis,  
 coronata *stigmatē*, foraminibus pluri-  
 mis dehiscens.

\* *Capsulis hispidis.*

349. PAPAVER capsulis subglobosis hispidis, *hybridum*  
 caule-oliofo multifloro. *Linn. Syst. 2.*  
 p. 571.

In agris inter Segetes passim. Junio. Ju-  
 lio.

350. PAPAVER capsulis clauatis hispidis, cau- *Argemone*  
 le foliofo multifloro. *Linn. Syst. 2.*  
 p. 571.

In agris inter Segetes ad sepēs vulgaris. Ju-  
 nio. Julio.

\*\* *Capsulis glabris.*

351. PAPAVER capsulis glabris globosis, caule *Rubeas*  
 piloso multifloro foliis pinnatifidis incisis.  
*Linn. Syst. 2. p. 572.*

G 2

In



In agris inter segetes copiose. Junio.

*Officin:* Papaveris erratici f. rhoeados flores femina.

*dubium* 352. PAPAVER capsulis oblongis glabris, caule multifloro, setis adpressis, foliis pinatifidis incis. *Linn. Syst. 2. p. 573.*

In agris, ad seges: *an den Gartenzäunen am Schrattwege bey Malchin. et alibi. Junio.*

CHELIDONIUM. L. G. 603.

*Cal.* diphyllus. *Siliqua* linearis 1 - locularis.

*majus* 353. CHELIDONIUM pedunculis umbellatis. *Linn., Syst. 2. p. 569.*

In ruderalis, ad sepes vbique aestate.

*Officin:* Chelidonii maioris Radix, Herba, Flores.

ACTAEA. L. G. 700.

*Cal.* 4 - phyllus. *Bacca* 1 - locularis. *Sem* femiorbiculata gemino ordine.

*spicata* 354. ACTAEA racemo ovato, fructibus baccatis. *Linn. Syst. 2. p. 567.*

In nemoribus umbrosis: *bey Remplin auf der Promenade am Berge; auch im Holze bey Pifide Sparsim. Majo. Junio.*

### *b. Flores pentapetali.*

CISTUS. L. G. 728.

*Cal.* 5 - phyllus: foliolis duobus - minoribus. *Caps.* subrotunda, calyce obtecta.

355.

355. *Cistus suffruticosus procumbens stipu, Helianthe-*  
*lis lanceolatis, foliis oblongis revolutis* *num*  
*subpilosis. Linn. Syst. 2. p. 603.*

*In pascuis et syluaticis siccis hinter der Gi-*  
*lowfschen Mühle in dem Busch am Berge;*  
*auch bey Scharpzw im Holze. Junio.*  
*Julio.*

*TILIA. L. G. 717.*

*Cal. 5-partitus, deciduus. Caps. coriacea*  
*turbinato-globosa 5-locularis, 3-valvis -*  
*bisi dehiscens, 1-sperma.*

356. *TILIA floribus nectario destitutis. Linn. europaea*  
*Syst. 2 p. 584.*

*α. Tilia femina, folio maiore Bauhin Pin:*  
*426.*

*β. T. femina, folio minore. ibid.*

*α. in urbibus, culta. β. in nemoribus: bey*  
*Malchin in Hölzungen, et alibi frequens.*  
*Junio. Julio.*

*Officin: Tiliae Flores.*

*b. Flores pentapetali.*

*NYMPHAEA. L. G. 709.*

*Cal. 4. l. 5-phyllus. Bacca carnosa, collo*  
*angustata, multilocularis.*

357. *NYMPHAEA foliis cordatis integerrimis, lutea*  
*calyce petalis maiore pentaphyllo. Linn.*  
*Syst: 2. p. 578.*

In fossis, piscinis, fluviis: *bey Malchin in der Peene* et alibi copiose. Junio. Julio.

*Officin*: Nymphaeae luteae Radix, Flores.

*alba*

358. NYMPHAEA foliis cordatis integerrimis, calyce quadrifido. *Linn. Syst.* 4. p. 578.

In aquis stagnantibus profundis, in fluviis vbique.

*Officin*: Nymphaeae albae Radix, Flores.

### TRIGYNIA.

DELPHINIUM. L. G. 736.

*Cal.* 6. *Pet.* 5. supremo cornuto. *Nectar.* sessile, postice cornutum. *Capsul.* 3. f. 1.

*Consolida*

359. DELPHINIUM nectariis monophyllis, caule subdiviso. *Linn. Syst.* 2. p. 611.

In agris inter segetes copiose. Junio. Julio.

*Officin*: Consolidae regalis f. Calcatrippae Herba, Flores.

### PENTAGYNIA.

AQUILEGIA. L. G. 741.

*Cal.* 6. *Pet.* 5. *Nectar.* 5, corniculata, inter petala. *Capsul.* 5. distinctae.

*vulgaris*

360. AQUILEGIA nectariis incurvis. *Linn. Syst.* 2. p. 619.

In nemoribus: *im Hayenholze bey Malchin rechts am Clavierwege*, Majo.

*Officin*: Aquilegiae Herba, Flores, Semina.

HEXA-

## HEXAGYNIA.

STRATIOTES. L. G. 744.

*Spatha* diphylla. *Perianth.* trifidum. *Pet.*  
3. *Capsul.* cornosa, sexlocularis, infera.

361. STRATIOTES foliis ensiformi-triangularis *aloides*  
ciliato aculeatis. *Linn. Syst.* 2. p. 623.

In paludosis: *bey Malchin* (vulgo) *Egelhörn*  
copiose. Junio.

## POLYGYNIA.

THALICTRUM. L. G. 755.

*Cal.* o. *Pet.* 4. *Sem.* plurima, ecaudata,  
submutica, nuda.

362. THALICTRUM caule folioso fulcato, fo- *florum*  
liolis acute trilobis, panicula multiplici  
erecta. *Linn. Syst.* 1. p. 648.

In Pascuis pratis: *bey Remplin an der Prome-*  
*nade am Berge; bey Pifide am Holze an*  
*der Scheide nach Gesehendorff.* Julio. Au-  
gusto.

*Officin:* Thalictri Radix.

CALTHA. L. G. 761.

*Cal.* o. *Pet.* 5. *Nectar.* o. *Capsul.* plu-  
res, polyspermae.

363. CALTHA. *Linn. Syst.* 2. p. 673.

In humidis vulgaris. Majo.

*palustris*

ANEMONE. L. G. 751.

*Cal. o. Pet. 5-6-9. Sem. plurima; stylum retinentia.*

\* *Hepaticae, flore subcalyculato, seminibus nudis.*

*Hepatica* 364. ANEMONE foliis trilobis integerrimis.  
*Linn. Syst. 2. p. 631.*

In nemoribus: *im Hayenholze bey Malchin et alibi frequens. Martio. Aprili.*

*Officin: Hepaticae nobilis Herba, Flores.*

\*\* *Pulsatillae, pedunculo involucreto seminibus lanatis.*

*pratensis* 365. ANEMONE pedunculo involucreto, petalis opice reflexis, foliis bipinnatis. *Linn. Syst. 2. p. 633.*

In apricis, syluaticis: *bey Malchin hinter dem Jägerhause; auch auf dem Lalaerberge et alibi frequens. Aprili.*

*Officin: Pulsatillae nigricantis Herba, Flores.*

\*\*\* *Anemonoideae, flore nudo, seminibus ecaudatis.*

*nemorosa* 366. ANEMONE seminibus acutis, foliolis incis, caule unifloro. *Linn. Syst. 2. p. 637.*

In nemoribus frequens. Aprili.

*Officin: Ranunculi albi flores.*

367. ANEMONE seminibus acutis foliolis inci- *ranuncu-*  
lis, petalis subrotundis, caule subbifloro. *loides.*

*Linn. Syst. 2. p. 638.*

In pratis nemorosis vulgarissima. Aprili.

TROLLIUS. L. G. 758.

*Cal. o. Petal. circiter 14. Nectar. linea-*  
*ria. Capsul. plurimae, ovatae 1 - sper-*  
*mae.*

368. TROLLIUS corollis conniventibus, necta- *europaeus*  
riis longitudine staminum. *Linn. Syst. 2.*  
*p. 668.*

In pratis subhumidis: *bey Malchin am Kö-*  
*nigsberge: bey Remplin am Canal auf der*  
*Wiese. Junio.*

RANUNCULUS. L. G. 757.

*Cal. 5 - phyllus. Pet. 5. ungue nectarifero.*  
*Sem. plurima, nuda.*

\* *Foliis simplicibus.*

369. RANUNCULUS foliis ovato - lanceolatis, *flammula*  
caule declinato. *Linn. Syst. 2. p. 653.*

In pascuis et inundatis: *bey Malchin auf*  
*der Wiese bey dem Lalaerberge et alibi pas-*  
*sin. Junio. Julio.*

370. RANUNCULUS foliis lanceolatis, caule *lingua*  
erecto. *Linn. Syst. 2. p. 653.*

In fossis: *bey Malchin am Pfort. Junio.*

371. RANUNCULUS folii cordatis angulatis *Ficaria*  
petiolatis, caule unifloro. *Linn. Syst. 2.*  
*p. 656.*

G 5

In

In cultis, pomariis, dumetis vbique. Aprili.  
*Officinis*: Chelidonii minoris. f. Ficariae  
 Herba.

**\*\* Foliis dissectis.**

*auricomus* 372. RANUNCULUS foliis radicalibus reniformibus, crenatis, incis, caulinis digitatis linearibus, caule multifloro. *Linn. Syst.* 2. p. 657.

Abundat in pomariis, pratis subhumidis. Aprili.

*foeculatus* 373. RANUNCULUS foliis inferioribus palmatis, summis digitatis, fructibus oblongis. *Linn. Syst.* 2. p. 658.

In paludibus, aquis stagnantibus frequens. Aestate et serius.

*bulbosus* 374. RANUNCULUS calycibus retroflexis, pedunculis sulcatis, caule erecto multifloro. *Linn. Syst.* 2. p. 662.

In pascuis, pratis, ad agros frequens. Majo. Junio.

*repens* 375. RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis sulcatis, sarmentis repentibus, foliis compositis. *Linn. Syst.* 2. p. 662.

In hortis, agris abunde. Majo. Junio.

*acris* 376. RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito-multifidis; summis linearibus. *Linn. Syst.* 2. p. 663.

In pratis, pomariis, pascuis frequens. Majo. Junio.

*Officin:*

*Officin:* Ranunculi acris Herba.

377. RANUNCULUS calycibus patulis, pedun-<sup>lanugino-</sup>  
culis teretibus, foliis trifidis lobatis cre-<sup>sus</sup>  
natis holosericeis. *Linn. Syst. 2. p. 664.*

In nemoribus montosis: *bey Malchin im  
Hayenholze links an der grossen Sandgrube*  
et alibi passim. Majo. Junio.

378. RANUNCULUS seminibus aculeatis foliis <sup>arvensis</sup>  
superioribus decompositis linearibus. *Linn.  
Syst. 2. p. 665.*

In agris inter segetes frequens. Majo. Junio.

379. RANUNCULUS foliis submersis capillaceis, <sup>aquaticis</sup>  
emerfis peltatis. *Linn. Syst. 2. p. 667.*

In lacubus, aquis flagnantibus, fossis cum  
varietatibus copiosissime. Majo. Junio.

## \* GYNANDRIA.

CALLA. L. G. 1121.

*Cal.* Spatha. *Spadix* tectus flosculis. *Stam.*  
mixta pistillis, *Raccae* polyspermae.

380. CALLA foliis cordatis spatha plana, spa-<sup>palustris</sup>  
dice vndique hermaphrodito. *Linn. Syst.*  
*2. p. 75.*

In paludosis et fossis: *bey Malchin im Rohr-  
bruch in den tiefsten Teichen* frequens.  
Julio.

*Officin:* Callae palustris. f. Dracunculi aqua-  
tici Radix.

ARUM.



## ARUM. L. G. 1119.

*Cal.* spatha 1-phylla, cuculata. *Spadix* superne nudus, medio stamineus, inferne pistilliferus.

*maculatum* 381. ARUM acaule foliis hastatis integerrimis, spadice clauato. *Linn. Syst.* 2. p. 71.

In humidis: *am Wallgraben bey Rostock.*  
Majo.

*Officin:* Ari Radix, Herba.

## ZOSTERA. L. G. 1123.

*Spadix* linearis, altero latere fructifero.

*Cal.* o. *Cor.* o. *Stamina* alterna, *Sem.* solitaria, alterna.

*marina* 382. ZOSTERA pericarpis sessilibus. *Linn. Syst.* 4. p. 77.

In fundo maris baltici versus littora. vbique.

## B. MONOECIA.

## SAGITTARIA. L. G. 1164.

♂ *Cal.* 3-phyllus. *Pet.* 3. *Stam.* circiter 24.

♀ *Cal.* et *Cor.* maris. *Pist.* et *Sem.* plurima.

*sagittae-fo-* 383. SAGITTARIA foliis sagittatis acutis.  
*lia* *Linn. Syst.* 4. p. 155.

In piscinis, fossis, stagnis: *bey Malchin an der Zugbrücke* copiose.

## MYRIOPHYLLUM. L. G. 1163.

♂ *Cal.* duplex: exterior 4-phyllus. *fem.* 4-fidus *Pet.* 4. caduca. *Stam.* 8.

♀ *Cal.*

♀ *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* o. *Pist.* 4. *Capsul.*  
4. connatae 1-spermae.

584. MYRYOPHYLLUM floribus malculis inter-*spicarum*  
rupte spicatis. *Linn. Syst.* 4. p. 154.

In fossis, aquis quietis et piscinis: *bey Malchin in den Gräben am langen Damm* et  
alibi copiose. Julio.

385. MYRYOPHYLLUM floribus omnibus verti-*verticilla-*  
cillatis hermaphroditis. *Linn. Syst.* 4. *sum*  
p. 154.

In inundatis, fossis praesertim: *in dem Gra-  
ben hinter dem Remplinischen Jägerhause.*  
Julio.

CERATOPHYLLUM. L. G. 1162.

♂ *Cal.* multipartitus. *Cor.* o. *Stam.* duplo  
plura quam segmenta calycis (16. 20.)

♀ *Cal.* multipartitus. *Cor.* o. *Pist.* 1. *Styl.*  
subulatus. *Sem.* 1.

486. CERATOPHYLLUM foliis dichotomo-bi-*demersum*  
geminis, fructibus trispinosis. *Linn.*  
*Syst.* 4. p. 153.

In aquis, fossis: *bey Malchin in den Teichen  
vor dem Steinthor* et alibi frequens. Ju-  
nio. Julio.

POTERIUM. L. G. 1167.

♂ *Cal.* 2-3-4-phyllus. *Cor.* 4-partita.  
*Stamin.* 30-50. *Pistill.* imperfecta.

♀ *Cal.* et *Cor.* maris. *Pist.* 2. *Stigm.* pe-  
nicilliformia. *Bacc.* et tubo corollae in-  
durato.

*Sanguisor.* 387. *POTERIUM* inerme. caulibus subangulosis. *Linn. Syst.* 4. p. 158.

In asperis, apricis: *auf den Bergen bey Goshendorff; auch am Wege nach Remplin.*  
Junio.

*Officin:* Pimpinellae minoris. f. *Sanguisorbae* Herba, Semina.

*FAGUS.* L. G. 1170.

♂ *Cal.* 4 - 5 - fidus, campanulatus. *Cor.* o. *Stam.* 4 - 12.

♀ *Cal.* et *Cor.* maris. *Styl.* 3. *Caps.* muricata. 4 - valuis. *Sem.* 2.

*Sylvatica.* 388. *FAGUS* foliis ovatis obsolete ferratis.  
*Linn. Syst.* 4. p. 167.

Frequens. Aprili. Majo.

*QUERCUS.* L. G. 1168.

♂ *Cal.* 4 - 6 - fidus. *Cor.* o. *Stam.* 4 - 10.

♀ *Cal.* 1 - phyllus, integer, scaber. *Cor.* o. *Styl* 2 - 5. *Nux* coriacea ovata.

*Robur.* 389. *QUERCUS* foliis deciduis oblongis superne latioribus: sinubus acutioribus: angulis obtusis. *Linn. Syst.* 3. p. 163.

α. *Q.* latifolia mas quae breui pediculo est  
*Bauh: Pin.* 419.

β. *Q.* cum longo pediculo. l. c. 420.

In nemoribus vbique. Majo.

*Officin:* *Quercus* Cortex, Folia Glandes.  
Gallae.

CORY.

CORILUS. L. G. 1172.

♂ *Cal. amentum imbricatum squamis 3-fidis 1-floris.* " *Cor o. Stam. 6.-10.*

♀ *Cal. diphyllus, margine lacerato. Cor. o. Nux ouata.*

390. *CORYLUS stipulis obtusis. Linn. Syst. 4. Avellana p. 169.*

*In nemoribus ad versuras ubique copiose.*

*Martio. Officinis: Coryli Ligum Viscum, pulvis. Auellanae nuces.*

CARPINUS. L. G. 1171.

♂ *Cal. amentum imbricatum squamis 1-floris, ciliatis. Cor. o. Stamina 8-20.*

♀ *Cal. et Cor. maris. Germ. 2. ouata, calyce maximo 6-fido inclusa.*

391. *CARPINUS squamis strobilorum planis. Bernus Linn. Syst. 4. p. 168.*

*In nemoribus frequens. Aprili. Majo.*

CLAS

## CLASSIS XIV.

## D I D Y N A M I A

## GYMNOSPERMIA.

## A. FLORE HERMAPHRODITO.

## a. Calyces subquinquesidi.

LEONURUS L. G. 780.

*Invol.*: setaceum. *Cal.*: angulatus, pentagonus. *Cor.*: labium superius villosum. *Anth.*: glandulis nitidis foliis adspersae.

*Cardiaca* 392. LEONURUS foliis caulinis trilobis. *Linn. Syst.* 4. p. 67.

In ruderatis ad sepes: *bey Malchin. an den Gartenzäunen* et alibi frequens. *Julio.*

*Officin*: Cardiacae Herba.

GLECOMA. L. G. 773.

*Antherarum* singulum par in formam crucis connuens.

*hederacea* 393. GLECOMA foliis reniformibus crenatis *Linn. Syst.* 4. p. 47.

In sepibus, vbique. *Aprili. Majo.*

*Officin*: Hederæ terrestris Herba.

MENTHA. L. G. 771.

*Cor.* 4-fida, subaequalis; lacin. super. latiore emarginata. *Filam.* erecta distantia.

\* Ca-

\* *Capitata.*

394. MENTHA floribus capitatis, foliis ovatis *aquatica* ferratis petiolatis, staminibus corolla longioribus. *Linn. Syst.* 4. p. 43.

Abundat in inundatis. Julio. Augusto.

*Officin:* Menthae aquaticae Herba.

\*\* *Verticillatae.*

395. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis *arvensis* ferratis, staminibus corollam aequantibus. *Linn. Syst.* 4. p. 44.

In agris post messem vulgaris. Julio. Augusto.

## TEUCRIUM. L. G. 764.

Cor. labium superius o. lab. inferius 5-fidum, laciniis superioribus profunde bipartitis, diuarcatis.

396. TEUCRIUM foliis oblongis sessilibus dentato-ferratis floribus geminis axillaribus pedunculatis, caule diffuso. *Linn. Syst.* 3. p. 19. *Scordium*

In pratis paludosis: *im Mönchbruch; auf den Wiesen an der Peene bey Malchin* rarius. Julio.

*Officin:* Scordii Herba.

## AJUGA. L. G. 763.

Cor. labium superius minimum staminibus brevius.

*pyramidalis* 397. *AJUGA* tetragono - pyramidalis villosa, foliis radicalibus maximis. *Linn. Syst.* 3.

p. 8.

In syluaticis et nemorosis siccis: *im Hayenholze bey Malchin* et alibi frequens, Majo, Junio.

*Officin*: *Consolidae mediae Herba*.

BETONICA. L. G. 776.

*Cal.* aristatus, lab. super. planiusculum, adscendens.

*officinalis* 398. *BETONICA* spica interrupta corollarum lacinia labii inferioris intermedia emarginata. *Linn. Syst.* 3. p. 53.

In nemoribus. *In dem Ellerbruch* ad pagum Schlage. Junio. Julio.

*Officin*: *Betonicae Herba*, Flores.

LAMIUM. L. G. 774.

*Cor.* lab. super. integrum, fornicatum; lab. infer. bilobum: fauce vtrunque dente setaceo.

*album* 399. *LAMIUM* foliis cordatis, acuminatis serratis, petiolatis, verticillis vigintifloris. *Linn. Syst.* 3. p. 50.

In ruderalis cultis, pomariis ad sepes copiose. Majo. Junio.

*Officin*: *Lamii alibi*. f. *Urticae mortuae*. f. *Galeopsidis*, *Herba*, Flores.

*purpureum* 400. *LAMIUM* foliis cordatis petiolatis. *Linn. Syst.* 3. p. 50.

IN

In cultis, agris, ad fepes ubique. Aprili  
et tota Aestate.

401. LAMIUM foliis floralibus sessilibus am- *amplexi-*  
plexicaulibus obtusis. Linn. *Syst.* 4. *caule*  
p. 51.

In cultis, aruis frequens Aestate.

GALEOPSIS. L. G. 775.

Cor.-lab. super. subcrenatum fornicatum;  
lab. infer. 3-fidum fauce utrimque den-  
ticulo obtusiusculo, concavo.

402. GALEOPSIS internodiis caulinis aequalibus, *Ladanum*  
verticillis omnibus remotis; calycibus in-  
ermibus,

In agris, aruis, sabulosis: *hinter dem Hay-*  
*enholze an der Gelowfschen Scheide* et alibi fre-  
quens. Julio. Augusto.

403. GALEOPSIS internodiis caulinis superne *Tetrabis*  
incrassatis verticillis summis subcontinuis  
calycibus pungentibus. Linn. *Syst.* 3.  
p. 52.

α. Cannabis spuria Rivini monop. 3.

β. Cannabis spuria flore maiore l. c. 32.

α. In agris cultis ad fepes frequens; β. in  
nemoribus: *-im Hayenholze bey Malchin*  
et alibi passim. Julio. Augusto.

404. GALEOPSIS verticillis sexfloris inuolucro *Galeobdo-*  
tetraphyllo. Linn. *Syst.* 3. p. 53. *lon*

In nemoribus umbrosis: *bey Malchin hinter*  
*dem Jägerhause; auch dem Wall* et alibi  
frequens. Majo.



## STACHYS. L. G. 777.

*Cor.* lab. super. fornicatum; lab. infer. 3-fidum: laterib. reflexum: lacin, intermed. maiore, emarginata. *Stam.* deflorata ad latera reflexa.

*sylvatica* 405. STACHYS verticillis sexfloris, foliis cordatis petiolatis. *Linn. Syst.* 3. p. 56.

In nemoribus umbrosis ubique. Junio Julio.

*palustris* 406. STACHYS verticillis subsexfloris, foliis lineari-lanceolatis semiamplexicaulibus sessilibus. *Linn. Syst.* 3. p. 56.

In hortis, ad ripas fossarum frequens. Junio Julio.

*recta* 407. STACHYS verticillis subspicatis, foliis cordato-ellipticis crenatis adscendentibus. *Linn. Syst.* 3. p. 60,

In collibus asperis: *bey Remplin am Wege* passim. Julio.

*Officin:* Sideritidis, Herba.

## NEPETA. L. G. 768.

*Cor.* lab. infer. crenulatum; faux margine reflexo. *Stam.* adproximata.

*Casaria* 407. NEPETA floribus spicatis, verticillis subpedicellatis, foliis petiolatis cordatis, dentato-ferratis. *Linn. Syst.* 3. p. 30.

In ruderatis ad sepes: *bey Malchin vor dem Steinhore an Zäunen.* Julio.

*Officin:* Nepetae s. Catoriae Herba, Semina.

BAL-

## BALLOTA. L. G. 778.

*Cal.* 10-striatus. *Cor.* lab. sup. fornicatum,  
integrum, crenatum.

408. BALLOTA foliis cordatis indiuisis ferra- *nigra*  
tis, calycibus acuminatis. *Linn. Syst.* 3.  
p. 62.

In ruderatis copiosissime, Aestate.

*Officin*; Marubii nigri Herba.

## MARUBIUM. L. G. 779.

*Cal.* 10-striatus, rigidus. *Cor.* lab. super.  
rectum lineare bifidum.

409. MARUBIUM dentibus calycinis setaceis re- *vulgare*  
ctis villosis. *Linn. Syst.* 3. p. 65.

In ruderatis, ad vias copiose. Julio. Au-  
gusto.

*Officin*: Marubii alibi Herba.

*b. Calyces bilabiati.*

## SCUTELLARIA. L. G. 792.

*Cal.* ore integro, post florescentiam clauso  
operculato.

410. SCUTELLARIA foliis cordato-lanceolatis *galericu-*  
crenatis floribus axillaribus. *Linn. Syst.* 3. *lana*  
p. 98.

Ad fossas, riuulos, in pratis humidis: *bey*  
*Malchin am Pfort* et alibi frequens. Ju-  
lio. Augusto.

## THYMUS. L. G. 785.

*Calycis faux villis clausa.**Serpyllum* 411. THYMUS floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis planis obtusis, basi cillatis.*Linn. Syst. 3. p. 79.*

In aridis apricis ubique Aestate.

*Officin: Serpylli Herba.**Acinos* 412. THYMUS floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulibus erectis subramosis, foliis acutis serratis. *Linn. Syst. 2. p. 81.*In siccis: *bey Remplin am Ufer des Weges et alibi passim. Julio. Augusto.*

## PRUNELLA, L. G. 793.

*Filam. apice bifurca: altero ramo antherifera.**vulgaris* 413. PRUNELLA foliis omnibus ovato-oblongis, serratis, petiolatis. *Linn. Syst. 3. p. 101.**β. P. grandiflora.**α. In pratis, pomariis pascuis vulgaris. β. bey Remplin am Berge bey der Promenade Aestate.**Officin: α. Prunellae f. Consolidae minoris Herba.*

## ORIGANUM. L. G. 784.

*Strobilus* 4-gonus, spicatus calyces colligens.

414. *ORIGANUM* spicis subrotundis panicula- *vulgare*  
tis conglomeratis, bracteis calyce longio-  
ribus ovatis. *Linn. Syst.* 3. p. 78.

In nemorosis montosis: *hinter dem Hayen-  
holze an der Gilow'schen Scheide.* Julio.

*Officin:* Origani vulgaris Herba.

*CLINOPODIUM.* L. G. 783.

*Involacr.* multifetum, verticillo subiectum  
calyces colligens.

415. *CLINOPODIUM* capitulis subrotundis his- *vulgare*  
pidis, bracteis setaceis. *Linn. Syst.* 5.

P. 75.

In nemorosis et dumetis: *bey Malchin im  
Hayenholze* et alibi frequens. Julio. Au-  
gusto.

## ANGIOSPERMIA.

### a. Calyces bifidi.

*OROBANCHE.* L. G. 841.

*Cor.* subaequalis 4. fida, ringens, glandula  
sub basi germinis. *Stigma.* semibifidum.  
*Capsul.* unilocularis, 2-valvis, polys-  
perma.

416. *OROBANCHE* caule simplicissimo pubes- *maior*  
cente, staminibus subexsertis. *Linn.*  
*Syst.* 3. p. 183.

In montosis ficcis.

Plantam hanc per aliquot annos in ducatu  
megapolitano frustra quaesivi; tandem de-

textit officiosissimus Dn. KRÜGER, et specimen mea legi: *an dem Hügel bey 'der Remplinischen Windmühle.* Junio.

EUPHRASIA. L. G. 799.

*Cal. cylindricus. Anth. spinosa, Caps. 2 - locularis, ovato oblonga.*

*officinalis* 417. EUPHRASIA foliis ovatis lineatis argute dentatis. *Linn. Syst. 3. p. 108.*

In pascuis, nemorosis ubique. Julio. Augusto.

*Officin:* Euphrasiae Herba.

*Odontites* 418. EUPHRASIA foliis linearibus, omnibus ferratis. *Linn. Syst. 3. p. 109.*

In pascuis pratis, ad margines fossarum copiose, Julio. Augusto.

RHINANTHUS. L. G. 798.

*Cal. ventricosus. Cor. personata. Caps. 2 - locularis obtusa, compressa,*

*Crista galli* 419. RHINANTHUS corollarum labio superiore. *Linn. Syst. 3. p. 106.*

In pratis humidiusculis et siccis copiosissime. Junio.

MELAMPYRUM. L. G. 800.

*Cor. personata lab. sup. compressum margine replicato. Caps. 2 - locularis obliqua. Sem. bina gibbosa.*

*arvensis* 420. MELAMPYRUM spicis conicis laxis: bracteis dentato - setaceis coloratis. *Linn. Syst. 2. p. 111.*

In

In agris inter segetes frequens. Junio. Julio,

421. MELAMPYRUM floribus secundis laterali- *nemoribus*, bracteis dentatis cordato-lanceolatis; *sum* summis coloratis, sterilibus; calycibus lanatis. *Linn. Syst. 3. p. 111.*

In nemoribus: *bey Malchin im Hayenholze am hohlen Wege.* Junio. Julio.

422. MELAMPYRUM floribus secundis laterali- *sylvaticum* bus, coniugationibus remotis, corollis hiantibus. *Linn. Syst. 3. p. 112.*

*Im Holze bey Pifide passim.* Junio. Julio.

### c. Calyces quinquesidi.

SCROPHULARIA. L. G. 514.

*Cor.* resupinata: tubo subgloboso; labii lacinia intermedia ad tubum reflexa. *Caps.* 2-locularis.

423. SCROPHULARIA foliis cordatis trineruatis, *nodosis* caule obtusangulo. *Linn. Syst. 3. p. 145.*

In succulentis inter frutices ad sepes et fossas: *bey Malchin im Hayenholze am Acker Kamp Aestate.*

*Officin:* Scrophulariae Radix.

424. SCROPHULARIA foliis decurrentibus obtusis, *aquaticis* caule membranis angulato, racemis terminalibus. *Linn. Syst. 3. p. 145.*

In humidis iuxta fossas: *bey Malchin in den Hellengrund am Graben et alibi copiose.*  
Aestate.

*Officin:* Scrophulariae aquaticae Folia.

ANTIRRHINUM. L. G. 808.

*Cal.* 5 -phyllus. *Cor.* personata: basi deorsum prominente, nectarifera. *Caps.* 2 -locularis.

*Linaria*

425. ANTIRRHINUM foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus floribus imbricatis. *Linn. Syst.* 3. p. 135.

In ruderalis, hortis, pomariis frequens  
Aestate.

*Officin:* Linariae Herba, Flores.

*minus*

426. ANTIRRHINUM foliis plerisque alternis, lanceolatis obtusis, caule ramosissimo.  
*Linn. Syst.* 3. p. 134.

Rarius ad littora maris baltici: *bey Warnemünde* Aestate.

PEDICULARIS. L. G. 804.

*Cor.* personata: lab. super. compresso. *Caps.* 2 -locularis, mucronata; obliqua. *Sem.* tunicata.

*palustris*

427. PEDICULARIS caule ramoso, calycibus cristatis, calloso-punctatis, corollis labio obliquis. *Linn. Syst.* 3. p. 115.

In pratis paludosis: *bey Malchin auf Tiefwaden.* Majo. Junio.

*Officin:*

*Officin:* Pedicularis Herba.

428. PEDICULARIS caule simplici floribus ter-<sup>septrum</sup>  
no-verticillatis, corollis clausis, calyci-<sup>Corolinis;</sup>  
bus cristatis, capsulis regularibus. *Linn.*<sup>zum</sup>

*Syst.* 3. p. 116.

Speciosam hanc plantam inveni in prato paludoso: *bey Malchin auf der Weide bey dem Lalaerberge zwischen den Birken an der Scheide am neuen Rücken passim.* Augusto.

---

**CLAS-**



## CLASSIS XV.

## TETRADYNAMIA

## SILICULOSA.

*a. Siliculae integrae, nec apice emarginatae.*

DRABA. L. G. 864.

*Styl. o.* Silic. ovali-oblonga: valvulis planiusculis, dissepimento parallelis.*verna*

429. DRABA scapis nudis, foliis subferratis.

*Linn. Syst. 3. p. 213.*

In collibus apricis aridis, aruis, hortis vbique.

Majo. Aprili.

MYAGRUM. L. G. 860.

*Styl. persistens.* Silic. valvulis concavis.*fasivum*430. MYAGRUM filiculis obouatis pedunculatis polyspermis. *Linn. Syst. 3. p. 208.*

In agris inter segetes passim. Junio. Julio.

*paniculatum*431. MYAGRUM filiculis lentiformibus orbiculatis punctato-rugosis. *Linn. Syst. 3. p. 209.*

In agris, ad margines eorum inter segetes. Junio. Julio.

IBERIS.

IBERIS. L. G. 868.

*Cor.* irregularis, petalis 2. exterioribus maioribus. *Silic.* polysperma.

432. IBERIS foliis sinuatis, caule nudo simplici nudicaulis  
ci. *Linn. Syst.* 3. p. 232.

In agris arenosis: an der *Jessinschen Scheide*  
et alibi passim. Majo. Junio.

ALYSSUM. L. G. 869.

*Filam.* quaedam introrsum denticulo notata.

433. ALYSSUM caule erecto, foliis lanceolatis *intanum*  
incanis integerrimis, floribus corymbosis  
petalis bifidis. *Linn. Syst.* 3. p. 234.

In arenosis apricis, bey der *Rostocher Fehre*  
an dem *Sandigten* et alibi passim aestate.

COCHLEARIA. L. G. 867.

*Silic.* cordata, emarginata, turgida, scabra:  
valvulis gibbis, obtusis.

434. CACHLEARIA foliis pinnatifidis, caule *Coronopus*  
depresso. *Linn. Syst.* 3. p. 227.

In apricis gramineis: bey *Malchin zwischen*  
*den Scheunen*; auch am *Schrottwege vor*  
*dem Steinthor* copiose. Aestate.

435. CACHLEARIA foliis radicalibus lanceola- *Armoracia*  
tis crenatis; caulinis incisis. *Linn. Syst.* 3.  
p. 228.

In humidis: bey *Malchin auf Grasplätzen*  
*vor dem Mühlenthore* et alibi passim. Junio.  
Julio.

*Officin:* *Armoraciae Radix.*

THLASPI.

THLASPI. L. G. 866.

*Silic.* obcordata emarginata : valvulis navicularibus marginato-carinatis.

*arenise*

436. THLASPI filiculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris. *Linn. Syst.* 3. p. 222.

In cultis, hortis et agris vulgare. Majo. Junio.

*Officin:* Thlaspios vulgaris, Semina.

*Bursa pastoris*

437. THLASPI filiculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis. *Linn. Syst.* 3. p. 226.

In cultis, agris, ruderalis, ad vias vbique. Aprili et tota Aestate.

*Officin:* Bursae pastoris Herba.

## SILIQUOSA.

a. *Calyx clausus, foliis longitudinaliter conniventibus.*

RAPHANUS. L. G. 886.

*Glandulae* melliferae 4 : 2 inter stamina breviora et pistillum; 2. inter stam. longiora et calycem. *Styl.* vix ullus. *Siliqua* torosa, subarticulata, teres.

*Raphanistrum*

438. RAPHANUS siliquis teretibus articulatis laevibus unilocularibus. *Linn. Syst.* 3. p. 284.

In agris inter segetes praesertim aestivas copiosissime. Majo.

ERYSI.

## ERYSIMUM. L. G. 878.

*Siliqua* columnaris, exacte tetragona.

439. ERYSIMUM filiquis spicae adpressis, fo- *Officinale*  
liis runcinatis. *Linn. Syst.* 3. p. 260.

In ruderatis, ad vias et lepes. Aestate.

*Officin:* Erysimi Herba.

440. ERYSIMUM foliis lyratis, extimo subro- *Barbarea*  
tundo. *Linn. Syst.* 3. p. 260.

In den Peengärten bey Malchin. Majo.

441. ERYSIMUM foliis cordatis. *Linn. Syst.* 2. *Alliaria*  
p. 260.

In sepibus, pomariis, nemoribus: auf dem

Wall bey Malchin. Majo.

*Officin:* Alliariae Herba.

442. ERYSIMUM foliis lanceolatis integerrimis, *cheirantho-*  
filiquis patulis. *Linn. Syst.* 3. p. 261. *ides*

In arvis et agris: bey Malchin am Schrottwe-  
ge. Aestate.

## HESPERIS. L. G. 881.

*Petala* oblique flexa. *Glandula* intra stami-  
na breviora. *Silequa* stricta. *Stigma* basi  
bifurca apice connivente. *Cal.* clausus.

443. HESPERIS caule simplici erecto, foliis inodora  
subhaestatis dentatis, petalis obtusis. *Linn.*  
*Syst.* 3. p. 269.

Auf dem Wall bey Rostoch zwischen dem  
Kröpliner und Strandthore in der Mitte  
zwischen kleinem Gebüsch. Junio.

*Observ.*

*Observ.* folia radicalia non nisi subhastata, caulina ovato-lanceolata ferrata,

ARABIS. L. G. 882.

*Calyc.* foliola 2 ovato-oblonga, acuta, basi gibba; 2 linearia, erecta. *Petalor.* ungues longitudine calycis. *Glandul.* 4 melliferae, intra foliola calycis. *Siliqua* compressa, linearis.

*thaliana* 444. ARABIS foliis petiolatis lanceolatis integerrimis. *Linn. Syst.* 3. p. 272.

In cultis; in Horto meo. Junio.

BRASSICA. L. G. 884.

*Glandulae* 4. melliferae: 2 intra stamina breviora; 2 extra longiora. *Sem.* globosa.

*campestris* 445. BRASSICA radice cauleque tenui, foliis caulinis uniformibus cordatis sessilibus. *Linn. Syst.* 3. p. 276.

Inter fegetes aestivas passim. Junio.

TURRITIS. L. G. 883.

*Pet.* erecta. *Siliqua* longissima, angulata.

*glabra* 446. TURRITIS foliis radicalibus dentatis hispidis; caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris. *Linn. Syst.* 2. p. 274.

Inter virgulta: *auf dem Wall bey Malchin* et alibi passim. Majo. Junio.

DENTARIA. L. G. 875.

*Siliqua* elastice diffilens, valvulis revolutis. *Stigma* emarginatum. *Cal.* longitudinaliter connivens.

447. DENTARIA foliis inferioribus pinnatis, *bulbifera* summis simplicibus. *Linn. Syst.* 3. p. 243.

In nemorosis: *im Kahldischen Holze*, rarius, Aprili, Majo.

BUNIAS L. G. 887.

*Silicula* decidua, tetraëdra, angulis inaequalibus acuminatis, muricata.

448. BUNIAS filiculis ouatis laeuius ancipiti- *Cakile* bus. *Linn. Syst.* 3. p. 287.

In maritimis: *bey Warnemünde am Bauplatze* copiose. Julio.

CARDAMINE. L. G. 876.

*Cal.* subhians. *Stigma* capitatum integrum.

*Siliqua* elastice dehiscens; valvulis reuolutis.

449. CARDAMINE foliis pinnatis; foliolis *ra-praetensis* dicalibus subrotundis; caulinis lanceolatis. *Linn. Syst.* 3. p. 248.

In pratis humidis vulgaris. Aprili. Majo.

450. CARDAMINE foliis pinnatis, axillis stelo- *amara* niferis. *Linn. Syst.* 2. p. 248.

In nemoribus, ad fossas: *bey Malchin am Graben bey dem Jägerhause* et alibi passim. Majo.

SINAPIS. L. G. 885.

*Cal.* horizontaliter patens. *Cor.* ungues erecti. Glandul. melliferis 4.: 2 inter stami-

na breuiora et pistillum; 2 inter flamina longiora et calycem. *Styl.* longitudine germinis.

- arvensis* 451. *SINAPIS* filiquis multangulis torosoturgidis rostro ancipite longioribus. *Linn. Syst.* 3. p. 280.

*SISYMBRIUM*. L. G. 877.

*Cal.* patulus. *Cor.* patens: unguibus minimis. *Siliqua* incurua: valvulis dehiscendo rectiusculis.

\* *Siliquis declinatis breuibus.*

- Nasturtium*  $\nabla$  *tr.* 452. *SISYMBRIUM* filiquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis subcordatis. *Linn. Syst.* 3. p. 249.

Ad scaturigines riuulos puriores, fossas ubique. Junio.

*Officin:* Nasturtii aquatici Herba.

- Sylvestre* 453. *SISYMBRIUM* filiquis declinatis oblongo-ouatis, foliolis lanceolatis ferratis. *Linn. Syst.* 3. p. 250.

In ruderatis hortorum, ad margines fossarum: *bey Malchin in den Peengärten* passim Aestate.

- amphibium* 454. *SISYMBRIUM* filiquis declinatis oblongo-ouatis, foliis pinnatifidis ferratis. *a.* Radicula petalis calyce longioribus. *Haller. heluet* no. 486.

In

SILIKUOSA.

131

In pratis humidis, ad fossas: *bey Malchin*  
*am Pfort.* Majo. Junio.

\*\* *Siliquis longioribus erectis.*

455. SISYMBRIUM petalis calyce minoribus, *Sophia*  
foliis decomposito-pinnatis. *Linn. Syst.*

2. p. 256.

In ruderatis copiose. Majo. Junio.

*Officin:* *Sophiae chirurgorum Semiam.*

---



## CLASSIS XVI.

MONADELPHIA  
DECANDRIA.

## A. FLORE HERMAPHRODITO.

GERANIUM. L. G. 897.

Monogyna. *Stym.* 5. *Fruft.* 5 - coccus, rostratus.\* *Myrrhina.* *Stam.* 5 *antherifera.*

*cicnderium* 456. GERANIUM pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis incisfis, obtusis, caule ramoso, *Linn. Syst.* 3. p. 317.

In ruderatis, aggeribus, aruis cultis ubique.  
Aprili. Majo.

\*\* *Batrachia.* *Staminibus* 10. *antheriferis*  
*perennia.*

*palustre* 457. GERANIUM pedunculis bifloris longissimis declinatis, foliis quinquelobis incisfis, petalis integris. *Linn. Syst.* 3. p. 323.

In humidis *links am Scheidegraben an der Basedowschen Seite.* Junio.

\*\*\* *Sta.*

\*\*\* *Staminibus 10. antheriferis pedunculis  
bifloris, annua.*

458. GERANIUM, pedunculis bifloris, calyci- *robertia-*  
bus pilosis augulatis. *Linn. Syst. 3. num*  
*p. 325.*

In ruderatis umbrosis ad muscos: *bey Mal-*  
*chin auf dem Wall.* Majo. et seq.

*Officin.* Geranii robertiani Herba.

459. GERANIUM pedunculis bifloris foliisque *molle*  
floralibus alternis, petalis bifidis, caly-  
cibus muticis, caule erectiusculo. *Linn.*  
*Syst. 3. p. 326.*

In cultis, ruderatis, ad vias, sepes copiose  
Aestate.

460. GERANIUM pedunculis bifloris folio lon- *columba-*  
gioribus, foliis quinquepartito - multifi- *rium*  
dis, arillis glabris, calycibus aristatis,  
*Linn. Syst. 3. p. 327.*

In umbrosis, ad sepes, in dumetis passim.  
Junio. Julio.

461. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis *dissectum*  
quinque partito-trifidis, petalis emargi-  
natis longitudine calycis, arillis villosis  
*Linn. Syst. 3. p. 327.*

In agris, aruis passim. Junio, Julio.

462. GERANIUM pedunculis bifloris, petalis *rotundifo-*  
subintegris longitudine calycis, caule pro- *lium*  
strato, foliis reniformibus incis. *Linn.*  
*Syst. 3. p. 328.*

In cultis, agris, ad vias, fepes vbique Aestate.

## POLYANDRIA.

MALVA. L. G. 906.

*Cal.* duplex: exterior triphyllus, acutus.

*rotundi-  
folia*

463. MALVA caule prostrato, foliis cordato-orbiculatis obsolete quinquelobis, pedunculis fructiferis declinatis. *Linn. Syst.*

3. p. 346.

Ad fepes, vias, in ruderatis vbique Aestate.

*Officin:* Malvae vulgaris. Radix, Herba, Semina.

*Sylvestris*

464. MALVA caule erecto herbaceo, foliis septemlobatis acutis, pedunculis petiolisque pilosis. *Linn. Syst.* 2. p. 347.

Ad vins, fepes, in campestribus frequens. Aestate.

*Officin:* Malvae sylvestris Radix, Flores.

*Alcea*

465. MALVA caule erecto foliis multipartitis scabriusculis. *Linn. Syst.* 3. p. 348.

In montosis, ad margines nemorum: *bey Pifde am Ackerwege der gerade ins Holz führet.* Aestate.

*Officin:* Alceae Radix.

## MONOECIA.

PINUS. L. G. 1175.

♂ *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* o. *Stam.* plurima.

♀ *Cal.* strobilus: squamis bifloris. *Cor.* o.

*Pist.* 1. *Nux* ala membranacea.

466.

466. PINUS foliis geminis: primordialibus fo- *sylvestris*  
litariis glabris. *Linn. Syst.* 4. p. 172.

Vbique frequens. Majo.

*Officin:* Pini Liber, Turiones f. Summitates,  
Resina.

467. PINUS foliis fasciculatis obtusis. *Linn. Larix*  
*Syst.* 4. p. 175.

*Im Kahldischen Holze bey der Ziegley; auch*  
*bey Remplin culta.* Majo.

468. PINUS foliis solitariis subulatis, mucrona- *Abies*  
tis, laevibus, bifariam versis. *Linn. Syst.* 4.  
p. 177.

*Pinus picea* Du Roi Harbk. 2. p. 110.

*Bey Remplin et alibi infrequens.* Majo.

*Officin:* Abietis Turiones f. Summitates, Re-  
sina.

#### JUNIPERUS. L. G. 1240.

♂ *Cal.* amentum: squamis 10. 1 - floris.  
*Cor.* 0. *Stam.* 3. (in flore terminali.)

♀ *Cal.* 3-partitus. *Pet.* 3. *Styl.* 3. *Bac-*  
*ca* infera, carnosa, 3-sperma.

469. JUNIPERUS foliis ternis patentibus mu- *communis*  
cronatis, bacca longioribus. *Linn. Syst.*  
4. p. 278.

*In syluaticis: bey Malchin im Hayenholze co-*  
*piose.* Aprili.

*Officin:* Juniperi Lignum, Baccae.

TAXUS. L. G. 1241.

♂ *Cal.* 4-phyllus gemmae. *Cor.* o. *Stam.* multa. *Antherae* peltatae octofidae.

♀ *Cal.* 4-phyllus gemmae. *Cor.* o. *Styl.* o. *Sem.* 1, calyculo baccato, integerrimo.

*baccata*

470. *TAXUS* foliis approximatis. *Linn. Syst.* 4. p. 279.

In nemorosis: in *der Rostocher Heide* passim  
Majo.

CLAS-

## CLASSIS XVII.

## D I A D E L P H I A

## H E X A N D R I A.

FUMARIA. L. G. 920-

*Cal.* diphyllus. *Cor.* ringens, basi globosa  
nectarifera. *Filam.* 2. singula anthe-  
ris 3.

471. FUMARIA caule simplici, bracteis longi- *bulbosa*  
tudine florum. *Linn. Syst.* 3. p. 378.

*α.* F. radice bulbosa, cava, caule simplici  
bifolio, bracteis ovato-lanceolatis. Hall.  
Helv. n. 348.

*β.* F. radice bulbosa solida caule simplici  
multifolio, bracteis digitatis, Hal. Helv.  
n. 349.

In dumetis et nemoribus umbrosis. *α.* am  
*Scheidegraben zwischen Malchin und Baf-*  
*edow.*

*β.* bey der Gilowschen Mühle hinter der Brü-  
cke am Berge im Gebüsch. Aprili.

*Officin:* Aristolochiae fabaceae f. cauae f. Fu-  
mariae bulbosae Radix. Variant c. flor.  
rubr. et albis.

472. FUMARIA pericarpis monospermis race- *officinalis*  
mosis caule diffuso. *Linn. Syst.* 3. p. 380.

In fylvaticis arenosis: *bey Witzerhof in den Tannen* copiose. Majo. Junio.

In hortis, cultis, agris copiose.

*Officin*: Fumariae Herba.

# OCTANDRIA

POLYGALA. L. G. 921.

*Cal.* 5-phyllus: foliolis 2. alaeformibus coloratis. *Cor.* vexillum fere cylindricum.

*Filam.* conata. *Capsul.* obcordata, bilocularis.

*vulgaris* 473. POLYGALA floribus cristatis racemosis, caulibus herbaceis simplicibus procumbentibus foliis lineari-lanceolatis. *Linn. Syst.* 3. p. 383.

In pascuis ficcioribus, locis apricis nemorum: *bey Malchin an dem Berge hinter dem Pfort* et alibi passim. Majo. Junio.

*Officin*: Polygalae vulgaris Radix, Folia.

# DECANDRIA.

a. *Stamina omnia basi connexa.*

SPARTIUM. L. G. 929.

*Cal.* deorsum productus, bilabiatus  $\frac{2}{3}$ . *Filam.* germini adhaerentia. *Stigm.* longitudinale, supra villosum.

*scoparium* 474. SPARTIUM foliis ternatis solitariisque, ramis inermibus angulatis. *Linn. Syst.* 3. p. 403.

*Officin*:

*Officin:* Spartii scaporii Herba, Flores, Semina.

GENISTA. L. G. 930.

*Cal.* bilabiatum  $\frac{2}{3}$ . *Vexillum* oblongum deorsum reflexum. *Pistill.* deprimens carinatum. *Stigma* involutum.

\* *Inermes.*

475. GENISTA foliis lanceolatis glabris, ramis *tinctoria* striatis teretibus erectis. *Linn. Syst.* 3. p. 406.

In montosis nemorosis et sylvaticis siccioribus: *bey Witzerhoff an den Tannen bey der Jungferngrund.* Junio. Julio.

*Officin:* Genistae Herba, Flores, Semina.

\*\* *Spinosae.*

476. GENISTA spinis compositis, ramis floribus *germanica* inermibus, foliis lanceolatis. *Linn. Syst.* 3. p. 408.

In sylvaticis nemorosis montosis: *bey Malchin im Hayenholze auf dem Hirtenberge.* Junio. Julio.

ANTHYLLIS. L. G. 936.

*Cal.* ventricosus, 5 - dentatus. *Legum.* subrotundum, calyce turgido inclusum.

477. ANTHYLLIS herbacea, foliis pinnatis in- *Valneraria* aequalibus capitulo duplicato. *Linn. Syst.* 3. p. 433.

In pascuis siccis aggeribus marginibus: *auf dem Basedowschen Felde am Wege nach Wenschenhayen.* Junio.

ONO-



## ONONIS. L. G. 935.

*Cal.* 5 - partitus: laciniis linearibus. Vexill. striatum. *Filam.* in cylindrum integrum connata. Legum rhombeum sessile.

*spinosa* 478. ONONIS floribus racemosis, solitariis foliis ternatis solitariisque, ramis spinosis. *Linn. Syst. Edit. 14.* Murr. p. 651.

Retz Observat. botanic. fascicul. 1. p. 23. n. 78. et fascicul. 2. p. 21. n. 68.

Ad margines agrorum et pascuis arenosis: *bey Malchin in der Hellengrund* et alibi copiose. Julio. Augusto.

*arvensis* 479. ONONIS floribus racemosis geminatis, foliis ternatis: superioribus solitariis, ramis inermibus subvillosis, *Linn. Syst. Edit. 14.* p. 651.

Retz Observat. botanic. fascic. 1. p. 23. n. 78. et fasc. 2. p. 21. n. 67.

Iisdem locis passim: *bey Pifide an dem hollen Wege vor dem Gehölze.* Julio. Augusto.

In hortum meum transtuli, ubi lacte floruit et semper mitis ac inermis.

## OROBUS. L. G. 945.

*Cal.* basi obtusus, 5 - dentatus  $\frac{2}{3}$ : denticulis 2. superioribus profundioribus. *Styl.* linearis, teretiusculus, supra pubescens.

*vernus* 480. OROBUS foliis pinnatis ovatis, stipulis semi sagittatis integerrimis, caule simplici. *Linn. Syst. 3.* p. 459.

In

In nemoribus, montosis umbrosis: *in dem Holze bey Pifide* et alibi passim. Aprili. Majo.

481. OROBUS foliis pinnatis lanceolatis, stipulis *suberosus* semi sagittatis integerrimis, caule simplicis. *Linn. Syst. 3. p. 460.*  
Iisdem locis. Majo. Junio.

## LATHYRUS. L. G. 946.

*Calyx*. lacinae 2 superiores breviores. *Styl.* planus, superne latior. *Stigma* a. medietate. *Styli* ad apicem usque villosus.

482. LATHYRUS pedunculis multifloris, *cir-praetensis* rhis diphyllis: foliolis ovalibus, internodiis nudis. *Linn. Syst. 3. p. 467.*

In pratis, inter segetes copiose. Junio.

483. LATHYRUS pedunculis multifloris, *cir-sylvestris* rhis diphyllis, foliolis ensiformibus, internodiis membranaceis. *Linn. Syst. 3. p. 467.*

## VICIA. L. G. 947.

*Stigma* obtusum, sub apice transverse barbatum.

\* *Pedunculis elongatis.*

484. VICIA pedunculis multifloris, foliolis *re-dumetorum* flexis ovatis mucronatis, stipulis subdentatis. *Linn. Syst. 3. p. 474.*

In nemoribus montosis: *bey Mauthin auf dem Wall.* Junio. Julio.

- Cracca* 485. *Vicia* pedunculis multifloris: floribus imbricatis, foliolis lanceolatis pubescentibus, stipulis integris. *Linn. Syst.* 3. p. 471.

In sepibus, dumetis, inter segetes, copiosissime, Junio. Julio.

*\*\* Floribus axillaribus subsessilibus.*

- sativa* 486. *Vicia* leguminibus sessilibus subbinatis erectis, foliolis retusis, stipulis notatis. *Linn. Syst.* 3. p. 472.

In agris. inter segetes frequens. Junio. Julio.

- sepium* 487. *Vicia* leguminibus pedicellatis, subquaternis erectis, foliolis ovatis integerrimis, exterioribus decrescentibus. *Linn. Syst.* 3. p. 474.

In memoribus, pratis, sepibus, dumetis copiose. Majo. Junio.

*c. Legumen subbiloculare (nec priorum notae.)*

ASTRAGALUS. L. G. 965.

*Legum.* rotundatum, gibbum, biloculare.

- Cicor* 488. *ASTRAGALUS* caulescens prostratus, leguminibus subglobosis inflatis mucronatis pilosis. *Linn. Syst.* 3. p. 529.

In agris: *bey Malchin vor dem Wargentin-schen Thore auf dem Acker rechter Hand.* Junio. Julio.

489.

489. *ASTRAGALUS caulescens prostratus, leg-<sup>glyciphyllos</sup>  
guminibus subtriquetris arcuatis, foliis pe-  
dunculo longioribus: foliolis ovalibus.*

*Linn. Syst. 3. p. 529.*

In nemoribus: *bey Malchin am Jägeracker*  
et alibi passim. Junio.

d. *Legumina submonospermia (nec prio-  
rum notae.)*

TRIFOLIUM. L.G. 968.

*Flores subcapitati. Legum. vix calyce longius  
non dehiscens. deciduum. 1 - 4 sper-  
muni.*

\* *Meliloti, leguminibus nudis polyspermis.*

490. *TRIFOLIUM leguminibus racemosis nu-<sup>M. officina-</sup>  
dis dispermis rugosis, ouatis, caule erecto. lis*  
*Linn. Syst. 2. p. 547.*

α. *T. odoratum, siue melilotus vulgaris,  
flore luteo Bauh. Histor. 2. p. 370.*

β. *Melilotus officinarum germaniae, flore  
albo Turn. inst. 407.*

α. In campestribus: *bey Malchin am Acker  
vor dem Steinthor ad oppidum Kahlden  
copiosissime. β. Bey Malchin im Mühlen-  
felde bey der faulen Brücke sparsim. Ju-  
nio. Julio.*

*Officin: Meliloti, Herba, Flores.*

\*\* *Le.*

**\*\* Lotoidea, leguminibus rectis, polyspermis.**

*hybridum* 491. TRIFOLIUM capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, caule adscendente.  
*Linn. Syst. 3, p. 549.*

In pratis subhumidis: *bey Malchin auf den Wiesen hinter den Petengärten et alibi passim.*  
Junio. Julio.

*repens* 492. TRIFOLIUM capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis caule repente. *Linn. Syst. 3. p. 549.*

In pratis, pascuis, aggeribus copiosissime.  
Majo. Junio.

*Officin:* Trifolii albi Flores.

**\*\*\* Lagopoda, calycibus villosis.**

*pratense* 493. TRIFOLIUM spicis globosis subvillosis cinctis, stipulis oppositis membranaceis, corollis monopetalis. *Linn. Syst. 3. p. 552.*

In pratis pinguioribus, pomariis ubique  
Aestate.

*alpestre* 494. TRIFOLIUM spicis subglobosis villosis terminalibus, caule erecto foliis lanceolatis serrulatis. *Linn. Syst. 3. p. 553.*

In locis montosis sylvaticis: *bey Witzershoff am Rande der jungen Tannen.* Junio.  
Julio.

*arvense* 495. TRIFOLIUM spicis villosis, ovalibus, dentibus calycinis setaceis villosis aequalibus.  
*Linn. Syst. 3. p. 555.*

In arvis, agris, campis-siccis copiose. Aestate.

**\*\*\*\* Lu-**

\*\*\*\* *Lupulina, vexillis corollae inflexis.*

496. TRIFOLIUM spicis subimbricatis, subtri-<sup>montanum</sup>bus, vexillis subulatis emarcescentibus, calycibus nudis, caule erecto. *Linn. Syst. 3.* p. 560.

In nemorosis ficcis: *am Scheidegraben auf der Seite nach Bafedow.* Junio. Julio.

497. TRIFOLIUM spicis ovalibus imbricatis; <sup>agrarium</sup>vexillis deflexis persistentibus, caule erecto. *Linn. Syst. 3.* p. 560.

Inter segetes, in agris cultis, aruis frequens. Aestate.

498. TRIFOLIUM spicis ovalibus imbricatis, <sup>procumbens</sup>vexillis deflexis persistentibus, caulibus procumbentibus. *Linn. Syst. 3.* p. 561,

In campestribus gramineis frequens. Majo. Junio.

### *e. Legumina subarticulata.*

ORNITHOPUS. L. G. 957.

*Legum.* articulatum, teres, arcuatum.

499. ORNITHOPUS foliis pinnatis, legumini-<sup>pepusillas</sup>bus incurvatis. *Linn. Syst. 3.* p. 494.

In arenosis, aruis, agris, cultis passim. Aestate.

MEDICAGO. L. G. 958.

*Pistill.* incurvatum e carina elastice exiliens eamdemque descedens. *Legum.* compressum arcuatum vel spirale.

K.

500.

*falcata*

500. *MEDICAGO* pedunculis racemosis, leguminibus lanatis, caule prostrato. *Linn.*

*Syst.* 3. p. 574.

In apricis, agris, sepibus, ad vias praesertim:  
*am Wege auf dem remplinischen Felde.*  
Aestate.

*lupulina*

501. *MEDICAGO* spicis ovalibus, leguminibus reniformibus monospermis, caulibus procumbentibus. *Linn. Syst.* 3. p. 575.

In ficcioribus pratis, pascuis, agris ubique.  
Aestate.

*f. Legumina unilocularia polysperma*  
(*nec priorum notae.*)

*ERVUM.* L. G. 948.

*Cal.* 5 - partitus, longitudine fere corollae, laciniiis subaequalibus.

*hirsutum*

502. *ERVUM* pedunculis multifloris, seminibus globosis binis. *Linn. Syst.* 3. p. 477.

In agris, inter segetes, pratis, cultis fere  
ubique. Aestate

*GALEGA.* L. G. 963.

*Cal.* dentibus subulatis, subaequalibus. *Legumen* striis obliquis, seminibus interiectis.

*officinalis*

503. *GALEGA* leguminibus strictis erectis, foliolis lanceolatis striatis nudis. *Linn. Syst.* 3. p. 521.

*Auf dem Wall bey Malchin: an indigena?*

*LOTUS.*

LOTUS. L. G. 969.

*Cal.* tubulosus; alae sursum longitudinaliter conniventes. *Legum.* teres, strictum, farsctum, *Sem.* cylindrica.

504. LOTUS capitulis depressis, caulibus de-corniculacumbentibus, leguminibus cylindricis; *sus* patentibus. *Linn. Syst.* 3. p. 568.

In versuris, pascuis, pratis, ad vias ubique.  
Aestate.

*Officin:* Loti sylvestris Herba, Flores.

---



CLASSIS XVIII.  
POLYADELPHIA  
POLYANDRIA.

HYPERICUM. L. G. 981.

*Cal.* 5-partitus, inferus. *Pet.* 5. *Filam.* in  
3-5. phalanges basi coalita, *Caps.* locu-  
lis numero styliorum.

*quadrangulare* 505. HYPERICUM floribus trigynis, caule qua-  
drato herbaceo. *Linn. Syst.* 3. p 595.

In pratis humidis, iuxta rivulos: *bey Mal-  
chin am Mönchbruch* et alibi frequens.  
Julio.

*perforatum* 506. HYPERICUM floribus trigynis, caule an-  
cipiti, foliis obtusis pellucido-punctatis.  
*Linn. Syst.* 3. p. 595.

In sepibus, dumetis, versuris, pratis ubique Ae-  
state.

*Officin:* Hyperici Herba, Flores.

*humifusum* 507. HYPERICUM floribus trigynis, axillaribus,  
solitariis; caulibus ancipitibus prostratis,  
filiformibus; foliis glabris. *Linn. Syst.* 3.  
p. 596.

In arenosis humidis umbrosis: *bey Pifide am  
Mühlenbruch; bey Malchin im Hayenholze*

*am*

*am jessinschen Wege vor der Jungfern-  
grund. Aestate.*

508. *HYPERICYM floribus trigynis, calycibus monsaum  
ferrato - glandulosis, caule tereti erecto:  
foliis ovatis glabris. Linn. Syst. 3.*

*p. 597.*

*In nemoribus montosis: bey Malchin hinter  
dem Jägerhause et alibi passim. Julio.*

## CLASSIS XIX.

## SYNGENESIA POLYGAMIA

## A. FLORE HERMAPHRODITO.

## AEQUALIS.

a. *Semiflosculosi, corollis omnibus ligulatis.*

CICHORIUM. L. G. 1000.

*Cal.* calyculatus. *Recept.* subpaleaceum. *Pappus* sub 5 - dentatus, obsolete pilosus.*Inisibus* 509. CICHORIUM floribus geminis sessilibus, foliis runcinatis. *Linn. Syst.* 3. p. 665.

In campestribus, ad vias, in versuris, ad sepes vbiq. Julio. Augusto.

*Officin:* Cichorii (Sylvestris) Radix, Herba, Flores.

HYPOCHAERIS. L. G. 997.

*Cal.* subimbricatus: basi ventricosus. *Recept.* paleaceum. *Pappus* stipitatus, plumosus.*maculata* 510. HYPOCHAERIS caule subnudo: ramo solitario, foliis ovato-oblongis, integris dentatis. *Linn. Syst.* 3. p. 661.

In

In pratis montosis nemorosis: *bey Malchin am Lalaerberge* et alibi passim. Junio. Julio.

*Officin:* Herba costae. f. Costi nostratis Herba, Flores.

511. HYPOCHAERIS foliis runcinatis obtusis *radicata* scabris, caule ramofo nudo laevi, pedunculis squamosis. *Linn. Syst.* 3. p. 662.

In versuris, pascuis, *am Wege nach Jessin bey dem Schneider - Kamp*, et alibi passim. Aestate.

*Officin:* Herbae Costae vulgaris Herba, Flores.

TRAGOPOGON. L. G. 984.

*Cal.* simplex: laciniis basi coalitis. *Recept.* nudum. *Pappus* stipitatus plumosus.

512. TRAGOPOGON calycibus corollae radium *pratense* aequantibus, foliis integris, strictis. *Linn. Syst.* 3. p. 611.

In pratis, aggeribus: *auch auf dem Wall bey Malchin* frequens.

*Officin:* Barbae hirci Radix, Herba.

513. TRAGOPOGON calycibus corollae radio *porrifolium* longioribus, foliis integris strictis, pedunculis superne incrassatis. *Linn. Syst.* 3. p. 612.

*Am Wall bey Malchin* et alibi rarius. Junio.

PICRIS. L. G. 986.

*Cal.* calyculatus. *Recept.* nudum. *Sem.* transversim fulcata. *Papp.* plumosus.

*hieracioides* 514. PICRIS perianthiis laxis; foliis integris, pedunculis squamatis in calycem. *Linn. Syst.* 3. p. 619.

In versuris: *bey Malchin am Ufer vor dem Pfort.* Julio. Augusto.

LEONTODON. L. G. 991.

*Cal.* imbricatus: squamis laxis. *Recept.* nudum. *Papp.* plumosus.

*Taraxacum* 515. LEONTODON calyce inferne reflexo, foliis runcinatis, denticulatis, laevibus. *Linn. Syst.* 3. p. 631.

In pascuis, pounariis, pratis, versuris, hortis ubique ab Aprili in Augustum.

*Officin.*: Taraxaci Radix, Herba.

*autumnale* 516. LEONTODON caule ramofo, pedunculis squamofis, foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris. *Linn. Syst.* 3. p. 633.  
In pascuis, pratis, versuris vbique. Julio. Augusto.

*hispidum* 517. LEONTODON calyce, toto erecto hispidulo, foliis dentatis integerrimis hispidis: pilis furcatis. *Linn. Syst.* 2. p. 634.

In nemoribus, versuris et collibus: *bey Pifide vorne im Holze, passim.* Junio. Julio.

SCOR-

SCORZONERA. L. G. 985.

*Cal. imbricatus*: squamis margine scariosis.

*Recept. nudum. Papp. plumosus.*

518. SCORZONERA caule subnudo unifloro, fo- *bumilis*  
liis lato-lanceolatis nervosis planis. *Linn.*

*Syst. 3. p. 615.*

In pratis sylvaticis: *am grammentinschen Hol-*  
*ze*, rarius. Junio. Julio.

*Officin*: Scorzonerae Radix Herba, Semina.

CREPIS. L. G. 993.

*Cal. calyculatus*: squamis difformibus deci-  
duis. *Recept. nudum. Papp. pilosus.*

519. CREPIS foliis lanceolato-runcinatis sessi- *rectorum*  
libus laevibus; inferioribus dentatis. *Linn.*

*Syst. 3. p. 652.*

In agris inter segetes, ad margines agro-  
rum, passim. Aestate.

520. CREPIS foliis runcinato-pinnatifidis sca- *biennis*  
bris: basi superne dentatis, calycibus mu-  
ricatis. *Linn. Syst. 3. p. 653.*

In pomariis, pratis, ad sepes copiose. Aestate.

CHONDRILLA. L. G. 989.

*Cal. calyculatus*, multiflorus. *Recept. nu-*  
*dum. Sem. muricata. Papp. stipitatus*  
*pilosus.*

521. CHONDRILLA foliis radicalibus runcina- *juncea*  
tis; caulinis linearibus integerrimis. *Linn.*

*Syst. 3. p. 627.*

In agris, arvis: auf dem gilowischen Felde  
hinter der Mühle. Julio.

PRENANTHES. L. G. 990.

*Cal.* calyculatus, flosculi simplici serie. *Recept.* nudum. *Pappus* subspitatus, pilosus.

*muralis* 522. PRENANTHES flosculis quinis, foliis runcinatis. *Linn. Syst.* 3. p. 630.

In nemoribus umbrosis copiose. Julio. Augusto.

*Officin:* Chondrillae veterum Herba.

LACTUCA. L. G. 988.

*Cal.* cylindricus, imbricatus; squamis marginem membranaceis. *Recept.* nudum. *Sem.* laevia. *Papp.* stipitatus, pilosus.

*Scariola* 523. LACTUCA foliis verticalibus carina aculeatis. *Linn. Syst.* 3. p. 625.

In ruderatis, aggeribus, ad sepes: bey Malchin vor den Mühlen an den Zäunen links des Schlagbaums. Julio. Augusto.

HIERACIUM. L. G. 992.

*Cal.* imbricatus, ovatus, *Recept.* nudum. *Papp.* sessilis pilosus.

\* *Scapo nudo unifloro.*

*Pilosella* 524. HIERACIUM foliis integerrimis ovatis, subtus tomentosis, stolonibus repentibus scapo unifloro. *Linn. Syst.* 3. p. 638.

In

In aridis ficcis campestribus, collibus, apri-  
cis, copiosissime. Majo. Junio.

*Officin:* Auriculae muris f. Pilosellae Herba,  
Flores.

**\*\* Scapo nudo multifloro.**

525. *HIERACIUM* foliis integris ovato-oblon- *dubium*  
gis, stolonibus repentibus, scapo nudo  
multifloro. *Linn. Syst.* 3. p. 638.

In nemoribus: *bey Malchin am Hayenholze.*  
Junio. Julio.

526. *HIERACIUM* foliis integerrimis lanceola- *Auricula*  
tis, stolonibus repentibus, scapo nudo  
multifloro. *Linn. Syst.* 3. p. 638.

In arvis, pascuis: *hinter der Gölitzer Ziege-  
ley.* Junio. Julio.

**\*\*\* Caule folioso.**

527. *HIERACIUM* caule ramoso, foliis radica- *murorum*  
libus ovatis dentatis, caulino minore.  
*Linn. Syst.* 3. p. 642.

In sylvaticis et nemoribus et alibi copiose.  
Julio. Augusto.

*Officin:* Pulmonariae gallicae Herba.

528. *HIERACIUM* caule paniculato, foliis am- *paludosum*  
plexicaulibus dentatis glabris, calycibus  
hispidis. *Linn. Syst.* 3. p. 643.

In pratis paludosis: *auf der Remplinischen  
Wiese bey der Torffscheune* rarius. Junio.



*fabaudum* 529. *HIERACIUM* caule erecto multifloro, foliis ovato-lanceolatis dentatis femiamplexicaulibus. *Linn. Syst.* 3. p. 647.

In sylvaticis et nemoribus: *in dem kahldischen Holze* et alibi passim. Julio. Augusto.

*umbellatum* 530. *HIERACIUM* foliis linearibus subdentatis sparsis, floribus subumbellatis. *Linn. Syst.* 3. p. 647.

In nemoribus, pascuis: *bey Remplin in der Plantage* et alibi frequens. Julio. Augusto.

### SONCHUS. L. G. 937.

*Cal.* imbricatus, ventricosus. *Recept.* nudum. *Papp.* pilosus.

*arvensis* 531. *SONCHUS* pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis, foliis runcinatis, basi cordatis. *Linn. Syst.* 3. p. 621.

In agris inter segetes frequens. Aestate.

*oleraceus* 532. *SONCHUS* pedunculis tomentosis, calycibus glabris. *Linn. Syst.* 3. p. 621.

*α.* *S. oleraceus* laevis ibid.

*β.* *S. oleraceus* asper. L. loc. cit.

In cultis, oleraceis, ad sepes vbique. Aestate.

*Officin:* *α.* *Sonchi* laevis. *β.* *Sonchi* asperi Herba.

### LAPSANA. L. G. 998.

*Cal.* calyculatus, angulatus: squamis interioribus canaliculatis. *Recept.* nudum.

## POLYGAMIA AEQUALIS. 157

533. LAPSANA calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramosissimis. *Linn. Syst.*

3. p. 663.

In hortis, cultis copiosissime. Aestate.

HYOSERIS. L. G. 995.

*Cal.* subaequalis. *Recept.* nudum. *Pappus* pilosus calyculatusque.

534. HYOSERIS caule diviso nudo, pedunculis *minima* incrassatis. *Linn. Syst.* 3. p. 658.

In agris arenosis arvis inter segetes: *bey Jesh-*  
*fin auf dem Acker.* Julio. Augusto.

### b. Capitati.

CARLINA. L. G. 1008.

*Cal.* inbricatus, radiatus squamis interioribus longis, nitidis, coloratis.

535. CARLINA caule multifloro corymboso, *vulgaris* floribus terminalibus, calycibus radio albo.

*Linn. Syst.* 3. p. 693.

In montosis asperis: *auf den goschendorffer*  
*Bergen am Priesterholze.* Julio. Augusto.

*Officin:* Heracanthae Radix.

CNICUS. L. G. 1005.

*Cal.* ovatus, obvallatus bracteis, imbricatus: squamis ramoso-spinosis. Corollulae aequales.

536. CNICUS foliis pinnatifidis carinatis nudis. *oleraceus* bracteis concavis integris subcoloratis.

*Linn. Syst.* 3. p. 687.

In

In pratis humentibus: bey Malchin auf den  
Wiesen hinter den Peengärten copiose. Ju-  
lio. Augusto.

ARCTIUM. L. G. 1002.

*Cal.* globosus: squamis apice inflexo-hu-  
midis.

*Lappa* 537. ARCTIUM foliis cordatis inermibus petio-  
latis. *Linn. Syst.* 3. p. 667.

In ruderatis; ad vias ubique. Julio. Au-  
gusto.

*Officin:* Bardonae Radix.

CARDUUS. L. G. 1004.

\* *Foliis decurrentibus.*

*Cal.* ventricosus: squamis spinosis. *Recept.*  
pilosum. *Papp.* sessilis.

*lanceolatus* 538. CARDUUS foliis decurrentibus pinnatifidis:  
laciniis divaricatis, calycibus ovatis spinosis  
villosis, caule piloso. *Linn. Syst.* 3. p. 674.

In ruderatis, pascuis, aggeribus, vulgaris. Ju-  
lio. Augusto.

*nusans* 539. CARDUUS foliis semidecurrentibus spino-  
sis, floribus cernuis: squamis calycinis  
superne patentibus. *Linn. Syst.* 3. p. 675.

Ad vias, pagos copiose. Julio. Augusto.

*crispus* 540. CARDUUS foliis decurrentibus sinuatis:  
margine spinosis, floribus adgregatis  
terminalibus, squamis calycinis inermibus  
subaristatis patulis. *Linn. Syst.* 3. p. 676.

In

# POLYGAMIA AEQUALIS. 159

In agris cultis ad sepes frequens. Julio. Augusto.

*\*\* Foliis sessilibus.*

541. CARDUUS foliis amplexicaulibus hastato-pinnatifidis spinosis, calycibus aphyllis: spinis canaliculatis duplicato-spinosis. *Linn. Syst. 3. p. 682.*

In cultis, ruderatis, ad sepes: *bey Malchin an Gärten vor dem Steinthor.* Julio. Augusto.

*Officin: Cardui Mariae, Herba, Semina.*

542. CARDUUS calyce glabro. *Linn. Syst. 3. p. 686.*

In collibus apricis: *bey Remplin auf dem Berge an der Promenade.* Julio. Augusto.

ONOPORDON. L. G. 1006,

*Cal. ventricosus, imbricatus, squamis spinosis. Recept. nudum, favosum. Papp. capillaris.*

543. ONOPORDUM calycibus squarrosis: squamis patentibus; foliis ovato-oblongis sinuatis. *Linn. Syst. 3. p. 690.*

In ruderatis, aggeribus, ad vias passim. Julio. Augusto.

*Officin: Acanthii vulgaris Herba, Semina.*

SERRATULA. L. G. 1003.

*Cal. subcylindricus imbricatus: squamis acutiusculis, muticis.*

- zinnifolia* 544. SERRATULA foliis lyrato-pinnatifidis pinna terminali maxima. *Linn. Syst.* 3. p. 668.  
In pratis sylvaticis: *an der Scheide bey dem goschendorffer Priesterholze.* Julio. Augusto.
- arvensis* 445. SERRATULA foliis spinosis. *Linn. Syst.* 3. p. 673.  
In agris, arvis, inter segetes ubique. Julio, Augusto.

c. *Discoidei.*

## EUPATORIUM. L. G. 1015.

- Cal.* oblongus, imbricatus. *Styl.* longissimus, ad stamina usque bifidus. *Recept.* nudum. *Papp.* sessilis.
- canabinum* 546. EUPATORIUM foliis digitatis. *Linn. Syst.* 3. p. 717.  
Ad ripas fossarum rivulorum piscinarum: *bey Malchin an dem Mühlenbruch bey dem Strauchwerder* et alibi frequens, Julio. Augusto.
- Officin:* Eupatorii (Mesues) Herba.

## BIDENS. L. G. 1012.

- Cal.* imbricatus. *Cor.* rarius flosculo uno alterove radiante instruitur. *Recept.* paleaceum. *Papp.* aristis rectis, scabris.
- tripartita* 547. BIDENS foliis trifidis, calycibus subfoliosis feminibus erectis. *Linn. Syst.* 3. p. 703.

In

## POLYGAMIA SUPERFLUA. 161

In inundatis, ad fossas ubique. Julio. Augusto.

548. *BIDENS* foliis lanceolatis sessilibus, flori- *minima*  
bus feminibusque erectis. *Linn. Syst.* 3.  
p. 703.

In locis humidis turfosis: *bey Malchin auf dem neuen Rücken* frequens. Julio. Augusto.

Certe varietas sequentis.

549. *BIDENS* foliis lanceolatis amplexicaulibus, *cernua*  
floribus cernuis, feminibus erectis. *Linn.*  
*Syst.* 3. p. 704.

Iisdem locis cum praecedentibus frequens.  
Julio. Augusto.

## POLYGAMIA SUPERFLUA.

### a. *Discoidei.*

*ARTEMISIA*. L. G. 1025.

*Cal.* imbricatus: squamis rotundatis conniventibus. *Cor.* radii nullae. *Recept.* nudum, vel subvillosum. *Papp.* nullus.

\* *Procumbentes ante florescentiam.*

550. *ARTEMISIA* foliis multifidis linearibus *campestris*  
caulibus procumbentibus virgatis. *Linn.*  
*Syst.* 3. p. 740.

In campestribus apricis: *am Wege nach Remplin* et alibi frequens. Augusto. Septembri.

L

\*\* *Era.*

**\*\* Erectae, herbaceae, foliis compositis.**

*Abfynthi-  
um*

551. ARTEMISIA foliis compositis multifidis  
floribus receptaculo villosis. *Linn. Syst.* 3.

p. 743.

In ruderatis ad pagos ubique, Julio. Au-  
gusto.

*Officin:* Abfynthii vulgaris Herba.

*vulgaris*

552. ARTEMISIA foliis pinnatifidis planis in-  
cisis subtus tomentosis, racemis simplici-  
bus recurvatis, florum radio quinqueflo-  
ro. *Linn. Syst.* 3. p. 744.

In versuris, ruderatis, ad vias, sepes copio-  
se. Julio. Augusto.

*Officin:* Artemisiae Herba.

TANACETUM. L. G. 1024.

*Cal.* imbricatus, hemisphaericus: squamis  
acutis. *Cor.* radii obsolete trifidae. *Re-*  
*cept.* convexum nudum. *Papp.* submar-  
ginatus.

*vulgare*

553. TANACETUM foliis bipinnatis incisis ser-  
ratis. *Linn. Syst.* 3. p. 736.

In aggeribus, versuris, dumetis, nemoro-  
sis copiose. Julio. Augusto.

*Officin:* Tanaceti Herba, Flores, Semina.

GNAPHALIUM, L. G. 1026.

*Cal.* imbricatus: squamis marginalibus ro-  
tundatis, concavis, scariosis, coloratis.  
*Recept.* nudum.

• *Chry.*

\* *Chrysocomum.*

- §54. GNAPHALIUM herbaceum, foliis lanceo-*arenarium*  
latis inferioribus obtusis, corymbo com-  
posito, caule simplicissimo. *Linn. Syst. 3.*  
p. 754.

In campestribus arenosis collibus, ad vias  
frequens. Junio. Julio.

*Officin:* Stoechadis citrinae Flores.

\*\* *Argyrocomum.*

- §55. GNAPHALIUM sarmentis procumbenti-*dioicum*  
bus, caule simplicissimo, corymbo sim-  
plici terminali floribus dioicis. *Linn.*  
*Syst. 3.* p. 759.

In collibus apricis copiose. Majo. Junio.

*Officin:* Gnaphalii Flores.

\*\*\* *Filaginoidea.*

- §56. GNAPHALIUM caule herbaceo simplicif-*sylvaticum*  
simo, floribus sparsis. *Linn. Syst. 3.*  
p. 766.

In sylvaticis: *bey Malchin im Heyenholze* et  
alibi frequens. Julio, Augusto.

- §57. GNAPHALIUM caule ramoso diffuso, flo-*uliginosum*  
ribus confertis terminalibus. *Linn. Syst. 3.*  
p. 761.

In inundatis copiose. Julio. Augusto.



## b. Radiati.

BELLIS. L. G. 1042.

*Cal.* hemisphaericus; foliolis aequalibus. *Recept.* conicum nudum. *Sem.* obovata. *Papp.* nullus.

*perennis* 558. BELLIS scapo nudo. *Linn. Syst.* 3. p. 838.

In pascuis, pratis, ad vias ubique. *Martio.* Aprili. et toto fere anno.

*Officin:* Bellidis minoris Herba.

MATRICARIA. L. G. 1049.

*Cal.* hemisphaericus, imbricatus squamis linearibus, subaequalibus. *Recept.* convexum nudum. *Papp.* nullus.

*Partbenium* 559. MATRICARIA foliis compositis planis; foliolis ovatis incisis, pedunculis ramosis. *Linn. Syst.* 3. p. 852.

In ruderatis cultis, ad sepes: *bey Malchin vor dem Steinhof an den Gärten.* *Julio.*

*Officin:* Matricariae Herba, Flores.

*maritima* 560. MATRICARIA receptaculis hemisphaericis, foliis bipinnatis, subcarnosis, supra convexis, subtus earinatis. *Linn. Syst.* 3. p. 852.

Ad littora maris baltici: *bey Warnemünde.* Augusto. Septembri.

*Chamomilla* 561. MATRICARIA receptaculis conicis, radiis patentibus, feminibus nudis, squamis calycinis

POLYGAMIA SUPERFLUA. 165

cinis margine aequalibus. *Linn. Syst.* 3.  
p. 853.

In agris fecalinis, cultis, ruderatis copiose.  
Junio. Julio.

*Officin:* Chamomillae nostratis Herba, Flores.

CHRYSANTHEMUM. L. G. 1048.

*Cal.* hemisphaericus, imbricatus: squamis  
margine scariosis; intimis in membranam  
pellucidam terminatis. *Recept.* convexum  
nudum. *Papp.* nullus.

\* *Leucanthema*, radio albo.

562. CHRYSANTHEMUM foliis amplexicauli-*leucanthemum*  
bus oblongis superne ferratis; inferne  
dentatis. *Linn. Syst.* 3. p. 845.

In versuris. pratis, ad vias; inter segetes pas-  
sim. Junio. Julio.

*Officin:* Bellidis maioris Herba, Flores.

563. CHRYSANTHEMUM foliis pinnatis multi-*inodorum*  
fidis caule, ramoso diffuso. *Linn. Syst.* 3.  
p. 847.

In cultis, ruderatis, agris frequens. Julio.  
Augusto.

\*\* *Chrysanthemum* radio luteo.

564. CHRYSANTHEMUM foliis amplexicaulibus; *segetum*  
superne laciniatis; inferne dentato-ferra-  
tis. *Linn. Syst.* 3. p. 849.

## CINERARIA. L. G. 1036.

*Cal. simplex, polyphyllus, aequalis. Recept. nudum. Papp. pilosus.*

- palustris* 572. CINERARIA floribus corymbosis, foliis lanceolatis dentato-sinuatis, caule villoso.  
*Linn. Syst. 3. p. 820.*

Ad fossas, in pratis humidis: *am Damm bey Levetzow bey Malchin* et albi copiose.  
Majo. Junio.

## SENECIO. L. G. 1033.

*Cal. calyculatus, cylindricus: squamis apice sphacelatis. Recept. nudum. Papp. pilosus.*

\* *Floribus flosculosis.*

- vulgaris* 573. SENECIO, corollis nudis, foliis pinnato-sinuatis amplexicaulibus, floribus sparsis.  
*Linn. Syst. 3. p. 789.*

In hortis, ruderatis, ad muros, sepes copiosissime; primo vere ad hyemem usque.

*Officin: Senecionis Herba.*

\*\* *Floribus radiatis: radio revolutis.*

- viscosus* 574. SENECIO corollis revolutis, foliis pinnatifidis viscidis: squamis calycinis laxis, longitudine perianthii. *Linn. Syst. 3. p. 791.*

In ruderatis cultis: *bey Malchin an den Gärten, an dem Steinthor.* Julio. Augusto.

575. SENEIO corollis revolutis, foliis pinna- *sylvaticus*  
tidis denticulatis, caule corymbofo ere-  
cto. *Linn. Syst.* 3. p. 792.

In nemoribus humidis. *Im Hayenholze an  
dem Teich bey der grofsen Sandgrube.* Ju-  
lio. Augusto.

\*\*\* *Floribus radiatis; radio patente.*

576. SENEIO corollis radiantibus, foliis pin- *Jacobaea*  
nato-lyratis; laciniis lacinulatis: caule  
erecto. *Linn. Syst.* 3. p. 796.

In pascuis, ad versuras, sepes vbique. Julio.  
Augusto.

*Officin:* Jacobeeae Herba Flores.

TUSSILAGO. L. G. 1032.

*Calyc.* squamae aequales, discum aequantes,  
submenbranaceae. *Recept.* nudum. *Papp.*  
pilosus.

577. TUSSILAGO scapo imbricato unifloro, *Farfara*  
foliis subcordatis angulatis denticulatis.  
*Linn. Syst.* 3. p. 786.

In agris argillofis vbique. Martio. Aprili.

*Officin:* Tussilaginis. f. Farfarae Radix, Her-  
ba, Flores.

578. TUSSILAGO thyrso ovato, flosculis fe- *Petasites*  
mineis nudis paucis. *Linn. Syst.* 3. p.  
787.

In pratis humidis: *bey Malchin auf der Käm-  
mery Wiese* et alibi frequens. Aprili.

*Officin:* Petasitidis Radix, Flores.

## ASTER. L. G. 1034.

*Cal.* imbricatus: squamis interioribus patulis.

*Cor.* radii 10. plures. *Recept.* nudum.

*Papp.* pilosus.

*Tripolium* 579. ASTER foliis lanceolatis integerrimis car-  
nolis glabris, ramis inaequatis, floribus  
corymbosis. *Linn. Syst.* 3. p. 805.

Ad littora maris baltici praesertim: *bey War-  
nemünde* copiose. Julio. Augusto.

## ANTHEMIS. L. G. 1052.

*Cal.* hemisphaericus: squamis subaequalibus

*Cor.* Radii 5. plures. *Recept.* paleaceum.

*Papp.* nullus.

\* *Radio discolori, seu albo.*

*Cotula* 580. ANTHEMIS receptaculis conicis, paleis  
setaceis, feminibus nudis. *Linn. Syst.* 3.  
p. 863.

In ruderatis sparsim. Junio. Julio.

*Officin:* Cotulae f. Chamomillae foetidae  
Herba, Flores.

\*\* *Radio concolare f. luteo.*

*cincloria* 581. ANTHEMIS foliis bipinnatis ferratis, sub-  
tus tomentosis caule corymboso. *Linn.*  
*Syst.* 3. p. 865.

In siccis, apricis, muris: *bey Malshin an der*  
*Stadtmauer*, et alibi passim. Julio. Au-  
gusto.

ACHIL-

## POLYGAMIA FRUSTRANEA. 171

ACHILLEA. L. G. 1053.

*Cal.* ovatus, imbricatus. *Cor.* radii 5-10.  
*Recept.* paleaceum. *Papp.* nullus.

*Parmica* 582. ACHILLEA foliis lanceolatis acuminatis,  
argute ferratis. *Linn. Syst.* 3. p. 869.

In agris, pratis: *bey der rostocker Fehre* pas-  
sim. Junio. Julio.

*Officin:* Parmicae Radix, Herba, Flores.

*Millefo-* 583. ACHILLEA foliis bipinnatis nudis: laci-  
*lium* niis linearibus dentatis, caulibus superne  
fulcatis. *Linn. Syst.* 3. p. 871.

*α.* Millefolium vulgare album. *Bauhin Pin.*  
140.

*β.* M. purpureum, *Tab. histor.* 374.

In pratis, pascuis, versuris vbique. *β.* rarius.

*Officin:* Millefolii Herba, Flores.

## POLYGAMIA FRUSTRANEA.

CENTAUREA. L. G. 1066.

*Cal.* radii longiores, infundibuliformes irre-  
gulares. *Recept.* fetosum. *Papp.* pilosus.

\* *Cyani, calycinis squamis ferrato-ciliatis.*

*Cyanus* 584. CENTAUREA calycibus ferratis, foliis li-  
nearibus integerrimis: infimis dentatis.  
*Linn. Syst.* 3. p. 901.

Inter segetes vbique. Junio. Julio.

*Officin:* Cyani Flores.

*paniculata* 585. CENTAUREA calycibus ciliatis: squamis  
planis, foliis bipinnatifidis; rameis pin-  
nati-

natifidis linearibus, caule paniculato. *Linn. Syst.* 3. p. 901.

In aridis apricis, ad vias: *an dem Wege nach Dempzin bey der Bentz.* Junio. Julio.

*Scabiosa* 586. *CENTAUREA* calycibus ciliatis, foliis pinatifidis: pinnis lanceolatis. *Linn. Syst.* 3. p. 904.

In agris, ad verfuras, inter segetes vbique. Junio. Julio.

\*\* *Rhapontica*: calycinis squamis aridis scariosis.

*Yacea* 587. *CENTAUREA* calycibus scariosis laceris, foliis lanceolatis; radicalibus sinuato-dentatis, ramis angulatis. *Linn. Syst.* 3. p. 906.

In pratis nemorosis ad aggeres vbique. Julio. Augusto.

COREOPSIS. L. G. 1062.

*Recept.* paleaceum. *Pappus* bicornis. *Cal.* erectus, polyphyllus, basi radiis patentibus cinctus.

*Bidens* 588. *COREOPSIS* foliis lanceolatis ferratis oppositis amplexicaulibus. *Linn. Syst.* 3. p. 891.

In fossis, locis inundatis: *bey Malchin am Mönchbruck* et alibi frequens. Julio. Augusto.

POLY-

POLYGAMIA NECESSARIA. 173

POLYGAMIA NECESSARIA.

FILAGO. L. G. 1079.

*Recept.* nudum, *Pappus* nullus. *Cal.* imbricatus. *Flosculi* inter *squamas calycis* locati.

589. FILAGO panicula dichotoma, floribus *germanica* rotundatis, axillaribus hirsutis, foliis acutis. *Linn. Syst.* 3. p. 939.

In arvis, cultis: *bey Malchin in den Peengärten* et alibi passim. Aestate.

CALENDULA. L. G. 1073.

*Cal.* simplex polyphyllus; segmentis subaequalibus. *Recept.* nudum. *Papp.* nullus.

590. CALENDULA seminibus cymbiformibus *officinalis* muricatis incurvatis omnibus — *Linn. Syst.* 3. p. 924.

In cultis, reiectaneis hortorum, ad sepes passim. Aestate.

*Officin:* Culendulae Herba, Flores, Semina.

MONOGAMIA.

JASIONE. L. G. 1090.

*Cal.* communis polyphyllus; proprius 5-fidus, superus persistens. *Cor.* 5-petalae regulares. *Caps.* biloculares, polyspermae.

591. JASIONE. *Linn. Syst.* 3. p. 953. *montana*

In montibus siccis aridis: *am Berge hinter dem Pfort bey Malchin.* Aestate.

VIOLA.



---

GRAMINA  
ET  
GRAMINIBUS ADFINIA.  
GENITALIUM TEGMINIBUS  
GLUMACEIS.

---

A. FLORE HERMAPHRODITO.

DIANDRIA. DIGYNIA.

ANTHOXANTHUM. L. G. 46.

*Cal.* Gluma 2-valvis 1-flora. *Cor.* gluma  
2-valvis aristata.

*Oderatum* 597. ANTHOXANTHUM spica ovato-oblonga,  
flosculis subpedunculatis, arista longiori-  
bus. *Linn. Syst.* 1. p. 74.

In pratis, pascuis, nemoribus. April.  
Majo.

SCHOENUS. L. G. 71.

*Cal.* 1-valvis: glumis paleaceis congestis.  
*Cor.* o. *Sem.* 1. subrotundum.

*Mariscus* 598. SCHOENUS culmo tereti, foliis margine  
dorsoque aculeatis. *Linn. Syst.* 1.  
p. 17.

In

In palustribus: *bey den Torffgruben vor dem Kahldischen Thore; in dem Moor bey der Gölitzer Ziegeley. Julio.*

599. *SCHOENUS* culmo teretri nudo, capitulo *nigricans* ovato, involucris diphylli valvula altera subulata longa. *Linn. Syst. 1. p. 118.*

*Auf der Wiese bey Pifda bey der Peene. Julio.*

600. *SCHOENUS* culmo subtriquetro nudo, *compressus* spica disticha, involucro monophyllo. *Linn. Syst. 1. p. 121.*

In uliginosis: *an dem Fußsteige am Pfort.*

*CYPERUS. L. G. 72.*

*Cal. 1-valvis: glum. paleaceis distiche imbricatis. Cor. 0. Sem. 1. triquetrum nudum.*

601. *CYPERUS* culmo triquetro nudo, umbel. *flavescens* la triphylla, pedunculis simplicibus inaequalibus, spicis confertis lanceolatis. *Linn. Syst. 1. p. 127.*

In inundatis: *an der Brücke rechts wenn man nach dem Walmstorffer Soll geht. Julio.*

602. *CYPERUS* culmo triquetro nudo, umbella *fuscus* trifida, pedunculis simplicibus, spicis confertis linearibus. *Linn. Syst. 3. p. 127.*

In uliginosis: *auf dem Bornberge; auch an dem Fußsteige bey dem Pfort.*

## SCIRPUS. L. G. 73.

*Cal.* 1 - valvis. *Glum.* paleaceis undique imbricatis. *Cor.* o. *Sem.* 1. triquetrum, villis calyce brevioribus instructum.

\* *Spica unica.*

*bacostriyon* 603. SCIRPUS culmo teretri striatro nudo basi vaginato, vagina truncata, spica terminali pauciflora bivalvi: valvulis ovatis, spica brevioribus, margine scariosis: exteriori breviori. *Linn. Suppl.* 103.

In inundatis: *am Pfort.* Junio.

*palustris* 604. SCIRPUS culmo tereti nudo, spica subovata terminali. *Linn. Syst.* 1. p. 130.

In pratis ubique. Majo.

*acicularis* 605. SCIRPUS culmo tereti nudo, setiformi, spica ovata terminali bivalvi, seminibus nudis. *Linn. Syst.* 1. p. 132.

In inundatis: *bey dem Galgen.* Julio.

\*\* *Culmo tereti polystachio.*

*lacustris* 606. SCIRPUS culmo tereti nudo, spicis ovatis pluribus pedunculatis terminalibus. *Linn. Syst.* 1. p. 132.

In piscinis copiose. Aestate.

*sesacens* 607. SCIRPUS culmo nudo setaceo, spica terminali sessili. *Linn. Syst.* 3. p. 134.

In paludosis: *an dem Berge auf den nassen Stellen vorne im kahldischen Holze.* Aestate.

\*\*\* *Cul.*

\*\*\* *Culmo triquetro, panicula foliacea.*

608. SCIRPUS culmo triquetro, panicula con-*maritimus*  
globata foliacea, spicularum squamis tri-  
fidis: intermedia subulata. *Linn. Syst. 1.*

p. 138.

α. S. maritimus, spicis sessilibus.

β. — — spicis sessilibus et peduncu-  
latis.

*An der Warnau überall an jener Seite von Ro-  
stoch.*

609. SCIRPUS culmo triquetro folioso, um-*sylvaticus*  
bella foliacea, pedunculis nudis supra de-  
compositis, spicis confertis. *Linn. Syst.*

1. p. 139.

*Auf den Wiesen an der Peene. Junio.*

#### ERIOPHORUM. L. G. 74.

*Cal.* 1-valvis: glumis paleaceis undique im-  
bricatis. *Cor.* o. *Sem.* 1. villis spica lon-  
gioribus cinctum.

610. ERIOPHORUM culmis vaginatis teretibus, *vaginarum*  
spica cariota. *Linn. Syst. 1. p. 142.*

*In pratis turfosis: bey dem Eisenberge bey  
Malchin copiose. Majo.*

611. ERIOPHORUM culmis teretibus, foliis pla-*polystach-*  
niis, spicis pedunculatis. *Linn. Syst. 1. on*

p. 143.

*Iisdem locis et tempore.*

## NARDUS. L. G. 75.

*Cal.* 0. *Cor.* 2-valvis. *Sem.* corolla adnata, toctum.

*stricta* 612. NARDUS spica setacea recta secunda. *Linn. Syst.* 1. p. 144.

In subhumidis: bey Teutemwinkel. Junio. Julio.

## DIGYNIA.

## a. Gramina spiculis 1-floris vagis.

## PHALARIS. L. G. 80.

*Cal.* 2-valvis: valvulis carinatis, longitudine aequalibus, corollam includentibus.

*phleoides* 613. PHALARIS panicula cylindrica spiciformi glabra: passim vivipara. *Linn. Syst.* 1. p. 149.

In aridis: auf dem Scheidegraben nach Bessedow zu. Junio. Julio.

*arundinacea* 614. PHALARIS panicula oblonga ventricosa ampla. *Linn. Syst.* 1. p. 150.

In subhumidis: am Holze nach Gofshendorff, Junio.

## PANICUM. L. G. 82.

*Cal.* 3-valvis: valvula teretia dorsali minima.

*Cor.* 2-valvis.

*glaucum* 615. PANICUM spica tereti, involucellis unifloris fasciculato-setosis, seminibus undulato rugosis. *Linn. Syst.* 1. p. 153.

In

In agris copiosissime. Aestate.

616. PANICUM spicis alternis coningatisque, *Crus galli*  
spiculis subdivisis, glumis aristatis hispidis.

α. Gramen paniceum spica divisa. / Bauhin.

Pinax 8.

β. Gramen paniceum, spica divisa, aristis  
longis armata Bauh. Pin. 8.

In subhumidis: *bey Malchin vor dem war-  
gentinschen Thore am Graben.* Aestate.

617. PANICUM spicis digitatis, basi interiore *sanguinale*  
nodosis, flosculis geminis muticis, vagi-  
nis foliorum punctatis.

*Auf dem sandigten Acker bey dem Witzerhoff.*  
Aestate.

#### PHLEUM. L. G. 83.

*Cal.* 2 - valvis, linearis, aequalis, truncatus:  
apice bicuspidato. *Cor.* 2 - valvis, mu-  
tica.

618. PHLEUM spica cylindrica longissima *ci-pravense*  
liata, culmo erecto. *Linn. Syst.* 1. p.  
162.

In pratis frequens. Aestate.

619. PHLEUM spica cylindrica, culmo adscen- *nodosum*  
dente, foliis obliquis, radice bulbosa.  
*Linn. Syst.* 1. p. 163.

In versuris, ad vias ubique. Aestate.

#### ALOPECURUS. L. G. 84.

620. ALOPECURUS culmo spicato infracto. *geniculatus*  
*Linn. Syst.* 1. p. 165.

## MILIUM. L. G. 85.

*Cal.* 2-valvis: valvis subaequalibus ventricosis.

*Cor.* 2-valvis, ovata, brevissima: valvula altera minore. *Stigmata* penicilliformia.

*effusum* 621. MILIUM floribus paniculatis, dispersis muticis. *Linn. Syst.* 1. p. 168.

In nemoribus umbrosis: *bey Malchin im Hayenholze* et alibi. Junio.

## AGROSTIS. L. G. 86.

*Cal.* 2-valvis: valvulis acutis. *Cor.* 2-valvis acuminata. *Stigmata* longitudinaliter hispida.

\* *Aristatae.*

*spica venti* 622. AGROSTIS petalo exteriori arista recta stricta longissima, panicula patula. *Linn. Syst.* 1. p. 169.

In agris, cultis inter segetes ubique. Julio.

*arundinacea* 623. AGROSTIS panicula oblonga, petalo exteriori basi villoso aristaeque torta, calyce longiore. *Linn. Syst.* 1. p. 171.

In nemoribus: *gleich vorne im kahldischen Holze.* Junio.

\*\* *Muticae.*

*Kolonifera* 624. AGROSTIS paniculae ramulis patentibus muticis, culmo repente, calycibus aequalibus. *Linn. Syst.* 1. p. 173.

In versuris siccis et humidis frequens: *am Pfort, auch auf dem Acker bey dem Malchinischen Stadthäger.* Junio.

625. AGROSTIS panicula capillari patente, ca-  
lycibus subulatis aequalibus hispidiusculis  
coloratis, flosculis muticis. *Linn. Syst.* 1.  
p. 174.

*Auf den Ackerwiesen bey Malchin vor dem  
Steinthore Aestate.*

*b. Gramina, spiculis 2-floris vagis.*

AIRA. L. G. 87.

*Cal.* 2-valvis. *Flosculi* 2. absque interiecto ru-  
dimento tertii. *Cor.* 2-valvis: altera val-  
vula saepe ad basin aristata.

\* *Muticae.*

626. AIRA foliis planis, panicula patente, flo-  
ribus muticis laevibus, calyce longioribus. *aquatica*  
*Linn. Syst.* 1. p. 177.

*In pratis aquosis: praesertim auf der Wiese  
hinter dem Jäger. Julio. Variat spiculis bi-  
et multifloris.*

\*\* *Aristatae.*

627. AIRA foliis planis, panicula patente, pe-  
talis basi villosis aristatisque: arista re-  
cta brevi. *Linn. Syst.* 1. p. 178.

*In pratis humidis et fossis v. g.: In dem Gra-  
ben bey Witzerhoff. Julio. Augusto.*

628. AIRA foliis setaceis, culmis, panicula flexuosa  
divaricata, pedunculis flexuosis. *Linn.*  
*Syst.* 1. p. 179.



In montosis ad pagum: *Goschendorff auf den Bergen.* Junio.

*canescens* 629. AIRA foliis setaceis, summo spathaceo paniculam inferne involvente. *Linn. Syst.* 1. p. 180.

In arvis arenosis ad pagum *Gilow* et alibi. Julio.

*præcox* 630. AIRA foliis setaceis: vaginis angulatis, floribus paniculato-spicatis, flosculis basi aristatis. *Linn. Syst.* 1. p. 180.

In arenosis humidis: ad oppidum *Malchin an dem Gerichtsbruch.* Julio.

*cariphylla* 631. AIRA foliis setaceis panicula divaricata, floribus aristatis distantibus. *Linn. Syst.* 1. p. 180.

In arenosis ubique: *bey Pifde neben den Dornbüschen.* Majo.

MELICA. L. G. 88.

*Cal.* 2-valvis. *Flosculi* 2. cum interiecto rudimento tertii (*interdum etiam quarti.*)  
*Cor.* 2. valvis, mutica.

*nucans* 632. MELICA petalis imberbius, panicula nutante simplici. *Linn. Syst.* 1. p. 182.

Habitat ad pagum *Pifde im Gehölze.* Majo.

*uniflora* 633. MELICA panicula rara, calycibus bisfloris, flosculo altero hermaphrodito, altero neutro. *Rez. Obs. bot. Fasc.* 1. p. 10. n. 9.

Cum præcedente passim. Majo.

634.

634. MELICA panicula coarctata floribus cy-coeruleis;  
lindricis. *Linn. Syst.* 1. p. 183.

In pratis aquosis: praesertim ad fluvium  
*Peene bey Malchin links der Zugbrücke.*  
Augusto.

DACTYLIS. L. G. 92.

*Cal.* 2 - valvis compressus: altera valvula  
maiore, carinata. *Flosculi* 2 - 3. (rarius  
4.) absque interiecto radimento. *Cor.* 2-  
valvis; altera valvula apice aristata.

635. DACTYLIS panicula secunda glomerata. *glomerata*  
*Linn. Syst.* 1. p. 97.

In nemoribus, pratis, pomariis copiose.  
Junio. Julio.

*c. Gramina, spiculis multifloris vagis*

POA. L. G. 89.

*Spicul.* ovato oblongae. *Cal.* 2 - valvis mu-  
ticus, valvulis ovatis, acuminatis. *Cor.*  
2. valvis: valvulis acutiusculis margine  
scariosis.

636. POA panicula diffusa spiculis sexifloris li. *aquatica*  
nearibus. *Linn. Syst.* 3. p. 184.

Ad ripas fossarum: ad oppidum *Malchin am*  
*Pfort.* Junio.

637. POA panicula subdiffusa, spiculis trifloris *trivialis*  
basi pubescentibus, culmo erecto teretris,  
membrana foliorum brevi truncata, foliis

M 5

planis:

planis: vagina glabra. Leyffer no. 89.  
*Linn. Syst.* 1. p. 185.

In siccioribus: in den Tannen rechts am Wege nach Jessin. Junio.

*angustifolia*

638. *POA* panicula diffusa, spiculis quadrifloris pubescentibus, culmo erecto tereti, *Linn. Syst.* 1. p. 186.

In versuris: ad oppidum Malchin vor dem wargentinschen Thore rechts des hollen Weges. Junio.

*pratensis*

639. *POA* panicula diffusa, spiculis quinquefloris glabris, culmo erecto tereti. *Linn. Syst.* 1. p. 186.

In pratis humidis: auf den Wiesen an der Peene bey Malchin vor dem Steinthore.

*Observ.* Spiculae semper 2-florae.

*annua*

640. *POA* panicula diffusa angulis rectis: spiculis obtusis, culmo obliquo compresso. *Linn. Syst.* 1. p. 187.

In cultis copiosissime Aprili usque in Hyemem.

*compressa*

641. *POA* panicula coarctata secunda, culmo obliquo compresso. *Linn. Syst.* 1. p. 196.

In muris: praesertim auf der Mauer zwischen den beyden Thürmen des Steinthores in Malchin. Junio. Julio.

*nemoralis*

642. *POA* panicula attenuata, spiculis subfloris mucronatis scabris, culmo incurvo. *Linn. Syst.* 1. p. 191.

In

In nemorosis ubique: *im Hayenholze. auch auf dem Wall bey Malchin.* Junio.

643. *POA panicula spicata calycibus, subquadrifloris pedunculo longioribus, petalis aristatis.* *Linn. Syst. 1. p. 193.*

In aridis siccis: *bey Malchin auf dem Lalaerberge.* Junio.

BRIZA. L. G. 90.

*Cal. 2-valvis. Spicul. distichae. Cor. 2-valvis: valvula exteriore cordata, obtusa; interiore minore oblonga.*

644. BRIZA spiculis ovatis, calyce flosculis *medio* brevioribus. *Linn. Syst. 1. p. 194.*

In pratis frequens. Junio.

CYNOSURUS. L. G. 93.

*Receptaculum commune, unilaterale, foliaceum, multiflorum. Cal. partialis 2-valvis multiflorus.*

645. CYNOSURUS bracteis pinnatifidis. *Linn. cristatus Syst. 1. pagin. 199.*

In pratis, pomariis frequens. Junio.

FESTUCA. L. G. 95.

*Spicul. oblongae, teretiusculae. Cal. 2-valvis, acuminatus. Cor. oblonga: valvula mucronatis: altera saepe aristata ex apice.*

\* *Panicula secunda.*

646. FESTUCA panicula secunda coarctata aristata, culmo tetragano nudiusculo, foliis setaceis. *Linn. Syst. 1. p. 202.*

In

In collibus apricis aridis: *bey Witzerhoff an den Tannen.* Junio.

- rubra* 647. *FESTUCA* panicula secunda scabra spiculis sexfloris aristatis: flosculo ultimo mutico, culmo semitereti. *Linn. Syst.* 1. p. 203.

Ad oppidum *Malchin auf dem neuen Rücken.*

**\*\* Panicula aequali.**

- elavior* 648. *FESTUCA* panicula secunda erecta, spiculis subaristatis: exterioribus teretibus. *Linn. Syst.* 1. p. 207.

In pratis copiose: *bey Malchin auf den Wiesen an der Peene.* Junio.

- fluitans* 649. *FESTUCA* panicula ramosa erecta, spiculis subsessilibus teretibus muticis. *Linn. Syst.* 1. p. 207.

In paludosis, fossis frequens Aestate.

**BROMUS. L. G. 92.**

*Cal.* 2-valvis. *Spicul.* oblonga, altera valvula infra apicem aristata.

- secalinus* 650. *BROMUS* panicula patente, spiculis ovatis: aristis rectis, feminibus distinctis. *Linn. Syst.* 1. p. 208.

In agris secalinis frequens.

- mollis* 651. *BROMUS* panicula erectiuscula, spiculis ovatis pubescentibus: aristis rectis, foliis mollissime villosis. *Linn. Syst.* 1. p. 209.

In

In arenosis ficcioribus, ad vias, copiose ad op-  
pidum *Eage*. Junio.

652. *BROMUS* panicula patula, spiculis oblon-sterilis  
gis distichis, glumis subulato-aristatis.  
*Linn. Syst.* 1. p. 212.

In agris, hortis, ruderatis: *bey Malchin an  
der Stadtmauer*. Majo. Junio.

653. *BROMUS* panicula nutante, spiculis ova-arvensis  
to-oblongis. *Linn. Syst.* 1. p. 212.

In versuris, agris: *bey Malchin vor dem Müh-  
lenthor* frequens. Junio.

654. *BROMUS* panicula nutante, spiculis linea-rectorum  
ribus. *Linn. Syst.* 1. p. 213.

In collibus siccis, muris: *bey Malchin an den  
Gürtenzäunen am Schrat-Wege*. Aestate.

655. *BROMUS* panicula nutante, spiculis qua-giganteus  
drifloris: aristis brevioribus. *Linn. Syst.*

1. p. 214.

In umbrosis humidis, ad pagum *Piside vor-  
ne am Gehölze*. Julio. Augusto.

656. *BROMUS* culmo indiviso, spiculis alternis pinnatus  
subsessilibus subaristatis. *Linn. Syst.* 1. p.  
216.

In montosis asperis: ad pagum *bey Goschen-  
dorff auf den Bergen; auch bey Malchin  
auf dem Stadtwall*. Junio. Julio.

AVENA. L. G. 97.

*Cal.* 2. valvis. *Spicul.* diffusae. *Cor.* ob-  
longa: altera valvula dorso vel basi arista-  
ta; arista tortili in medio geniculata.

657.

- clasiior* 657. AVENA paniculata, calycibus bifloris, flosculo hermaphrodito submutico, mascululo aristato. *Linn. Syst.* 1. p. 221.  
In pomariis, pratis: *bey Malchin vor dem Hayenholze.* Aestate,
- farua* 658. AVENA paniculata, calycibus trifloris, flosculis omnibus aristatis, receptaculis barbatis. *Linn. Syst.* 1. p. 223.  
In agris inter segetes copiose. Aestate.
- strigosa* 659. AVENA panicula oblonga contracta secunda, flosculis geminis apice biaristatis dorso arista geniculata. *Schreber Spicileg.* p. 52.  
In agris arenaceis *bey Malchin* etiam in hortis, rarius.

## ARUNDO. L. G. 99.

*Cal.* 2-valvis. *Floscul.* congesti. *Cor.* basi lanata, mutica (non aristata.)

- Phragmites* 660. ARUNDO calycibus quinquefloris panicula laxa. *Linn. Syst.* 1. p. 227.  
In fossis, lacubus: *bey Malchin an der Peene im Rohrbruch* copiosissime. Augusto.
- epigejos* 661. ARUNDO calycibus unifloris, panicula erecta, foliis subtus glabris. *Linn. Syst.* 1. p. 228.  
*Am Gehölze auf den Gofchendorffer Bergen.* Julio. Augusto.

662.

662. ARUNDO corollis lanuginosis, calycibus *Calama-*  
unifloris laevibus, culmo ramoso. *Linn. grostis*  
*Syst.* 1. p. 228.

In pratis aquosis: *bey Malchin auf den Wie-*  
*sen hinter den Peengärten.* Julio.

663. ARUNDO calycibus unifloris foliis involu- *areuaria*  
tis mucronato-pungentibus. *Linn. Syst.*  
1. p. 228.

Ad littora maris baltici.

LOLIUM. L. G. 101.

*Cal.* 1 - vulvis, fixus, rachi oppositus.

664. LOLIUM spica mutica, spiculis compres- *perenne*  
sis multifloris. *Linn. Syst.* 1. p. 230.

In pascuis, pomariis, ad semitas, versuras ubi-  
que. Aestate.

665. LOLIUM spica aristata, spiculis compressis *remulen-*  
multifloris. *Linn. Syst.* 1. p. 231. *tum*

Inter segetes, praesertim Avenam. Aestate.

ELYMUS. L. G. 102.

*Cal.* 2 - valvis, adgregatus multiflorus. *Spi-*  
*cul.* geminae.

666. ELYMUS spica erecta, arcta, calycibus *arenarius*  
tomentosis flosculo longioribus. *Linn.*  
*Syst.* 1. p. 231.

Habitat ad litora arenosa maris baltici, *bey*  
*Warnemünde nach der linken Seite.*

HOR.



## HORDEUM. L. G. 104.

*Involucr.* 6-phyllum. 3-florum.

*murinum* 667. HORDEUM flosculis lateralibus masculis  
aristatis, involucris intermediis ciliatis.

*Linn. Syst.* 1. p. 237. α.

In ruderatis: praesertim *bey Rostoch an den  
Mauren nach dem Strande zu.*

## TRITICUM. L. G. 105.

*Cal.* 2-valvis, solitarius, subtriflorus. *Spicu-  
cul.* solitariae. *Cor.* 2-valvis: valvulis  
subaequalibus. *Receptaculi* basis callosa.

*repens* 668. TRITICUM calycibus quadrifloris subula-  
tis acuminatis, foliis planis. *Linn. Syst.*  
1. p. 241.

In cultis et agris frequens. Junio. Julio.

*Officin:* Graminis Radix.

## B. POLYGAMIA.

## HOLCUS. L. G. 1252.

*Cal.* communis gluma bivalvis, biflora.

♀ *Cor.* bivalvis, matica. *Stam.* 3. *Styl.* 2.  
*Sem.* 1.

♂ *Cor.* bivalvis: altera valvula infra apicem  
arista rigida. *Stam.* 3.

*mollis* 669. HOLCUS glumis bifloris nudiusculis: flos-  
culo hermaphrodito mutico, maleulo  
arista geniculata. *Linn. Syst.* 4. p. 308.

In nemoribus aridis: *am Holze auf den Ber-  
gen bey Goschendorff.* Julio.

670. *HOLCUS* glumis bifloris villosis: *apsculo lanatus*  
hermaphrodito mutico; masculo arista re-  
curva. *Linn. Syst.* 4. p. 308.

In pomariis, pratis: *bey Malchin auf den*  
*Wiesen hinter den Peengärten et alibi co-*  
*piose.* Junio. Julio.

## C. MONOECIA.

CAREX. L. G. 1137.

♂ *Amentum* spicatum glumis.

♀ *Ament.* Cal. Cor. ut in mare. *Nest.* in-  
flatum bidentatum. *Stigm.* 3. rarius 2.  
*Sem.* r. triquetrum (rarius teres) intra ne-  
ctarium.

\* *Spica unica simplici.*

671. CAREX spica simplici dioica. *Linn. dioica*  
*Syst.* 4. p. 98.

In humidis turfosis: *bey Malchin auf der*  
*Wiese am Lalaerberge copiose et alibi fre-*  
*quens.* Aprili. Majo.

\*\* *Spicis androgynis.*

672. CAREX spica simplici androgyna: super-  
ne mascula, capsulis divaricatis retrofle-  
xis *Linn. Syst.* 4. p. 99. *pulicaris*

In pratis humidis, sylvaticis: *auf der base-*  
*dowschen Wiese an der Peene.* Majo.  
Junio.

N

\*\* Spi-

*praecox*

673. CAREX spica composita disticha nudiuscula, spiculis contiguis androgynis teretibus rectis, culmo superne nudo. *Schreber Spicileg.* 63.

In graminosis ficcioribus: *bey Witzerhoff rechts am Wege, am Rande der letzten jungen Tannen.* April. Majo.

*arenaria*

674. CAREX spica composita, spiculis androgynis; inferioribus remotioribus foliolo longiori instructis, culmo triquetro. *Linn. Syst.* 4. p. 100.

Ad littora maris: *bey Warnemünde passim.* Junio.

*leporina*

675. CAREX spica composita, spiculis ovatis sessilibus adproximatis alternis androgynis nudis. *Linn. Syst.* 4. p. 101.

In pratis humidis sylvaticis: *im kahldischen Holze, an dem Wege der um den Berg führet.* Majo.

*vulpina*

676. CAREX spica supradecomposita, inferne laxiore, spiculis androgynis ovatis glomeratis, superne masculis. *Linn. Syst.* 4. p. 102.

In paludosis: *bey Malchin auf der Wiese am Jägerhause et alibi passim.* Majo. Junio.

*muticata*

677. CAREX spiculis subovatis sessilibus remotis androgynis, capsulis acutis divergentibus spinosis. *Linn. Syst.* 4. p. 102.

In

In nemorosis humidis ad verfuras: *auf dem Wall bey Malchin* et alibi frequens. Majo. Junio.

678. CAREX spicis ovatis subsessilibus remotis androgynis, bracteis culmum aequantibus. *Linn. Syst. 4. p. 103.* *remota*

In humidis nemorosis: *bey Pifide im Holze auf den feuchten Plätzen.* Majo. Junio.

679. CAREX spiculis oblongis sessilibus remotis androgynis, capsulis ovatis. *Linn. Syst. 4. p. 104.* *elongata*

In humidis sylvaticis: *bey Malchin in dem Moor am Ackerkamp.* Majo. Junio.

680. CAREX racemo composito, spiculis androgynis. *Linn. Syst. 4. p. 105:* *paniculata*

In palustribus: *bey Malchin in der Egelhorn* et alibi frequens. Majo. Junio.

\*\*\* *Spicis sexu distinctis, femineis sessilibus.*

681. CAREX spicis confertis subsessilibus subrotundis: mascula lineari, capsulis acutis recurvis. *Linn. Syst. 4. p. 106.* *flava*

In pratis paludosis, locis humidis: *bey Malchin auf den Wiesen bey dem Jägerhause* et alibi frequens. Majo.

682. CAREX spicis linearibus erectis: mascula brevior inferioreque, bracteis aphyllis, capsulis distantibus. *Linn. Syst. 4. p. 106.* *digitata*

In nemoribus umbrosis arenosis: *bey Malchin im Hayenholze et alibi passim. Aprili.*

*montana* 683. CAREX spicis femineis sessilibus subsolitariis ovatis masculae adproximatis, culmo nudo, capsulis pubescentibus. *Linn. Syst.*

4. p. 107.

In montosis apricis: *bey Malchin am Rande der Tannen et alibi vulgaris. Aprili. Majo.*

\*\*\*\* *Spicis sexu distinctis: femineis pedunculatis.*

*limosa* 684. CAREX spicis ovatis pendulis: mascula longiore erectiore, radice repente. *Linn. Syst. 4. p. 110,*

In cespitosis limosis: *auf dem Moor in der Scheide zwischen Malchin und Leuschentin et alibi non infrequens. Majo.*

*palescens* 685. CAREX spicis pendulis, mascula erecta; femineis ovatis imbricatis, capsulis confertis obtusis. *Linn. Syst. 4. p. 110.*

In subhumidis sylvaticis: *bey Pische im Holze. Majo.*

*panicea* 686. CAREX spicis pedunculatis erectis remotis: femineis linearibus, capsulis obtusiusculis geminatis inflatis. *Linn. Syst. 4. p. 111.*

In uliginosis turfosis: *bey Malchin an den Hauswiesen vor dem Steinthor. Majo.*

687.

687. CAREX spicis pendulis, pedunculis ge- *Pseudocy-*  
minatis. *Linn. Syst. 4. p. 112.* *perus*

In stagnis: im kahlischen Holze an dieser Seite  
der Ziegley. Majo.

688. CAREX spicis erectis cylindricis ternis *Cespitosa*  
subsessilibus, mascula terminali, culmo  
triquetro. *Linn. Syst. 4, p. 112.*

In pratis paludosis: bey Malchin copiose et  
alibi passim. Majo.

689. CAREX spicis remotissimis subsessilibus, *distans*  
bractea vaginalli, capsulis angulatis mu-  
cronatis. *Linn. Syst. 4. p. 112.*

In pratis subhumidis: bey Malchin auf dem  
Cämmerey Kamp; auch längst den Canälen  
in Remplin. Majo.

\*\*\*\*\* Spicis sexu distinctis masculis pluribus.

590. CAREX spicis masculis pluribus, femi- *acuta*  
neis subsessilibus, capsulis obtusiusculis.  
*Linn. Syst. 4. p. 113.*

In pratis humidis ubique. Majo.

691. CAREX spicis masculis pluribus; femi- *vesicaria*  
neis pedunculatis capsulis inflatis acumi-  
natis. *Linn. Syst. 4. p. 114.*

In paludosis, ad fluvios: an der Peene copiose.  
et alibi frequens. Majo.

692. CAREX spicis sexu distinctis: mascula *Drymeia*  
unica, femineis pedunculatis remotis,  
apice bifidis. *Linn. Suppl. 414.*

*C. vesicaria. β. Linn. Syst. 4. p. 114.*

*C. sylvatica*, spicis pedunculatis, mascula erecta femineis filiformibus laxis pedunculo brevioribus, capsulis ovatis aristatis furcatis. Hudson. anglic. edit. 2. tom. 2. p. 411.

*C. patula*, Pollich palat. 896.

In nemorosis udis: bey Malchin am Scheidegraben vor dem Mühlenthor; auch bey Pifide am Mühlenbruch frequens. Majo.

*flacca* 693. CAREX spicis masculis pluribus erectis, femineis pendulis, capsulis ovatis obtusis bractea brevioribus. Schreber Spicileg. no. 669.

In pratis uliginosis ad fossas: bey Malchin auf den Wiesen bey dem Jägerhause; auch im Remplinschen Garten an den Canälen passim. Majo.

*hirta* 694. CAREX spicis remotis: masculis pluribus, femineis subpedunculatis erectis, capsulis hirtis. Linn. Syst. 4. p. 115.

In arenosis humidiusculis vulgaris: bey Malchin auf dem Gerichtsbrunn copiose. Majo.

## CRYPTOGAMIA

## CLASS. LINNAEI XXIV.

## I.

## FILICES.

*a. Fructificationes spicatae.*

EQUISETUM. L. G. 1284.

*Spica ovato-oblonga, multivulvis: fructificationes peltatae, basi dehiscentes.*695. EQUISETUM caule spicato, frondibus *sylvaticum* compositis. *Linn. Syst. 4. p. 372.*In nemoribus: *Im Hayenholze* passim. Aprili. Majo.696. EQUISETUM scapo fructificante nudo: *arvense* sterili frondoso. *Linn. Syst. 4. p. 372.*

In agris, arvis vulgare. Martio. Aprili.

*Officin: EQUISETI Herba.*697. EQUISETUM caule angulato frondibus *palustre* simplicibus. *Linn. Syst. 4. p. 373.*

In pratis aquosis copiose. Majo. Junio.

698. EQUISETUM caule subnudo laevi. *Linn. limesum Syst. 4. p. 373.*In pratis paludosis, locis inundatis: *bey Malchin an der Peene; auch am Bornberge.* Majo.699. EQUISETUM caule nudo scabro basi sub-*hyemale* ramofo. *Linn. Syst. 4. p. 374.*

N 4

In



In sylvaticis vliginosis: im Hayenholze hinter dem Spörken Keller et alibi passim. Majo.  
*Officin:* Equiseti maioris Herba.

OPHIOGLOSSUM. L. G. 1288.

*Spica articulata, disticha, Fructificationes circumscissae.*

*vulgatum* 700. OPHIOGLOSSUM fronde ovata. *Linn. Syst.* 4. p. 377.

In ducatu megopolitano semel lectum, auf der remplinischen Wiese nahe am Flus. Junio.

*Officin:* Ophioglossi Herba.

OSMUNDA. L. G. 1289.

*Spica racemosa. Fructificationes globosae, bivalves.*

\* *Scapo insidente cauli ad basin frondis.*

*Lunaria* 701. OSMUNDA scapo caulino solitario, fronde pinnata solitaria. *Linn. Syst.* 4. p. 379.

α. Osmunda spicis lateralibus, fronde solitaria, pinnata: pinnis lunulatis.

β. Osmunda spicis lateralibus, frondibus geminatis bipinnatis: pinnis incis.

Habitat α in siccis arenosis: auf dem Lalaerberge bey Malchin rarius.

β. In nemorosis humidis im Hayenholze am gilowischen Wege bey den Sandgruben passim. Majo. Junio.

*Officin:*

*Officin: Lunariae Herba.*

**\*\* Fronde ipsa fructificationes ferente.**

702. OSMUNDA frondibus bipinnatis apice *ra-regalis*  
cemiferis. *Linn. Syst. 4. p. 381.*

*In sylvaticis paludosis: im kahldischen Holze  
an dem Moor hinter der Ziegeley passim.  
Junio, Julio.*

LYCOPODIUM. L. G. 1302.

*Spica oblonga: squamis imbricatis. Fructi-  
ficat. bivalves elastice dissilientes.*

703. LYCOPODIUM foliis sparsis filamentosis, *clavatum*  
spicis teretibus, pedunculatis geminis.  
*Linn. Syst. 4. p. 441.*

*In sylvaticis et nemoribus, im Hayenholze  
bey Malchin et alibi passim. Julio.*

*Officin: Musci clavati Herba, Lycopodii, Se-  
men.*

704. LYCOPODIUM foliis sparsis, quinquefa- *annorum*  
riis, subserratis, furculis annotinis articu-  
latis, spicis terminalibus glabris erectis.  
*Linn. Syst. 4. p. 443.*

*In der basedowschen Tannenheide passim. Au-  
gusto. Septembri.*

705. LYCOPODIUM foliis bifariis conatis: su- *Complana-*  
perficialibus solitariis, spicis geminis pe- *rum*  
dunculatis. *Linn. Syst. 4. p. 445.*

*Iisdem locis: bey dem Therosen rarius. Julio.  
Augusto.*

*Selago*

706. LYCOPODIUM foliis sparsis ochrifariis, caule dichotomo erecto fastigiato, floribus sparsis. *Linn. Syst. 4. p. 443.*

In nemorosis humidis, ad radices alnorum: *bey Malchin im Ellerbruch am Kätelberge* passim. Augusto et Septembri cum thecis maturis.

*b. Fructificationes frondosae pagina inferiore.*

POLYPODIUM. L. G. 1296.

*Fructificationes* distributae in acervulos subrotundos.

\* *Fronde pinnatifida: lobis coadunatis.*

*vulgare*

706. POLYPODIUM frondibus pinnatifidis: pin-  
nis oblongis subserratis obtusis, radice  
squamata. *Linn. Syst. 4. p. 412.*

In sylvis ad vias cavas: *bey Malchin im Hay-  
enholze* et alibi frequens. Aprili.

*Officin:* Polypodii Radix.

\*\* *Fronde subpinnata, cuius pinnae con-  
fluunt basi ut semibipinnata potius, quam  
perfecte duplicato pinnata sit.*

*cristatum*

707. POLYPODIUM frondibus subbipinnatis:  
foliolis ovato-oblongis: pinnis obtusius-  
culis, apice acute serratis. *Linn. Syst. 4.  
p. 420.*

P. fron-

**P.** frondibus subtripinnatis, pinnulis utrinque ferratis. *Muller Fridr.* p. 193. no. 845. t. 2. f. 4.

In nemoribus humidis: *im kahldeischen Holze an dem kleinen See.* Julio. Augusto.

708. **POLYPODIUM** frondibus subbipinnatis: pinnulis lanceolatis obtusiusculis, apice crenulatis. *Schreb. Spicileg.* p. 70. *molle*

In nemoribus: *bey Pifide im Holze* sparsim. Augusto.

709. **POLYPODIUM** frondibus bipinnatis: pinnis obtusis crenulatis, stipite paleaceo. *Filix mas* *Linn. Syst.* 4. p. 421.

In sylvaticis et nemoribus ubique. Julio. Augusto.

*Officin:* Filicis Radix, Herba.

710. **POLYPODIUM** frondibus bipinnatis: pinnis lanceolatis pinnatifidis ovatis. *Filix femina* *Linn. na* *Syst.* 4. p. 421.

Isdem locis, rarius: *Im Hayenholze am Ackerkamp; auch am Mönchbruch.* Julio. Augusto.

711. **POLYPODIUM** fronde subbipinnata: foliolis ovato-oblongis, profunde pinnatifidis: laciniis ovatis, duplicato-ferratis: ferraturis mucronatis. *Ehrhart. Hannov. Magazin* 1784. Stück 9. *callipteris*

Plantae cryptogamicæ eiusdem Decas. 6. No. 53.

Ele-

Elegantem hanc Filicem legi *im kahl'dischen Holze auf dem Moor an der alten Schlossstelle.* Julio. Augusto.

An Polypod: regium Linn?

*Thelypteris* 712. POLYPODIUM fronde bipinnata: pinnis pinnatifidis integerrimis subtus undique polline tectis. *Linn. Syst. 4. p. 421.*

In pratis aquosis vbique. Julio. Augusto.

*fragile* 713. POLYPODIUM frondibus bipinnatis, foliolis remotis: pinnis subrotundis incis. *Linn. Syst. 4. p. 423.*

In muris, *an der Kirthhofftmauer in Jörgensdorff.* Julio. Augusto.

\*\*\* *Fronde supra decomposita.*

*Dryopteris* 714. POLYPODIUM frondibus supra decompositis: foliolis ternis bipinnatis. *Linn. Syst. 4. p. 427.*

In nemoribus: *bey Piside im Holze an den hohlen Wegen passim.* Julio. Augusto.

ASPLENIUM. L. G. 1295.

*Fructificationes* in lineas rectas, subparallelas distributae.

*Trichomanoides* 715. ASPLENIUM frondibus pinnatis: pinnis subrotundis crenatis. *Linn. Syst. 4. p. 404.*

In

In fissuris murorum et sylvis *an der Kirchhofsmauer zu Dempzin; auch im Hayenholz bey Malchin im ersten hohlen Wege.*  
Junio.

*Officin:* Adianti rubri f. Trichomanis Herba.

PTERIS. L. G. 1291.

*Fructificat.* in linea marginali.

716. PTERIS frondibus supra decompositis: *aquilina*  
foliolis pinnatis: pinnis lanceolatis: infimis  
pinnatifidis: terminalibus longissimis.  
*Linn. Syst. 4. p. 396.*

In sylvaticis: *im Hayenholze bey Malchin hinter dem Ackerkamp et alibi frequens.* Julio. Augusto.

## II.

## M U S C I.

## A. F R O N D O S I.

## PHASCUM HEDW. G. M. I.

*Capf.* operculata; operculo nunquam abscedente.

*subulatum* 716. PHASCUM caulescens foliis lanceolato-linearibus patulis. *Schr. Phasc.* p. 8. n. i.

Ad scrobes, vias cavas nemorosas, arenosas: *am Schneider Kamp; uuf dem Graben am Wege nach Jessin.* Martio.

*nividum* 717. PHASCUM humile foliis subulato-carinatis, subfasciatis. *Hedw. Musc. frond. I.* p. 91. t. 34.

In loco humido umbroso legi. In horto meo: *an der linken Seite des Gartenhauses, cum Gymnost. pyriformi et Ph. cuspidato.* Majo cum Calyptra.

*piliferum* 718. PHASCUM caulescens, foliis oblongis apice piliferis erectis. *Schreb. Phasc.* p. 8. n. 2. t. 1. f. 6. 7.

*Bey Malchin vor dem Mühlenthor in der Lehmgrube bey den letzten Gärten in der Breitengasse,* Majo calyptra secedente.

*cuspidatum* 719. PHASCUM caulescens, foliis ovatis, cuspidatis, patulis: terminalibus erectis coniventibus. *Schr. Phasc.* p. 1. n. 3. t. 1. f. 1. 2. (*acaulon.*) *Linn. Syst.* 4. p. 450.

- In agris nostris, ad fossas ubique. Martio  
 719. PHASCUM foliis ovatis, muticis, concavis, conniventibus. *Schr. Phasc. p. 8.*  
 n. 4. t. 1. f. 11. 12. (*Linn. var. praeced.*)

Cum praecedente; sed rarius.

620. PHASCUM acaule, foliis ovato lanceolatis, planis, ferratis, erectis. *Schr. Phasc. p. 9. n. 5. t. 2. f. 1. 2.*

In agris ad fossas: *bey Scharpxow auf dem Acker an der Scheide nach Malchin.* Autumno et vere.

SPHAGNUM HEDW. G. M. 2.

*Caps. peristoma nudum.*

*Masc. flos ramos superiores clavae formae terminans.*

721. SPHAGNUM ramis deflexis. *Linn. Syst. palustre, 4. p. 448.*

α. Sph. palustre latifolium. *Weis. crypt. 263.*

β. Sph. palustre capillaceum. *ibid. 265.*

In paludosis turfosis: *auf dem Moor zwischen Malchin und Leuschentin* et alibi copiose. Aestate.

HEDWIGIA HEDW. G. M. 3.

*Caps. peristoma nudum.*

*Masc. flos gemmiformis, alaris, monoicus.*

722. HEDWIGIA truncō ramificato, foliis ovato lanceolatis, concavis, apice diaphanodentriculato; perigomialium ciliato. *Hedw. Musc. frond. I. p. 107. t. 40.*

Supra



Supra lapides copiose. Vere cum capsulis.

GYNNOSTOMUM HEDW. G. M. 4.

*Caps.* peristoma nudum.

*Masc.* flor disciformis, dioicus.

*pyriforme* 723. GYNNOSTOMUM capsulis erectis obovatis, calyptra subulata, furculis exiguis erectis, foliis ovatis nuticis. *Linn. Syst.* 4. p. 474.

In humidis, ad fossas, in pratis ubique. Aprili.

*ovatum* 724. GYNNOSTOMUM foliis ovatis, concavis, piliferis; thecis ovatis. *Hedw. Musc. frond.* I. p. 16. t. 6.

In muris antiquis. Aprili c. caps.

*Helmii* 725. GYNNOSTOMUM trunco erecto foliisque spatulato acuminatis, ad apicem denticulatis; thecis oblongis erectis. *Hedw. Musc. frond.* I. p. 80. t. 30.

Ad latera fossarum: *bey Malchin am Graben vor der Brücke bey dem Gerichtsbruch.* Mayo cum thecis.

*truncatum* 726. GYNNOSTOMUM foliis explanatis apiculatis, thecis truncatis. *Hedw. Musc. frond.* I. p. 13. t. 5.

*Brium truncatulum.* *Linn. Syst.* 4. p. 481.

In campis humidis ad agros, fossas et sepes ubique, hyeme et primo vere cum thecis.

TETRA.

## TETRAPHIS HEDW. G. M. 5.

*Capf. Perist.* simplici ordine, *dentibus* quatuor integris, pyramidalibus.

*Masc. flor* capituliformis dimorphus.

727. TETRAHIS trunco simplici erecto, fo-*pellucida* liis ovato - acuminatis, nitidis, *pellu-*centibus.

Mnium *pellucidum*. Linn. *Syst.* 4. p. 457.

*Im kahldischen Holze in den hohlen Wegen und an den Bergen; passim. Martio.*

## SPLACHNUM HEDW. Musc. frond. II. p. 35.

*Peristoma* simplex, octo dentatum, *denti-*bus geminatis: thecae apophysis obconica umbraculiformisque.

*Flores* hermaphroditi dimorphi: *disciformi-*um genitalia feminea infoecunda, *elonga-*torum fertilia.

728. SPLACHNUM trunco erecto simplici divi-*ampulla-*foque, apophysi inverse ampullaeformi, *ceum* colloque longo virente. Hedw. *Musc.* frond. II. p. 41. t. 14.

Splachnum *ampullaceum* umbraculo ampulla-  
ceo obconico. Linn. *Syst.* 4. p. 454.

In paludibus cespitosiis turfosis: *im kahldi-*  
*schen Holze auf den Mooren um die Ziege-*  
*ley* copiose et alibi, sed rarius. Julio. Au-  
gusto.

GRIMMIA HEDW. G. M. 8.

*Caps. peristoma* ordine simplici. *Dentes* secundum latiusculi reflexiles.

*Masc. flos* gemmiformis in fol. alis; et in summitate capituliformis.

*apocarpa* 729. GRIMMIA foliis ovato acuminatis, carinatis, perigonialium apice albo, theca oblonga in pedunculo brevissimo. *Hedw. Musc. frond.* I. p. 104. t. 39.

*Bryum apocarpum.* *Linn. Syst.* 4. p. 471 α. Supra lapides copiose; vere cum capsulis.

LEERSIA HEDW. G. M. 7.

*Caps. Perist.* ordine simplici *dentibus* 16. angustis erectilibus.

*Masc. flos.* gemmiformis in foliorum alis.

*vulgaris* 730. LEERSIA calyptra laxa conica aequali, vaginulae membranula pileiformi. *Hedw. Musc. frond.* I. p. 46. t. 18.

*Bryum extincorium.* *Linn. Syst.* 4. p. 474. α.

In arenosis: *bey Christinenhoff, auch am Berge hinter dem Pfort bey Malchin* et alibi passim. Aprili cum capsulis.

*lanceolata* 731. LEERSIA truncō erecto simplici divisoque; foliis lanceolato-concavis apiculatis; thecis ovatis, vaginae ore teresa. *Hedw. Musc. frond.* II. t. 23.

Ad aggeres, supra lapides: *auf dem Wall bey Malchin, auch auf den Kirchhofsmauern vor den Thoren.* Vere cum thecis.

ORTHO-

ORTHOTRICHUM HEDW. Musc. frond. Vol. II.

*Capf. Peristoma* sedecimdentatum; *dentibus* reflexilibus, interpositis processulis fimbriatis, conniventibus *Calyp.* fursum pilosa.

*Flos. Masc.* gemmiformis capituliformisque.

732. ORTHOTRICHUM foliis linearibus, *con- crispum*  
fertis, tortilibus theca ovata. *Hedw. Musc.*  
*frond.* II.

*Polytrichum Dill. Hist. Musc.* p. 433. t. 55.  
f. 11.

*Bryum striatum Linn. Syst.* 8.

In truncis arborum. Febuario. Martio.  
cum capsulis.

733. ORTHOTRICHUM foliis lanceolatis carina- *striatum*  
tis margine revoluta patulis; theca ob-  
longa striata. *Hedw. Musc. frond.* II.

*Polytrichum Dill. Hist. Musc.* p. 430. t. 55.  
f. 8.

*Bryum striatum. Linn. Syst.* α.

Ad truncos arborum. Junio cum capsulis  
inaturis.

734. ORTHOTRICHUM foliis lanceolato - carina- *anomalum*  
tis, patulis; margine revoluta; theca ob-  
longa striata; peristomate processulis de-  
stituta. *Hedw. Musc. frond.* II.

*Polytrichum Dill. Hist. Musc.* p. 431. t. 55.  
f. 9.

*Bryum striatum. Linn.* β.

Praesertim ad saxa: ad arborum truncos rarius. Martio, Aprili cum capsulis maturis.

WEISIA HEDW. G. M. 9.

*Caps.* *Peristoma* simplex; dentibus 16. integris.

*Masc.* *flos* capituliformis dioicus.

*recurvi-  
rostra*

735. WEISIA foliis lanceolatis imbricato-patulis; theca gracili; operculi rostellum recurvato. *Hedw. Musc. frond.* I. p. 19. t. 7.

In sylvaticis arenosis; in pratis paludosis: *im kahlischen Holze* passim, *auch auf der Weide beym Lalaerberge bey Malchin.* Autumno cum thecis.

*crispa*

736. WEISIA foliis linearibus carinatis, imbricato patulis, ficitate crispis; theca oblongo-ovata.

*Bryum Dill. Hist. Musc.* 380. t. 48. f. 43.

*Bryum virens* capsulis erectis oblongis, foliis subulatis strictis: *Dickf. Pl. crypt. fasc. I.*

In agris et aggeribus in sylvaticis: *im kahlischen Holze, am Berge bey dem Mühlenbruch* et alibi frequens. Februario. Martio. cum capsulis.

POLYTRICHUM HEDW. G. M. 10.

*Caps.* *Peristoma* simplex, dentes 64. integri, apicibus membrana adglutinata.

*Masc.* *flos* disciformis.

738. POLYTRICHUM caule simplici (folia serrata.) *commune* Linn. Syst. 4. p. 455. Dill. Hist. Musc. 420. t. 34. f. 1.

β. P. commune. Linn. Syst. 4. p. 456. Polytrichum quadrangulare Juniperi foliis brevioribus et rigidioribus. Dill. Hist. Musc. 454. t. 54. f. 2.

Huius folia non serrata, igitur forsan et haec specie distincta.

α. In sylvaticis et nemorosis. *Officinis* Adiantum aurei herba audit. β. in arenosis et pratis uliginosis: *bey Malchin neben den jungen Tannen auf dem Moor bey der Gützer Ziegeley.* Junio cum capsulis maturis.

739. POLYTRICHUM capsula parallelepipedā, piliferum foliis integerrimis piliferis, caule simplici. Schreb. Spicil. p. 74.

Polytrichum quadrangulare minus, juniperi foliis pilosis. Dill. Hist. Musc. 426. t. 54. f. 3. *specie omnino distincta.*

*Bey den Sandgruben im Hayenholze am Wege nach Gilow et alibi copiose. Autumno et Vere.*

740. POLYTRICHUM furculo ramosissimo, *urnigerum* setis (ex innovatione) lateralibus, capitulo erecto, acuminato. Linn. Syst. 4. p. 457.

In sylvaticis montosis: *im kahldischen Holze bey den Töpfergruben*, rarius; Autumno in Ver usque.

*nanum* 771. *POLYTRICHUM* foliis obscure ferratis, theca subrotunda nutante. *Hedw. Musc. frond. l. p. 35. t. 13.*

*Polytrichum nanum* capsulis subrotundis galleritis, aloes folio non serrato. *Dill. Hist. Musc. 428. t. 55. f. 6.*

*Mnium polytrichoides.* *Linn. Syst. 4. p. 464.*

In umbrosis argillofis: *im Hayenholze bey Malchin* et alibi passim autumno et Vere.

*aloides* 772. *POLYTRICHUM* foliis versus apicem evidenter ferrulatis, theca cylindrica obliquata. *Hedw. Musc. frond. p. 37. t. 14.*

*Polytrichum aloes* folio serrato, capsulis oblongis. *Dill. Hist. Musc. 429. t. 55. f. 7.*

*Mnium polytrichoides*  $\beta$ . *Linn.*

Locis praecedenti similibus.

*undulatum* 773. *POLYTRICHUM* foliis lanceolatis, serratis undulatis, patentibus; calyptra ad apicem paraphysiphora, theca cylindrica, cernua. *Hedw. Musc. frond. l. p. 43. t. 16.*  
var.  $\beta$ . *P. undulatum* minus *ibid. t. 17.*

*Bryum undulatum.* *Linn. Syst. 4. p. 477.*

$\alpha$ . In sylvaticis ubique.  $\beta$ . in agris apricis: *auf der Koppel bey Scharpzw am Scheidegraben* primo vere cum thecis.

TRI-

TRICHOSTOMUM HEDW. G. M. II.

*Capf. Peristoma simplex: Dentes 16. bifidi, longi erecti.*

*Masc. flor gemmiformis in alis foliorum.*

774. TRICHOSTOMUM procumbens, ramis lateralibus thecigeris.

Bryum hypnoides a. Linn Syst. 4. p. 47. Bryum hypnoides polycephalon lanuginosum montanum. Dill. Hist. Musc. 372. t. 47. f. 32.

In fylvis arenosis, supra lapides: vorne in den Tannen bey Witzerhof auf einem Stein, infrequens. Primo vere cum capsulis.

775. TRICHOSTOMUM caulibus subrectis, ramis sparsis longioribus, foliis pilosis, fetis longioribus erectis *Weis Musc. frond. 213. (sub Hypno.)*

Bryum hypnoides hirsute canescens vulgare Dill. Hist. Musc. 368. t. 47. f. 27.

In ericetis: bey Witzerhof vor dem Sandberge bey der Wiese. Primo vere thecas maturat.

776. TRICHOSTOMUM foliis lanceolatis, in apicem canum denticulatum productis; thecis oblongis. Hedw. Musc. frond. II. t. 25.

In fylvis supra lapides: bey Witzerhof am Wege in den Tannen, auf Steinen. Aestate cum capsulis.



## DITRICHUM.

*Capf. Peristoma simplex: Dentes 33. filiformes per paria approximati, basi non cohaerente.*

*Masc. flos gemmiformis in aliis foliorum.*

*pusillum* 777. DITRICHUM foliis ex ovato-concava basi subulatis, thecis erectis oblongis. *Hedw. Musc. frond. l. p. 74. t. 28. (Trichostomum.)*

*In arenosis apricis: im Hayenholze bey Malchin auf dem Ackerkamp; auch am Berge hinter dem Jägerhause am Wege. Octobri cum thecis.*

FISSIDENS HEDW. G. M. 12.

*Capf. Peristoma simplex: Dent. 16. brevioribus, inflexis, fissis.*

*Masc. flos gemmiformis in aliis foliorum.*

*pulvinata* 778. FISSIDENS thecis subrotundis, pedunculis reflexis, foliis piliferis. *Linn. Syst. 4. p. 480.*

*In tectis, supra muros, lapides et cet. ubique frequens. Vere cum capsulis.*

*bryoides* 779. FISSIDENS trunco simplici, apice thecigero foliis lanceolato pinnatis, ad basin semi-duplicatis.

*Hypnum bryoides. Linn. Syst. 4. p. 483.*

*In umbrosis copiose. Decembri cum capsulis.*

*saxifolia* 780. FISSIDENS trunco simplici de basi thecigero; foliis lanceolato pinnatis.

Hypnum

*Hypnum taxifolium.* Linn. Syst. 4. p. 482.

In sylvaticis humidis: *auf dem Wall bey Malchin, im Holze bey Pifide* et alibi sparsum.

Martio cum thecis.

781. *FISSIDENS* trunco diviso, erectiusculo, *adiantboi-*  
medio thecigero; foliis lanceolato-pin-<sup>des</sup>  
natis.

*Hypnum adianthoides.* Linn. Syst. 4. p.  
484.

782. *FISSIDENS* furculis erectis ramosis incur-*sciuroides*  
vatis. Linn. Syst. 4. p. 501. sub Hypno.

In sylvis ad truncos arborum Octobri in Ver  
usque cum capsulis.

*DICRANUM* HEDW. G. M. 13.

*Caps. Peristoma* simplex. Dent. 16. breves  
fissi, inflexi.

*Masc. flos* capituliformis e distinctae stirpis  
summitate.

783. *DICRANUM* erectum, foliis rigidiusculis *scoparium*  
secundis, thecis oblongis cernuis.

*Bryum scoparium.* Linn. Syst. 4. p. 77. Bry-  
um reclinatum, foliis falcatis scoparum  
effigie Dill. Hist. Musc. 357. t. 46. A. B.  
C. G. H. β. polysetum. Dill. ibid. t. 46.  
f. 16. D. (mera varietas)

In sylvaticis arenosis: *bey Malchin im Hayen-*  
*holze.* Martio cum capsulis.

784. *DICRANUM* erectum, foliis nitidis acute-*spurium*  
lanceolatis concavis, in summitate con-

*subulata* 792. TORTULA trunco simplici, exiguo foliisque tecto lanceolato concavis; capsulis subulatis.

Bryum *subulatum*. Linn. *Syst.* 4. p. 475.

In subhumidis sylvaticis: bey *Pifide am Wege vor dem Holze*, Aprili cum capsulis.

BARBULA HEDW. G. M. 15.

*ruralis* 793. BARBULA foliis piliferis recurvatis, thecis cylindricis rectiusculis.

Bryum *rurale*. Linn. *Syst.* 4. p. 475.

In tectis stramineis, muris, ad arborum truncos. Vere cum capsulis.

*muralis* 794. BARBULA cespitosa exigua, foliis piliferis erectis; thecis cylindricis rectiusculis.

Bryum *murale* Linn. *Syst.* 4. p. 476.

In tegulis, muris ubique. Variat fol. pilo destitutis. Martio cum capsulis.

*convoluta* 795. BARBULA foliis communibus lanceolatis, perigonalibus obtusis, in cylindrum convolutis. Hedw. *Musc. frond.* I. p. 86. t. 32.

Mnium *setaceum*. Linn. *Syst.* 4. p. 461.

In arenosis limosis: bey *Malchin*, bey den *Kalkofen*: in den *Tannen am Wege nach Neuenbafedow*. Vere.

*unguiculata* 797. BARBULA foliis lineari lanceolatis, carinatis, surrectis; perigonalibus masculi-  
-s floris cum fasciculo, theca obliqua. Hedw.

*Musc. frond.* I. p. 59. t. 23.

Bryum *unguiculatum*. Linn. *Syst.* 4. p. 479.

In

In pratis, ad aggeres, in sylvaticis: *im Hayenholze bey Malchin an den Sandgruben et alibi.* Primo vere cum thecis.

NECKERIA HEDW. G. M. 16.

*Capf. Peristoma duplex: externum dentatum; Dent. 16. ciliisque interni basi liberis.*

*Masc. flos gemmiformis dioicus.*

798. NECKERIA furculis ramosis, frondibus *crispa* subpinnatis, foliolis undulatis planis.

*Linn. Syst. 4. p. 487.*

Ad arborum truncos: *im kahldischen Holze am Wege nach Hayensraum*, rarius. Florentem non legi.

799. NECKERIA furculis repentibus, ramis *viriculosa* vagis teretibus, foliis patulis acuminatis.

*Linn. Syst. 4. p. 494.*

In sylvis ad truncos arborum: *im kahldischen Holze et alibi copiose.* Aprili cum capulis.

800. NECKERIA furculo erecto, ramis fasciculatis terminalibus simpliciusculis, thecis erectis. *dendroides* *Linn. Syst. 4. p. 496.*

In pratis sylvaticis, in pascuis ubique frequens. Octobri in Ver usque cum thecis.

801. NECKERIA furculis vagis teretibus, foliis *curtipen-* ovatis acutis patulis, thecis pendulis. *dula* *Linn. Syst. 4. p. 497.*

In tectis stramineis, in sylvis ad arborum truncos frequens. Aprili cum thecis.

*sericea* 802. NECKERIA furculo repente, ramis confertis erectis, foliis subulatis thecis erectis. *Linn. Syst.* 4. p. 499.

Ad truncos arborum ubique. Martio.

LESKEA HEDW. G. M. 17.

*Caps. Peristoma* duplex: *externum* dentibus 16. acutis, *internum* totidem ciliis e membrana uniformibus.

*Mast. fls* geminiformis dioicus.

*densiculata* 803. LESKEA fronde pinnata simplici, pinnis duplicatis: basi pedunculifera. *Linn. Syst.* 4.

In umbrosis: *im Hayenholze bey Malchin in dem hohlen Wege nach Jessin.* Martio cum thecis.

*complanata* 804. LESKEA fronde ramosa; foliolis distichis imbricatis acinaciformibus acuminatis. *Schr. Spicil.* p. 87. *Hypnum complanatum.* *Linn. Syst.* 4. p. 484.

Ad truncos arborum ubique, in sylvis primo vere thecas maturat.

*trichomanoides* 805. LESKEA frondo ramosa: foliis distichis imbricatis acinaciformibus obtusis. *Schr. Spicil.* p. 88.

Ad truncos arborum: *auf dem Wall bey Malchin; auch im kahldischen Holze.* Vere cum thecis maturis.

*attenuata* 806. LESKEA furculis ramosissimis, ramis incurvatis apice gracilescantibus, foliis secundis

cundis ovatis, carinatis, obtusis; capsulis erectis cuspidatis. *Schreb. Spicil.* p. 100.

*Leskea attenuata. Hedw. Musc. frond.* p. 33. t. 12.

In sylvis supra lapides: *im kahlidischen Holze bey dem kleinen Bach an der remplinischen Scheide auf einem Stein; rarius.*

807. *LESKEA* furculis ramosissimis: ramis re-*polyanib*  
ctis teretibus multifloris, capsulis erectis.  
*Schreb. Spicil.* p. 97.

Ad truncos arborum, inprimis falicum frequens. Hyeme cum thecis.

808. *LESKEA* truncis primordialibus prostratis, *vivipara*  
secundariis erectiusculis, ramosioribus;  
foliis ovato lanceolatis, thecis erectis.

*Hypnum viviparum Neck. gallob.* 475.

*H. myosuroides crassius*, capsulis erectis.  
*Dill. Hist. Musc.* 316. t. 41. f. 50.

In sylvis ad truncos arborum: *im Hayenholze bey Malchin* et alibi frequens, Vere cum thecis.

*HYPNUM HEDW. G. M.* 18.

*Caps. Perist.* duplex: *externum* 16-dentatum, dentibus acutis: *internum* ciliatum; ciliis e membrana difformibus.

*Masc. flos* gemmiformis dioicus.

809. *HYPNUM* ramis vagis recurvis, foliis ova-*triquetrem*  
tis recurvatis patulis. *Linn. Syst.* 4. p. 487.

In

In sylvaticis copiose. Hyeme cum capsulis.

*oreum*

810. HYPNUM furculis reptantibus, ramis vagis erectis, foliis secundis. *Linn. Syst. 4. p. 495.*

In sylvis ad terram locis montosis: *im kahldischen Holze an dem Moor hinter der Ziegeley; auch auf dem Berge im Holze bey Pifide rechts am Mühlenbruch.* Aprili cum capsulis.

- rutabulum* 811. HOPNUM ramis vagis subrepentibus, foliis ovatis mucronatis, imbricatis. *Linn. Syst. 4. p. 488.*

In sylvaticis umbrosis, ad truncos arborum supra terram ubique hyeme cum thecis.

*striatum*

812. HYPNUM ramis vagis recurvis, foliis ovatis lineatis, acutis, undique patentibus; operculis mucronatis. *Schreb. Spicil. p. 91.*

Iisdem locis ad radices arborum: *im Holze bey Pifide* passim. Vere cum thecis.

*fluitans*

813. HYPNUM foliis lanceolatis alternis remotis. *Schreb. Spicil. p. 92.*

In aquis stagnantibus: *bey Malchin in den Pfützen auf dem Gerichtsbring.* Cum thecis non vidi. An varietas sequentis?

*riparium*

814. HYPNUM furculis teretibus ramosis, foliolis acutis patulis distantibus. *Linn. Syst. 4. p. 498.*

In rivulis: *bey Malchin an den Balcken der Mühle; auch in Remplin an der Cascade.* Septembri cum capsulis.

815.

815. HYPNUM furculis vagis apice foliis con-*cuspidatum*  
volutis acuminatis. *Linn. Syst.* 4. p. 499.

In pratis humidis ubique. Majo, Junio cum  
thecis.

816. HYPNUM furculis erectis, foliis ovatis *stellatum*  
longe mucronatis erecto-patulis, colora-  
tis. *Schreb. Spicil.* p. 92. Dickson fasc. I.  
p. 5. t. 1. f. 7.

Hypnum coma lutescente, extremitatibus  
stellatis. *Dill. Hist. Musc.* 302. f. 39.

In pratis humidis turfosis: *bey Malchin auf-*  
*der Weide bey dem Lalaerberge.* Julio.  
cum thecis maturis legi: rarius floret.

817. HYPNUM furculis tenerimis parum ra-*filiforme*  
mosis, foliolis ovato-acuminatis, conca-  
vis, imbricatis; thecis erectis cylindricis.

Locus proprius excidit.

818. HYPNUM furculis ramisque vagis tereti-*illecebrum*  
bus, erectiusculis obtusis. *Linn. Syst.* 4.  
p. 498.

In pratis humidis umbrosis: *an dem Rande*  
*des Moors in der Scheide bey Scharpzw.*  
Florentem non vidi.

819. HYPNUM ramis apice attenuatis, foliis *compres-*  
ovato-lanceolatis, setis elongatis, capsu-<sup>*sum*</sup>  
lis inclinatis, operculo conico *Schreb.*  
*Spicil.* p. 96.

In sylvis: *im Hayenholze bey Malchin* et alibi  
copiose. Hyeme cum capsulis.

P

Non



Non confundendum cum Hypn. *compresso*  
Linnaei.

*purum*

820. HYPNUM furculis pinnato sparsis subulatis, foliis ovatis obtusis conniventibus.  
*Linn. Syst.* 4. p. 497.

In sylvis im *Hayenholze bey Malchin* et alibi  
passim. Martio cum capsulis.

*lutescens*

821. HYPNUM furculis vagis procumbentibus,  
foliis ovatis lanceolatis, subulatis, striatis,  
capsulis obliquis. *Schreb. Spicil.* p. 98.

Ad terram, versuras: auf dem *Wall bey Malchin* et alibi. Vere cum capsulis.

*nitens*

822. HYPNUM furculis erectis, ramulis brevissimis, foliis lanceolatis, oppressis strictis longissimis, capsulis obliquis. *Schreb. Spicil.* p. 92.

In pratis paludosis: bey *Malchin* auf der  
*Wiese hinter dem Jägerhause*; auch bey  
*Basedow* auf der *Wiese am Scheidegraben*.  
Aprili cum thecis legi.

*velutinum*

823. HYPNUM furculo repente, ramis confertis, erectiusculis, subulatis. *Linn. Syst.* 4. p. 500.

Hypnum velutinum capsulis ovatis cernuis.  
*Dill. Hist. Musc.* 326. t. 42. f. 6.

In umbrosis sylvaticis, ad radices arborum:  
im *Hayenholze bey Malchin*, copiose, Hyeme cum thecis.

824. HYPNUM furculis repentibus, ramis fili-<sup>cumpressi-</sup>  
formibus, foliis oblitteratis. *Linn. Syst. 4.*<sup>forme</sup>  
p. 500.

Ad radices, saxa, muros, terram humidam  
frequens. Vere cum capsulis.

*Inflexifolia.*

825. HYPNUM ramis vagis, foliis lanceolatis, *scorpioides*  
complicato - carinatis, quinquefarium re-  
curvatis. *Linn. Syst. 4.* p. 494.

In subhumidis sylvaticis frequens. Vere,  
sed rarius cum capsulis.

826. HYPNUM furculis erectiusculo - subra-<sup>aduncum</sup>  
mosis, foliis secundis recurvis subulatis,  
ramis recurvatis. *Linn. Syst. 4.* p. 493.

In pratis paludosis: *auf der Wiese hinter dem*  
*Jägerhause bey Malchin* et alibi frequens.  
Martio, Aprili cum thecis.

827. HYPNUM ramis vagis procumbentibus re-<sup>squarro-</sup>  
curvis, foliis secundis acuminatis. *Linn.*<sup>sum</sup>  
*Syst. 4.* p. 493.

In pratis paludosis: *bey den Torfgruben bey*  
*Malchin vor dem kahldischen Thore; auch*  
*beym Eisenberge.* Cum thecis non vidi.

828. HYPNUM furculis subpinnatis, foliis se-<sup>mitens</sup>  
cundis recurvis, apice subulatis. *Linn.*  
*Syst. 4.* p. 492.

In sylvis ad truncos arborum, supra terram  
ubique. Hyeme cum capsulis.

*Halleri* 829. HYPNUM ramulis approximatis brevibus foliis planis recurvatis. *Linn. Syst. Ed. XIV.* p. 952.

In pratis paludosis: *bey Bafedow auf der Wiese am Scheidegraben.* Florentem non vidi.

*Surculis pinnatis.*

*filicinum* 830. HYPNUM furculis pinnatis, ramulis distantibus, foliolis imbricatis recurvis, acutis, secundis. *Linn. Syst. 4.* p. 488.

In fossis humidis: *in den Gräben auf der bafedowschen Wiese an der Peene et alibi,* haud infrequens. Martio, Aprili cum thecis.

*proliferum* 831. HYPNUM furculis proliferis plano pinnatis, pedunculis aggregatis. *Linn. Syst. 4.* p. 489.

Hypnum filicinum, tamarisci foliis maioribus splendentibus. *Dill. Hist. Musc.* 274. t. 35. f. 13. *parietinum.* Weis crypt. p. 232.

In nemoribus et sylvis copiose. Vere cum thecis.

*parietinum* 832. HYPNUM furculis plano pinnatis continuatis; pedunculis (minus) aggregatis. *Linn. Syst. 4.* p. 490.

Hypnum filicinum tamarisci foliis minoribus non splendentibus. *Dill. Hist. Musc.* 276. t. 35. f. 14.

In

In nemoribus et fossis exsiccatis umbrosis,  
ad radices arborum et alibi frequens. Ve-  
re cum thecis.

833. HYPNUM furculis proliferis, plano pin-  
natis cuspidatis, pedunculis aggregatis. *delicatu-  
lum*  
*Linn. Syst. 4. p. 489.*

Hypnum filicinum tamarisci foliis minimis  
non splendentibus setis et capsulis ex alis  
brevioribus. *Dill. Hist. Musc. 546. t. 83.  
f. 6.*

In nemoribus et sylvis. Varietas tantum fe-  
re praecedentis esse videtur; sed multo se-  
rius thecas maturat, locisque siccioribus  
laete degit.

834. HYPNUM furculis pinnatis: ramulis ap-  
proximatis, apicibus recurvis. *Crista ca-  
strensis*  
*Linn. Syst. 4. p. 491.*

In sylvaticis siccioribus, ad arborum radices:  
*in den Tannen am Wege nach Schwinckendorf*  
passim, ubi cum thecis vere legi: *in den*  
*Tannen bey Witzerhof* sparsim et nunquam  
floreans.

835. HYPNUM furculis pinnatis, teretiusculis, *abietinum*  
remotis, inaequalibus. *Linn. Syst. 4. p.  
491.*

In pascuis humidis et arenosis sterilibus co-  
piose. Thecas nunquam vidi.

836. HYPNUM furculis subpinnatis decumben-  
tibus; ramulis remotis, foliolis ovatis, *sum*  
capsulis cernuis. *Linn. Syst. 4. p. 490.*

In sylvaticis, umbrosis, ad vias cavas, truncos arborum: *bey Malchin an den Weidern bey dem Wallgraben im Hayenholze et alibi passim.* Hyeme cum thecis.

BRYUM. HEDW. G. M. 19.

*Caps. Peristoma duplex: extern. dentes 16. acuti; intern, e membrana carinata, difformiter ciliatum.*

*Masc. flos capituliformis.*

*androgynum*

837. BRYUM caule ramoso androgynum. *Linn.*

*Syst.* 4. p. 458.

In sylvaticis umbrosis: *im Hayenholze bey Malchin am Berge hinter dem Pfort et alibi passim.* Martio.

*argenteum*

838. BRYUM capsulis pendulis, furculis cylindricis, imbricatis, laevibus. *Linn. Syst.* 4. p. 479.

α. Bryum pendulum iulaceum argenteum et sericeum. *Dill. Hist. Musc.* 392. t. 50. f. 62.

β. Bryum pendulum, furculis teretibus viridibus l. c. p. 394. t. 50. f. 63.

In humidis, lignis, trabibus, muris etc. Octobri cum thecis.

*carneum*

839. BRYUM foliis lanceolatis, remotis, tennerrimis; thecis ovatis pendulis; operculo obtuso *Hedw. Musc. frond.* I. p. 52. t. 20. (*delicatumum*).

Br. *carneum.* *Linn. Syst.* 4. p. 481.

In

In campis humidis: *kurz vor der gilowſchen Benz am Berge nach der Peene hin* et alibi paſſim. Hyeme et primo vere cum capſulis maturis.

840. BRYUM capſulis obliquis, foliis quinque-<sup>fumar</sup>fariis imbricatis recurvis, caule ferrugineo tomentoso. *Linn. Syſt. 4. p. 478.*

Elegantem muſcum ante aliquot annos legi: *auf der baſedowſehen Wieſe am Scheidegraben, auch bey Malchin auf der Weide hinter dem Jägerhauſe gleich vorn neben den jungen Tannen nahe am Ufer.*

841. BRYUM capſulis pendulis pyriformibus <sup>bimum</sup>obtusis, foliis lanceolatis alternis, caule rubiginoso. *Schreb. Spicil. p. 83.*

In pratis paludosis: *bey Malchin auf der Wieſe hinter dem Jägerhauſe; auch auf dem Moor bey den Torfgruben vor dem Steinthor.* Majo cum capſulis. Forte potius Weberae ſpecies.

MNIUM HEDW. G. M. 20.

*Capſ. Periſtoma duplex: ext. dentes 16. acuti; intern. e membrana carinata difformiter ciliatum.*

*Maſc. ſor diſciformis dioicus.*

842. MNIUM caule dichotomo, foliis ſubulatis. *Linn. Syſt. 4. p. 459.*

In pratis paludosis: *bey Malchin auf den Torfwieſen frequens* Hyeme et Vere.

*bornum* 843. MNIUM capsulis pendulis, pedunculo curvato, furculo simplici foliis margine scabris. *Linn. Syst. 4. p. 462.*

In nemorosis: *im kahldischen Holze an den hohlen Wegen.* Aprili. Majo.

*crudum* 844. MNIUM, trunco simplici; foliis inferioribus ovato lanceolatis, summis elongato-linearibus, apice denticulatis; perigonialibus masculis intimis cuneiformi variis. *Hedw. Musc. frond. I. 99. t. 47.*

*Mnium crudum.* *Linn. Syst. 4. p. 463.*

In nemorosis umbrosis: *an dem Berge hinter dem Pfort et alibi rarius.* Aprili.

*roseum* 845. MNIUM capsulis nutantibus pedunculis aggregatis, foliis rosaceae congestis, lanceolatis, acutis. *Schreb. Spicil. p. 84. sub Bryo.*

*Im Hayenholze bey Malchin auf dem ersten Berge et alibi sparsum.* Florentem in nostra regione non vidi.

*stellare* 846. MNIUM foliis lanceolatis integerrimis punctatis aristatis, pedunculis simplicibus anthera (capsula) cylindrica nutante. *Reichard Flor. moen. franc. p. 125.*

*Bryum stellare roseum minus capsulis et setis longioribus.* *Dill. Hist. Musc. 412. t. 52. f. 78.*

In umbrosis, ad vias cavas: *im kahldischen Holze im ersten hohlen Wege sparsum.* Vere.

847. *MNIUM* capsulis cernuis, pedunculis ag- *punctatum*  
gregatis, foliis obovatis integerrimis ob-  
tusis punctatis. *Schreb. Spicil.* p. 65.  
sub Bryo.

In nemorosis sylvaticis, ad radices arbo-  
rum: *im kahldiscen Holze* et alibi fre-  
quens. Martio. Aprili.

848. *MNIUM* capsulis nutantibus, pedunculis *cuspidatum*  
aggregatis, foliis ovatis acutis ferratis.  
*Schreb. Spicil.* p. 85. sub Bryo.

Cum praecedente ubique.

849. *MNIUM* capsulis nutantibus, pedunculis *ligularum*  
aggregatis, foliis oblongis, undulatis,  
ferratis. *Schreb. Spicil.* p. 84. sub Bryo.

In nemorosis: *auf dem Wall bey Malchin.*  
Aprili. Majo.

850. *MNIUM* thecis pendulis. foliis ovatis fe- *capillare*  
tiferis carinatis, pedunculis longissimis.  
*Linn. Syst.* 4. p. 462.

In nemorosis: *im Hayenholze bey Malchin*  
*auf dem ersten Berge* et alibi frequens.  
Aprili. Majo.

851. *MNIUM* thecis pendulis, foliis lanceola- *cespitium*  
tis: acuminato-fetaceis, pedunculis lon-  
gissimis. *Linn. Syst.* 4. p. 480.

In sylvaticis, pascuis humidis, ad sepes:  
*bey Malchin an den Gärten vor dem Stein-*  
*thor.* Aprili, Majo.

852. *Mnium* caule simplici geniculis inflexo. *fontanum*  
*Linn. Syst.* 4. p. 459.



*Locis scatariginosis: bey Witzzerhoff auf der Wiese bey den jungen Tannen. Aprili.*

KOELREUTERA HEDW. G. M. 21.

*Caps. Peristoma duplex: externum 16-dentatum; dentibus apice cohaerentibus obliquis intern. ciliis totidem membranaeis planis.*

*Musc. flor. disciformis, dioicus.*

*hygrometrica*

853: KOELREUTERA trunco exiguo, foliis ovato-lanceolatis concavis, pedunculo arcuato; theca pyriformi cernua.

*Mnium hygrometicum, Linn. Syst. 4. p. 460. In humidis ubique. Martio, Aprili.*

TIMMIA HEDW. Musc. frond. Vol. I. p. 83.

*Caps. Peristoma duplex: externum dent. 16-acuminat; intern. processus e membrana articulati, extremitatibus coniugatis.*

*Musc. flores monoici geminiformes pedunculati, alares.*

*megapolitana*

854. TIMMIA erecta, foliis lineari lanceolatis, serratis, patulis, theca cernua, operculo convexo centroque depresso. Hedw.

*Musc. frond. I. p. 83. t. 31.*

*In pratis turfo-paludosis: auf der Weide bey dem Lalaerberge. Majo cum capsulis maturis legi.*

WEBE-

WEBERA HEDW. G. M. 22.

*Capf. Peristoma duplex: externum 16-dentatum; dentibus acuminatis: intern. membranaceum cum et absque ciliis.*

*Flos hermaphroditus.*

855. WEBERA caule simplicissimo, foliis peripyriformia  
chaetii capillaribus longissimis recurvis;  
capsula pyriformi. *Hedw. Musc. frond. I.*  
p. 5. t. 3.

*MNIUM pyriforme. Linn. Syst. 4. p. 464.*

In humidis uliginosis: *bey Malchin auf den Wiesen bey dem Lalaerberge et alibi passim; primo Vere.*

856. WEBERA foliis lanceolatis, capsulis oblongis nutantibus. *Hedw. Musc. frond. I. p. 9.*  
t. 4.

*Bryum nutans. Schreb. Spicil. p. 81.*

In sylvaticis arenosis: *bey Malchin an dem Berge hinter dem Pfort et alibi passim. Majo cum capsulis.*

857. WEBERA capsulis obliquatis sphaericis. *pomiformis*  
*Linn. Syst. 4. p. 473.*

In umbrosis: *im kahldischen Holze in den hohen Wegen.* Aprili cum capsulis. (Forte proprium genus.)

BUXBAUMIA HEDW. G. M. 23.

*Capf. Peristoma duplex: extern. dentibus 16. truncatis; intern. membranaceo plicatum.*

*Masc. flos discoides.*

858. BUXBAUMIA. *Linn. Syst. 4. p. 453. aphylla*

In

In sylvaticis arenosis: in den Tannen bey Wä-  
tzerhoff passim; am Wege nach Jessen, am  
Graben bald am Ende der Tannen copiose.  
Autumno et Vere.

*foliosa*

859. BUXBAUMIA foliis exterioribus lingula-  
tis recurvatis; perigonalibus erectis arista-  
tis. (Weber. p. 128.)

Buxbaumia sessilis. Schmiedel Diff. de Buxb.  
26. n. 2.

In sylvaticis umbrosis: im kahldisehen Holze  
fast in allen hohlen Wegen passim et alibi  
rarissime. Augusto. Septembri.

FONTINALIS HEDW. G. M. 24.

Caps. Peristoma duplex: extern. dentibus 16.  
pyramidatis; internum reticulatum.

Musc. flos gemmaiformis in foliorum alis.

*antipyre-  
tica*

860. FONTINALIS foliis complicato carinatis  
trifariis acutis, capsulis lateralibus. Linn.  
Syst. 4. p. 451.

In fossis aquosis, fluviis: bey Malchin in dem  
Robrbruch an der Peen et alibi frequens.  
Vere florida.

MEESIA HEDW. G. M. 25.

Caps. Peristoma duplex: intern. dentes 16.  
abbreviato - rotundatis; intern. reticu-  
latum.

Musc. flos disciformis dioicus; nec non her-  
maphroditus.

*longisetia*

861. MEESIA foliis ovato lanceolatis patulis  
theca cernua in pedunculo praelongo;  
oper-

operculo conico. *Hedw. Musc. frond. I.*  
p. 56. t. 32.

*Mnium triquetrum. Linn. Syst. 4. p. 469.*

In paludosis turfosis: im kahldischen Holze  
auf dem Moor bey der alten Schlossstelle,  
medio Julii in optimo vigore.

862. MEESIA foliis lineari-lingulatis, obtusis; uliginosa  
capsula pyriformi cernua. *Hedw. Musc.*  
*frond. I. p. 1. t. 2.*

In pratis uliginosis: auf der Weide am Eisen-  
berge bey Malchin. Junio cum thecis in  
optimo vigore legi.

## B. HEPATICI.

JUNGERMANNIA. L. G. 1313.

*Capsula pedunculi solitaria 4-valvis. Semina*  
*filis elasticis instructa.*

\* *Frondibus foliosis pinnatis.*

863. JUNGERMANNIA frondibus simpliciter asplenoides  
pinnatis, foliolis ovatis subciliatis. *Linn*  
*Syst. 4. p. 503.*

α. J. maior, foliis brevioribus et obtusiori-  
bus non dentatis. *Mich. Gen. 8. t. 5.*  
f. 3.

β. J. minor, foliis subrotundis tenuissime  
denticulatis l. c. 7. t. 5. f. 1. 2.

α. Im kahldischen Holze im ersten hohlen We-  
ge et alibi passim. β. Ebendasselbst im  
zwey-

*zweyten hohlen Wege* et alibi copiose. Vere cum thecis, sed rarius.

- bidentata** 864. JUNGERMANNIA frondibus simpliciter pinnatis apice floriferis, foliolis bidentatis. *Linn. Syst. 4. p. 505.*

In sylvaticis umbrosis ad sepes passim autumnino et Vere cum thecis.

- globulifera** 865. JUNGERMANNIA foliis imbricatis, bicuspidatis globuliferis. *Pollich. p. 182. Haller III. p. 59. n. 1863.*

Mnium fissum Nek. Meth. fig. 11. Jungerm. bicornis Flor. Dan. Tab. 888. optime.

In sylvaticis: *bey Witzerhoff auf den Hügeln in den Tannen.* Aestate.

- bicuspidata** 866. JUNGERMANNIA frondibus simpliciter pinnatis medio floriferis, foliolis bidentatis. *Linn. Syst. 4. p. 505.*

In umbrosis: *im kahlischen Holze* passim. Vere sed rarissime cum capsulis.

**\*\* Frondibus pinnatis: pinnulis auriculatis, superne testis.**

- reptans** 867. JUNGERMANNIA frondibus bipinnatis apice reptantibus, foliolis quadridentatis. *Linn. Syst. 4. p. 508.*

In sylvis ad vias cavae: *im Holze bey Pifide* et alibi frequens. Hyeme et Vere cum thecis.

**\*\*\* Frondibus imbricatis.**

- complanata** 868. JUNGERMANNIA furculis repentibus: foliis inferne auriculatis duplicato-imbricatis. *Linn. Syst. 4. p. 509.*

In

In sylvaticis, ad truncos arborum frequens.

Martio cum thecis.

869. JUNGERMANNIA furculis repentibus: *dilatata*  
foliis inferne auriculatis, duplicato-imbricatis ramis apice latioribus. *Linn. Syst. 4.*  
p. 509.

Ad arborum truncos ubique Vere cum thecis,

870. JUNGERMANNIA foliis imbricatis, serie *amaristifolia*  
duplici, superioribus subrotundis convexis, obtusis, quadruplo maioribus. *Linn. Syst. 4.* p. 510.

Ad truncos arborum: *im Hayenholze bey Malchin* et alibi passim. Martio cum thecis.

871. JUNGERMANNIA Scopol. Carn 2. T. II. *trichomanis*  
p. 348. n. 1344. scalaris. *Schmidel Diff. de Jungerm.* p. 20. Spec. 15. fig. 17.

Mnium trichomanis. *Linn. Syst. 4.* p. 470.

In humidis sylvaticis: *im Holze bey Pifide* Aestate.

872. JUNGERMANNIA furculis procumbenti-*platyphyllis*  
bus, subtus imbricatis, foliis cordatis acutis. *Linn. Syst. 4.* p. 510.

In sylvis ad truncos arborum copiose. Martio, Aprili cum thecis sed rarius.

873. JUNGERMANNIA furculis repentibus, foliolis duplicato-imbricatis; inferne auriculatis. *Linn. Syst. 4.* p. 511.

In

In sylvis montosis ad truncos arborum, supra terram: *in den Tannen bey Witzerhoff* et alibi passim cum thecis nondum legi.

\*\*\*\* *Surculis undique imbricatis foliolis  
sparsis.*

*erichophylla* 874. JUNGERMANNIA surculis teretibus, foliolis capillaceis aequalibus. *Linn. Syst.* 4. p. 512.

In sylvis montosis: *im kahldischen Holze an dem schattigten Berge bey dem Mühlenbruch* et alibi passim; cum thecis nondum legi.

*romentella* 875. JUNGERMANNIA trunco prostrato, ramis explanatis, foliis tenerrime divisis.

Lichenastum filicinum pulchrum villosum: *Dill. Hist. Musc.* 503. t. 73. f. 35.

*Im kahldischen Holze an dem Bach bey dem Mühlenbruch* copiose, cum thecis nondum legi.

\*\*\*\*\* *Frondebis simplicibus explanatis.*

*epiphylla* 876. JUNGERMANNIA acaulis foliolo fronde innato. *Linn. Syst.* 4. p. 513.

In umbrosis humidis, in fossis: *bey Pfide im Bach* et alibi frequens. Aprili cum thecis.

*pinguis* 877. JUNGERMANNIA acaulis fronde oblonga sinuata pingui. *Linn. Syst.* 4. p. 513.

In

In fossis et pratis paludosis: *auf der Wiese hinter dem Jägerhause bey Malchin, rarius, et semper absque capsulis.*

878. JUNGERMANNIA acaulis fronde bipinna- *multifida* tífida. *Linn. Syst. 4 p. 514.*

In sylvis supra truncos putridos; ad radices arborum: *in der Bentz bey Gilow passim absque thecis.*

879. JUNGERMANNIA frondibus palmatis, di- *palmata* gitatis, e basi floriferis. *Haller Hist. stirp. num. 1887.*

Hedwig Theor. gener. et fructificat. Plant. cryptogam. Tab. XVIII. f. 94.

In sylvis in deiectis lignis: *in der Gilow-schen Bentz passim. Cum thecis in nostra regione nondum legi.*

880. JUNGERMANNIA acaulis fronde lineari *furcata* ramosa: extremitatibus furcatis. *Linn. Syst. 4. p. 514.*

In sylvis ad truncos arborum, supra lapides: *im kahldischen Holze et alibi passim; nunquam florens.*

881. JUNGERMANNIA acaulis, fronde subpin- *naefolia* natífida: lobis imbricatis, perichaetio plicato.

In locis umbrosis, ad terram humidam: *an dem Graben bey den Tannen am Schneider-Kamp am Wege nach Jessin et alibi frequens. Aprili cum thecis.*

Q

MAR-



MARCHANTIA. L. G. 1315.

*Receptaculum* pedunculatum, multicapsulare.

*Caps.* 4 - valves. *Sem.* filis elasticis instructa.

polymor-  
pha

882. MARCHANTIA calyce communi decem-  
fido.

♀ α. Marchantia maior, capitulo stellato:  
radiis teretibus. Michael. gen. 2. t. 1. f. 1.

β. M. capitulo stellato: radiis teretibus. L. c.  
2. t. 1. f. 2.

♂ Marchantia capitulo non dissecto L. c. t.  
r. f. 5.

In humidis umbrosis in hortis et pratis ubi-  
que. Majo cum thecis.

*Officin:* Hepaticæ fontanae. f. Lichenis stel-  
lati Herba.

conica

883. MARCHANTIA receptaculo pedunculato  
conico, quinecapsulari. Linn. Syst. 4.  
p. 518.

In pratis paludosis: bey Malchin im Eller-  
bruch an der Scheide nach Basedow. Majo  
sed rarius florens.

ANTHOCEROS. L. G. 1318.

*Caps.* bivalvis linearis, femina columnulae  
filiformi adhaerentia.

punctatus

884. ANTHOCEROS frondibus indivisis sinua-  
tis, punctatis. Linn. Syst. 4. p. 521.

Ad latera fossarum in agris humidis: auf  
dem Felde bey Pifide et alibi copiose. Au-  
tumno cum capsulis.

885.

885. ANTHOCEROS frondibus indivisis, sinua- *laevis*  
tis laevibus. *Linn. Syst. 4. p. 522.*

Cum praecedente eodem tempore.

BLASIA. L. G. 1316.

♂ — ♀ *Capsulae* cordiformes.

886. BLASIA. *Linn. Syst. 4. p. 519.* *pusilla*

Ad latera fossarum, ad vias cavas humidas:  
*im Hayen Holze in dem bohlen Wege an*  
*der Scheide nach Gilow.* Autumno cum  
capsulis.

RICCIA. L. G. 1317.

♂ ♀ *Capsulae* subrotundae substantiae fron-  
dis immerfae.

887. RICCIA frondibus superficie papillofis. *crystallina*  
*Linn. Syst. 4. p. 519.*

Locis humidis, ad latera fossarum: *im Müh-*  
*lenfelde an der hohlen Beck. bey Mälchin* spar-  
sim. Autumno in Ver usque.

888. RICCIA frondibus glabris canaliculatis, *glauca*  
bilobis obtusis. *Linn. Syst. 4. p. 520.*

In agris humidis post messem copiose. Au-  
tumno.

889. RICCIA frondibus dichotomis lineari-fi- *fluviatilis*  
liformibus. *Linn. Syst. 4. p. 520.*

In fossis exsiccatis, in piscinis: *am Ende des*  
*kahldischen Holzes am Wege nach Hayens-*  
*raum et alibi passim.* Autumno et Vere.

## III.

## ALGAE.

LICHEN. L. G. 1219.

♂ ♀ *Receptaculum* subrotundum planiusculum, nitidum.

a. *Leprosi tuberculati.*

*scriptus* 890. LICHEN leprosus albicans, lineolis nigris ramosis characteriformibus. *Linn. Syst.* 4. p. 522.

In corticibus arborum passim; persistens.

*byssoides* 891. LICHEN leproso-farinaceus, peltis stipitatis subglobosis. *Linn. Syst.* 4. p. 523.

Ad terram glareosam, locis umbrosis: *bey Witzerhoff am Graben an den jungen Tannen*; persistens.

*sanguinarius* 892. LICHEN leprosus cinero-virescens, tuberculis atris. *Linn. Syst.* 4. p. 525.

In truncis arborum frequens; persistens.

*fusco-ater* 893. LICHEN. leprosus fuscus tuberculis atris. *Linn. Syst.* 4. p. 525.

*An der Stadtmauer um Malchin* passim; persistens.

*atro-albus* 894. LICHEN leprosus niger tuberculis atro-alboque mixtis. *Linn. Syst.* 4. p. 526.

Supra lapides persistens: *auf den Steinen in den Tannen bey Witzerhoff.*

*fagineus* 895. LICHEN leprosus albus, tuberculis albis farinaceis.

In

In truncis fagorum frequens; persistens.

896. LICHEN leprosus cinereus tuberculis al- *Carpineus*  
bidis rugosis. *Linn. Syst.* 4. p. 527.

In truncis Carpinum frequens; persistens.

897. LICHEN leprosus albicans, tuberculis sti- *bacomices*  
pitatis carnis *Linn. Suppl.* p. 450.

Ad terram; *auf dem Brachacker zwischen*  
*den Tannen hinter Gilow* et alibi copiose;  
persistens.

*b. Leprosi scutellati.*

898. LICHEN crustaceus flavus, scutellis luteis. *candelaris*  
*Linn. Syst.* 4. p. 528.

In arborum truncis, muris et alibi frequens;  
persistens.

899. LICHEN crustaceus albicans, scutellis *palescens*  
pallidis. *Linn. Syst.* 4. p. 529.

In muris, faxis, in trabibus; persistens.

1000. LICHEN crustaceus albicans, scutellis *subfuscus*  
nigris: iunioribus urceolatis cavis, *Linn.*

*Syst.* 4. p. 530.

In arborum truncis passim; persistens.

*c. Imbricati.*

1001. LICHEN imbricatus foliolis sinuatis scabris *saxatilis*  
lacunosis, scutellis hadiis. *Linn. Syst.* 4.

p. 531.

Supra lapides copiose; persistens.

*Officin:* Usnea. s. Muscus cranii humani.

1002. LICHEN imbricatus foliolis lobatis niti- *olivaceus*  
dis lividis. *Linn. Syst.* 4. p. 532.

In arborum corticibus; in hortis copiose;  
persistens.

*crispus* 1003. LICHEN imbricatus, foliis lobatis trunculis atroviridibus, scutellis concoloribus.  
*Linn. Syst. 4. p. 533.*

In sylvis ad terram inter muscos: *im kahl-  
dischen Holze am hohlen Wege* et alibi pas-  
sim; persistens.

*parietinus* 1004. LICHEN imbricatus, foliis crispis fulvis, peltis concoloribus fulvis. *Linn. Syst. 4. p. 534.*

In parietibus, tegulis, arboribus ubique;  
persistens.

*orbicularis* 1005. LICHEN imbricatus: foliolis oblongis obtusis multifidis: scutellis subfuscis.  
*Necker. Gallo-belg. p. 509.*

In arborum truncis, praesertim salicum co-  
piose; persistens.

*physodes* 1006. LICHEN imbricatus laciniis obtusis sub-  
inflatis. *Linn. Syst. 4. p. 534.*

In arborum truncis, ad sepes vulgaris; per-  
sistens.

*stellaris* 1007. LICHEN imbricatus foliolis oblongis la-  
ciniatis angustis cinereis scutellis pullis.  
*Linn. Syst. 4. p. 535.*

In ramis arborum, persistens.

*d. Foliacei.*

*ciliaris* 1008. LICHEN foliaceus erectiusculus: laci-  
niis linearibus ciliatis, scutellis pedun-  
culatis crenatis. *Linn. Syst. 4. p. 535.*

Ad

Ad arborum truncos, praesertim salicum  
frequens; persistens.

1009. LICHEN foliaceus laciniatus albus: laciniis ascendentibus obtusis pilosis, scutellis sessilibus. *Schreb. Spicileg. p. 126.* *bispidus*

In truncis arborum, fruticum inque sepibus  
frequens; hyeme.

1010. LICHEN foliaceus laciniatus obtusus glaber: supra lacunofus subtus tomentosus. *Linn. Syst. 4. p. 537.* *pulmonarius*

In arborum annosarum, praesertim Quercuum truncis: *im kahldischen Holze* copiose; persistens.

*Officin: Pulmonariae arboreae Herba.*

1011. LICHEN foliaceus decumbens furfuraceus: laciniis acutis: subtus lacunosis atris. *Linn. Syst. 4. p. 538.* *furfuraceus*

In arborum truncis passim; persistens.

1012. LICHEN foliaceus erectus compressus ramosus, verrucis marginalibus farinosis. *Linn. Syst. 4. p. 539.* *farinaceus*

In arboribus frequens; persistens.

1013. LICHEN foliaceus ramosus lacunofus convexus mucronatus. *Linn. Syst. 4. p. 539.* *calicaris*

In trabibus, arboribus, frequens; persistens.

1014. LICHEN foliaceus erectus oblongus, lan-  
ceolatus sublaciniatus lacunofus glaber,  
scutellis subpedunculatis. *Linn. Syst. 4. p. 540.* *fraxineus*

In arborum truncis, praesertim salicis copiose; persistens.

*penicillatus* 1015. LICHEN foliaceus erectiusculus lacunosus: subtus tomentosus albus. *Linn. Syst.* 4. p. 541.

In arboribus ubique; persistens.

*Officin*: Musci Accaciae s. arborei Herba.

*juniperinus* 1016. LICHEN foliaceus laciniatus crispus fulvus, peltis lividis. *Linn. Syst.* 4. p. 541.

In Juniperis, apud nos rarissime; persistens.

*induratus* 1017. LICHEN. *Weber Spicileg.* p. 241.

Misit Dr. DETHARDING: locum non adnotavit; persistens.

*caperatus* 1018. LICHEN pallide-viridis rugosus, margine undulatus. *Linn Syst.* 4. p. 542.

In arboribus, trabibus ubique; persistens.

*glaberrimus* 1019. LICHEN foliaceus depressus, lobatus glaber; margine crispo, farinaceo. *Linn. Syst.* 4. p. 542.

Unicum specimen legi: in den Tannen bey Malchin; persistens.

#### *e. Coriacei.*

*ornatus* 1020. LICHEN coriaceus repens ovatus planus, subtus venosus, villosus, peltis marginalibus horizontalibus. *Linn. Syst.* 4. p. 544.

In sylvaticis umbrosis: im kahldischen Holze in den kahlen Wegen frequens. Hyeme.

1021.

1021. LICHEN coriaceus repens lobatus obtu- *apbrofus*  
 sus planus, verrucis sparsis, pelta margi-  
 nali adscendente. Linn. Syst. p. 544.

In sylvaticis umbrosis: *im kahldischen Holze*  
*im hohlen Wege nach Gölitz*; persistens.

Officin: Musci cumatilis Herba.

1022. LICHEN coriaceus repens lobatus obtu- *caninus*  
 sus planus, subtus venosus villosus, pel-  
 ta marginali adscendente. Linn. Syst. 3.  
 p. 545.

In sylvis cum varietatibus copiose; persistens.

Officin: Musci canini Herba.

1023. LICHEN coriaceus repens planus subtus *horizon-*  
 avenius, peltis marginalibus horizontali- *salis*  
 bus. Linn. Syst. 4. p. 546.

In sylvaticis umbrosis: *in dem hohlen Wege*  
*nach Gölitz*; persistens.

*f. Umbilicati (squalentes quasi fuligine.)*

1024. LICHEN umbilicatus: subtus lacunofus, *pustularus*  
 furfure nigro adpersus. Linn. Syst. 4.  
 p. 548.

Supra lapides: *auf einem grossen Stein in den*  
*Tännen bey Witzerhoff*; persistens.

*g. Scyphiferi.*

1025. LICHEN scyphifer simplex integerrimus *cocciferus*  
 stipite cylindrico, tuberculis coccineis.  
 Linn. Syst. 4. p. 550.

In sylvis ad terram, truncos arborum fre-  
 quens; persistens.

Qr

Officin:



*Officin:* Musci pixidati. Herba.

*Observ.* vel simplex est, e margine prolifer.

*pixidatus* 1025. LICHEN scyphifer simplex crenulatus, tuberculis fuscis. *Linn. Syst.* 4. p. 551.

In iisdem locis copiose; persistens.

*Observ.* iterum vel simplex vel prolifer est.

*fimbriatus* 1027. LICHEN scyphifer simplex denticulatus stipite cylindrico. *Linn. Syst.* 4. p. 552.

In sylvis ad terram persistens.

*digitatus* 1028. LICHEN scyphifer ramosissimus: ramis cylindricis, calycibus integris nodosis. *Linn. Syst.* 4. p. 553.

In iisdem locis; persistens.

*cornutus* 1029. LICHEN scyphifer simpliciusculus sub-ventricosus, calycibus integris. *Linn. Syst.* 4. p. 553.

#### *h. Fruticulosi.*

*raugiferinus* 1030. LICHEN fruticulosus perforatus ramosissimus, ramulis nutantibus. *Linn. Syst.* 4. p. 554. β.

Coralloides fruticuli specie candicans, corniculis rufescentibus. *Dill. Hist. Musc.* 110. t. 16. f. 3c.

In sylvis ad terram, in den Tannen bey Wtzerhoff et alibi vulgaris; persistens.

*subulatus* 1031. LICHEN fruticulosus subdichotomus, ramis simplicibus subulatis. *Linn. Syst.* 4. p. 556.

In

In nemorosis humidis: *bey Malchin auf der Wiese hinter dem Jägerhause* et alibi frequens; persistens.

1032. LICHEN fruticulofus solidus tectus fq. *paschalis* liolis crustaceis. *Linn. Syst. 4. p. 557.*

In sylvis arenosis ad terram: *bey Malchin an dem sandigten Berge bey den jungen Tannen hinter dem Jägerhause*; persistens.

1033. LICHEN fruticulofus diffusus compref. *aculeatus* fus, ramosississimus: ramulis furcatis spinosis. *Schreb. Spicileg. 125. Weber. Spicileg. 207.*

In iisdem locis copiose; persistens.

1034. LICHEN fruticulofus, ramosus nudus: *spinofus* caule retrorsum aculeato, ramulis acutis tuberculatisque. *Hagen, Hist. Lich. c. Icone.*

In iisdem locis sed rarius persistens.

*i. Filamentosi.*

1035. LICHEN filamentofus pendulus subarticulatus, ramis patentibus. *barbatus* *Linn. Syst. 4. p. 558.*

In arboribus passim; persistens.

1036. LICHEN filamentofus pendulus, axillis compressis. *iubaratus* *Linn. Syst. 4. p. 559.*

In pinis: *in der basedowschen Heide* passim; persistens.

1037. LICHEN filamentofus ramosus divaricatus *chalibeifertus* *mis*

tus decumbens implicatò - flexuosus. *Linn.*

*Syst.* 4. p. 560.

Ad arborum truncos, trabes parvim; persistens.

*hirsutus* 1038. LICHEN filamentosus ramosissimus, erectus, tuberculis farinaceis sparsis. *Linn.*  
*Syst.* 4. p. 560.

In sepimentis antiquis; persistens.

*bippotrichoides* 1039. LICHEN teres capillaris, niger, subsimplex, extremitatibus divisis. *Weber Spicileg.* 232.

In pinuum foliis deiectis, copiose; persistens.

*radiciformis* 1040. LICHEN longissimus ex fusco nigricans glaber radiciformis. *Weber Spicileg.* 232.

In salicum cortice putrescente passim persistens.

*floridus* 1041. LICHEN filamentosus ramosus erectus, scutellis radiatis. *Linn. Syst.* 4. p. 561.

In arboribus annosis passim; persistens.

#### TREMELLA. L. G. 1320.

*Fructificationes* in corpore gelatinoso, filamentosae aut granulatae.

*agaricoides* 1042. TREMELLA stipitata nigra inquinans pileo subconvexo. Retz prodrom. flor. scandin. 2. p. 235. n. 1424.

Peziza sessilis, infundibuliformis extus hirsuta umbrina, intus nigerrima *Hall. helv.* n. 2219. t. 48. f. 8.

*Lyc.*

*Lycoperdon truncatum parasiticum subrotundum.* *Linn. Syst.* 4. p. 626. Junior planta.

In ligno fagi putrido frequens autumnno.

1043. *TREMELLA sessilis membranacea auri juniperinae formis fulva.* *Linn. Syst.* 4. p. 562.

In Juniperetis primo vere.

1044. *TREMELLA plicata undulata.* *Linn. Nostoc Syst.* 4. p. 562. α.

In pratis post pluvias praesertim: *bey dem malchinschen Kalkofen*, Autumnno et vere.

1045. *TREMELLA sessilis subrotunda undulata arborea nigrescens.* *Hudson. angl. ed.* 2. p. 563.

T. nostoc, β. *Linn. Syst.* 4. p. 563.

T. arborea, nigricans minus pinguis et fugax. *Dill. Hist. musc.* 54. t. 10. f. 15.

In arborum ramulis deiectis inque asseribus Autumnno et Vere.

1046. *TREMELLA erecta plana margine crispo Lichenoides laciniato.* *Linn. Syst.* 4. p. 563.

In muscis, locis umbrosis: *im kahldischen Holze* passim.

1047. *TREMELLA glutinosa, globosa, disc. candida formis; mihi.*

In muscis: *im kahldischen Holze*, Octobri.

Facies amyli cocti.

1048. *TREMELLA unctuosula, butyri colore et butyracea figura.* *Wolff flor. borussic.* p. 36.

Fungus non vescus XXX. flos arborum, fungo affinis. *Loef. flor. Boruss.* p. 96.

In

In ligno fabrefacto abietino.

*mesenteriformis*

1049. TREMELLA in plicas multiplices intorta. *Murr. Syst.* 14. p. 965.

In arborum truncis putridis. Autumno.

*coccinea*

1050. TREMELLA caespitosa, coccinea; frondibus erectis cylindraceis, obtusis. *Scopol. flor. carniol. ed. 2. p. 1405.*

In truncis putridis. Autumno.

ULVA. L. G. 1322.

*Fructificationes* in membrana diaphana.

*intestinalis*

1051. ULVA tabulosa simplex. *Linn. Syst.* 4. p. 583.

In lapillis submarinis maris baltici frequens.

*compressa*

1052. ULVA tubulosa ramosa, compressa. *Linn. Syst.* 4. p. 584.

In mari baltico frequens.

*latissima*

1053. ULVA oblonga plana undulata, membranacea viridis. *Linn. Syst.* 4. p. 584.

Ad littora maris baltici passim reiecta.

*Linna*

1054. ULVA fronde oblonga bullata. *Linn. Syst.* 4. p. 585.

In mari baltico versus littora ad lapides, haud infrequens.

*granulata*

1055. ULVA sphaerica aggregata. *Linn. Syst.* 4. p. 586.

In inundatis exsiccatis: *bey Malchin auf dem Gerichtsbring* passim. Autumno.

FACUS.

Fucus. L. G. 1321.

*Masc.* Vesiculae villis intertextae

*Fem.* Vesiculae adspersae granis immerfis,  
apici prominulis. *Sem.* solitaria.

1056. Fucus fronde plana dichotoma costata *seraceus*  
ferrato-dentata, fructificationibus termi-  
nalibus tuberculosis. *Linn. Syst.* 4. p. 566.

Ad littora maris baltici passim reiecta.

1057. Fucus fronde plana dichotoma costata-*vesiculosus*  
integerrima, vesiculis axillaribus gemi-  
nis; terminalibus tuberculatis. *Linn.*  
*Syst.* 4. p. 567.

In lapidibus submarinis maris baltici co-  
piose.

1058. Fucus fronde filiformi subfragili opa- *filum*  
ca. *Linn. Syst.* 4. p. 574.

In littore maris baltici rarius.

1059. Fucus fronde filiformi dichotoma ra- *fastigiatus*  
mosissima fastigiata obtusa. *Linn. Syst.* 4.  
p. 574.

Iisdem locis.

1060. Fucus fronde subsimplici ensiformi, *saccharatus*  
stipiti terete brevissima.

In mari baltico rarius ubi habuit Dn. DE.

THARDING.

1061. Fucus frondibus membranaceis ovato- *sanguineus*  
oblongis integerrimis, petiolatis, caule  
tereti ramoso. *Linn. Syst.* 4. p. 567.

Ad littora maris baltici reiiicitur. Specimina  
valde incompleta ibi legi.

1062.

- rubens* 1062. *Fucus* frondibus membranaceis, oblongis undulatis sinuatis; stipite tereti ramosa. *Linn. Syst.* p. 579.  
Iisdem locis. Exemplaria incompleta.

CONFERVA. L. G. 1323.

Tubercula inaequalia, in fibris capillaribus; longissimis.

- *Filamentis simplicibus, aequalibus, geniculis destitutis.*

- rivularis* 1063. CONFERVA filamentis simplicissimis aequalibus longissimis. *Linn. Syst.* 4. p. 587.  
In rivulis: *bey Malchin in dem Bach bey den Hellengrund et alibi passim.* Aestate et Autumno.

\*\* *Filamentis ramosis aequalibus.*

- amphibia* 1064. CONFERVA filamentis aequalibus ramosis, exsiccatione coeuntibus in aculeos. *Linn. Syst.* 4. p. 588.

In flumine supra lapides: *bey Malchin in der Peene bey der Zugbrücke.* Augusto.

- bullosa* 1065. CONFERVA filamentis aequalibus ramosis aereas bullas includentibus. *Linn. Syst.* 4. p. 587.

In fossis, aquis stagnantibus, inundatis copiose.

- canalicularis* 1066. CONFERVA filamentis aequalibus basin versus ramosioribus. *Linn. Syst.* 4. p. 588.

in

In canalibus aquam ducentibus rarius: Aestate.

1067. CONFERRA filamentis aequalibus extre- *furcata*  
mitatibus ramosis ramis simplicibus. *Hud-*  
*son flor. anglic. p. 592.*

In rivulis leniter fluentibus: *vor der Casta-*  
*de in Remplin. Aestate,*

\*\*\* *Filamentis geniculatis.*

1068. CONFERRA filis geniculatis dichotomis. *Corallina*  
*Linn. Syst. 4. p. 591.*

Ad litora maris baltici.

1069. CONFERRA filamentis geniculatis, ra- *glomerata*  
mulis brevioribus multifidis. *Linn. Syst.*  
*4. p. 592.*

In rivulis: *bey der Gilowischen Mühle. Ae-*  
*state.*

BYSSUS. L. G. 1324.

Fibrae simplices, uniformes, lanuginosae f.  
pulverulentae.

\* *Filamentosae.*

1070. BYSSUS filamentis plumosis natantibus. *flos aquae*  
*Linn. Syst. 4. p. 593.*

In aquis stagnantibus: *in dem Wallgraben*  
*bey Malchin et alibi frequens. Aestate.*

1071. BYSSUS lanuginosa violacea lignis adna- *phospho-*  
rens. *Linn. Syst. 4. p. 594.* *rea*

In nemoribus, caudicibus putridis arborum  
innascens, Hyeme et Vere.



- velutina* 1072. Byssus filamentosa viridis: filamentis ramosis. *Linn. Syst. 4. p. 594.*
- aurea* 1073. Byssus capillacea pulverulenta, fructificationibus sparsis, filamentis simplicibus ramosisque. *Linn. Syst. 4. p. 594.*  
 Supra lapides: *bey Witzerhoff auf dem grossen Stein im Acker am Holze rarius.*  
*Hyeme.*
- fulva* 1074. Byssus filamentis ramosis fulvis. *Hudson. flor. angl. ed. 2. p. 606.*  
 In lignis putrescentibus humidiusculis.  
*Hyeme.*
- barbara* 1075. Byssus filamentis erectiusculis, summitatibus ramosis subfastigiatis fulvis. *Hudson flor. angl. ed. 2. p. 606.*  
 In truncis arborum putridis, rarius.
- candida* 1076. Byssus filamentis ramosissimis, ramis fasciculatis albidis. *Hudson flor. angl. ed. 2. p. 607.*  
 In foliis putrescentibus passim. *Hyeme*
- septica* 1077. Byssus capillacea mollissima parallela fragilissima pallida. *Linn. Syst. 4. p. 593.*  
 In trabibus et pavimentis aedificiorum passim; persistens.

\*\* *Pulverulantae.*

- candelaris* 1078. Byssus pulverulenta flava lignis adnascens. *Linn. Syst. 4. p. 596.*  
 In parietibus, lignis, corticibus arborum ubique; persistens.

1079. *Byssus pulverulenta viridis.* *Linn. botryoides*  
*Syst.* 4. p. 596.

In terra humida umbrosa, ollis hortulanorum  
 vulgaris; persistens.

1080. *Byssus pulverulenta incana farinae in-* *incana*  
*star strata.* *Linn. Syst.* 4. p. 596.

Ad arborum radices frequens. Hyeme.

1081. *Byssus lanuginosa aeruginosa.* *Weis aeruginosa*  
*Plant. cryptog.* p. 18.

Ad truncos caeduos putrescentes Salicis et  
 Fagi passim; persistens.

1082. *Byssus pulverulenta rubens inodora.* *rubens*  
*Weigel observ.* p. 44.

Lichen crusta cinnabarina. *Hall. helv.* n.

2098.

Ad cortices fagorum aliarumque arborum;  
 persistens.

## IV.

## F U N G I.

OCTOSPORA HEDW. Musc. fr. Vol. II. p. 4.

*Truncus* simplicissimus, terminatus superfi-  
 cie concava, plana, reflexa; fertili thecis  
 feminalibus membranosis, ut plurimum  
 stipa filamentosa iunctis non cohaerenti-  
 bus, feminibus 8 foetis.

R 2

\* Pa.

\* *Patellaeformes.*

*pixis* 1083. OCTOSPORA turbinata truncata, disco punctato. *Linn. Syst. 4. p. 617. sub Peziza.*

In stercore equino, rarius Autumno.

*suberosa* 1084. OCTOSPORA trunco tenui elongato, in cyathum extus profunde fuscum, intus pallidum exeunte, thecis nudis. *Hedw. Musc. fr. II. p. t. 10. B.*

*Bey Malchin im Hayenholze am Sporkenkeller ad terram. Aprili.*

*acetabulum* 1085. OCTOSPORA cyathiformis, extus angulata venis ramosis. *Linn. Syst. 4. p. 618. sub Peziza.*

*Fungoides maximum pixidatum Vaill. par. 57. t. 13. f. 1. Icon optima.*

*Ad latera fossarum, rarius: auf der Wiese bey Remplin am Graben ohnfern der Torfscheune cum Phallo conico.*

*lycoperdoides* 1086. OCTOSPORA sessilis cyathiformis hemisphaerica, fusca. *Scopol. Flor. Carn. 2. p. 480. n. 1618. sub Elvela.*

*In collibus graminosis: in dem Lustgehölze bey Remplin, ad terram. Majo.*

*cyathoides* 1087. OCTOSPORA cyathiformis, margine obtuso erecto. *Linn. Syst. 4. p. 618. sub Peziza.*

*In sylvis ad terram: im kahldischen Holze, infrequens. Autumno.*

1088.

1088. OCTOSPORA stipitata, hemisphaerica, *coccinea*  
glabra, extus albida, intus coccinea, mar-  
gine denticulato albido. *Reichard. Fl.*  
*Moeno-Francof.* n. 907. sub *Peziza*.

In ramis emortuis deiectis passim. Martio.

1089. OCTOSPORA planiuscula margine con-*scutellata*  
vexo. *Linn. Syst.* 4. p. 618. (sub *Pe-*  
*ziza*.) *Hedw. Musc. frond.* II. p. 10.  
t. 3. A.

β. *Peziza laevis* non ciliata coccinea. *Flor.*  
*Dan.* t. 656. f. 2.

Ad terram spongiosam in hortis et pratis  
humidis in stercore bovino. β. In sylvis in-  
ter muscos. Autumno et Vere.

1090. OCTOSPORA stipitata; stipite elongato, *birudo*  
sursum diffuso in discum superne pulvina-  
tum reflexum et cicatrice notatum, ciner-  
eo-fusca, margine disci ferrugineo.  
*Batsch. Cont.* I. p. 213. n. 149. t. 27.  
f. 149.

Ad terram in horto meo. Majo.

1091. OCTOSPORA stipitata convexa hemi-*caliculus*  
sphaerica patens, stipite subelongato, linea-  
ri, valide distincte inserto. *Batsch. Elench.*  
p. 123. var. γ. *Icon. Ienens.* 57.

In lignis deiectis. Autumno.

1092. OCTOSPORA substipitata inverse conica, *sigillatoria*  
fatta, stipite confluyente; superne parum  
tantum excavata, patens alba. *Batsch.*  
*Cont.* I. p. 205. f. 142.

In cortice fagineo deiecto.

- calyciformis* 1093. OCTOSPORA pileo ochraceo, glabro, subtus una cum stipite carneo-furfurosa. *Batsh. Cont. I. p. 195. f. 135.*

In truncis emortuis Cerasi. Autumno.

- citrina* 1094. OCTOSPORA trilinearis simplex gregaria, e basi contracta stipitiformi in patellam ampliata, tota citrina, feminulis rotundis minutissimis. *Hedw. Musc. frond. II. p. 28. t. 8.*

In truncis deiectis, in der gilowfchen Bentz. Autumno.

- comisialis* 1095. OCTOSPORA sessilis farta, tota adnata, plana canescens, superficie marginali externa fusca, nigro-venosa in marginem erectum lobato-coronatum, producta. *Batsh. Cont. I. n. 152. sub Peziza.*

In foliis quercinis delapsis. Octobri.

- cornucopioides* 1096. OCTOSPORA infundibuliformis, disco patente, sinuato-punctato. *Linn. Syst. 4. p. 617. sub Peziza.*

Ad radices arborum: im kahldischen Holze. Autumno,

**\*\* Pileatae.**

- mitra* 1097. OCTOSPORA pileo deflexo adnato, lobato diffirmi. *Linn. Syst. 4. p. 615. sub Helvella.*

In sylvis supra terram: im Holze bey Pfide rarius. (Germ. Spiz-Morchel.)

1098.

1098. OCTOSPORA lamina gyrofa subinaequa-<sup>menzelia-</sup>  
 lis pileiforma, deorsum late et fimbria-<sup>na</sup>  
 tim expansa. *Gled. meth. Fung. p. 39.*  
 n. 2. sub Elvela. (Germ. *gemeine Morchel.*)

Fungus porosus communis intestinorum  
 gyros referens. Menz. pug. rar. t. 6.

In sylvis: *in der basedowschen Heide* copiose,  
 et prostat recens in fero, nec non exsiccata  
 apud mercatores. Aprili et Majo,

PHALLUS. L. G. 1328.

Pileus subtus laevis, supra callis re-  
 ticulatus.

1099. PHALLUS pileo ovato celluloso, stipite *esculentus*  
 nudo rugoso. *Linn. Syst. 4. p. 613.*

*In den basedowschen Tannen* passim; *im Hay-*  
*enholze bey Malchin*, rarius. Majo.

1100. PHALLUS volvatus, stipitatus, pileo cel-*impudicus*  
 luloso. *Linn. Syst. 4. p. 614.*

In sylvis: *im Holze bey Pifide* passim. Au-  
 gustu.

1101. PHALLUS pileo campanulato sublaevi, *conicus*  
 superne fusco, inferne flavo, margine sub-  
 sinuato, stipite tereti fistuloso flavo. *Flor.*  
*Dan. t. 634.*

Lectus d. 14. Maj. 1788.: *am Graben auf*  
*der remplinischen Wiese*, *ohnfern der Torf-*  
*schenke.* Unicum exemplar; quod etiam  
 asservo.

## CLATHRUS. L. G. 1329.

Fungus subrotundus cancellatus.

*denudatus* 1102. CLATHRUS stipitatus, capitulo oblongo volvato. *Linn. Syst. 4. p. 615.*

In sylvis supra terram inter muscos: *im kahl-  
disthen Holze an der Mördergrube.* Sep-  
tembri.

*nudus* 1103. CLATHRUS stipitatus capitulo oblongo  
axi longitudinali adnato. *Linn. Syst. 4.  
p. 615.*

Ad asseres, in lignis putridis, passim. Au-  
gusto.

## AGARICUS. L. G. 1325.

Pileus subtus lamellosus.

\* *Stipitati, pileo orbiculato.*

*cansarellus* 1104. AGARICUS stipitatus, lamellis ramosis  
decurrentibus. *Linn. Syst. 4. p. 597.*

In sylvis ubique autumnno.

*muscarius* 1105. AGARICUS stipitatus lamellis dimidiatis  
solitariis stipite volvato: apice dilatato,  
basi ovata. S. V. p. 599.

In sylvis ubique autumnno.

*dentatus* 1106. AGARICUS stipitatus, pileo convexo la-  
mellis basi mucrone dentatis. *Linn. Syst.  
4. p. 599.*

In sylvis sparsim: *im Hayenholze bey Malchin,*  
autumnno.

*squarrosus* 1107. AGARICUS pileo ferrugineo, squamu-  
lis piloso-furfuraceis revolutis imbricato,  
stipite

stipite valido subclavato, concolore, inferne usque ad volvam laceram reflexo patente squamoso furfuraceo - squarroso, lamellis cinereis. *Batsch. Elench. n. 123. t. 8. f. 31.*

*Im Holze bey Pifide* autumnno.

1108. AGARICUS stipitatus, pileo plano car. *lactifluus* neo lactescente, lamellis rufis, stipite longo carneo. *Linn. Syst. 4. p. 600.*

*In sylvis* autumnno.

1109. AGARICUS stipitatus, pileo planiusculo *piperatus* lactescente, margine deflexo, lamellis incarnato-pallidis. *Linn. Syst. 4. p. 600.*

*In sylvis* copiose.

1110. AGARICUS stipitatus pileo convexo *campestris* squamato albido, lamellis rufis. *Linn. Syst. 4. p. 601.*

*In pratis: bey Malchin auf der Dammwiese* copiose. Augusto.

1111. AGARICUS stipitatus, pileo flavo con- *Georgii* vexo, lamellis albis. *Linn. Syst. 4. p. 601.*

*In sylvis: Im Hayenholze bey Malchin.* Mayo.

1112. AGARICUS stipitatus, pileo rimoso: *violaceus* margine violaceo tomentoso, stipite caerulefcente, lana ferruginea. *Linn. Syst. 4. p. 602.*

*In sylvis* ubique autumnno.



*cinnamo-*  
*mus*

1113. AGARICUS stipitatus, pileo fordide flavo, lamellis luteo-rufis. *Linn. Syst.* 4. p. 602.

In sylvis: im Hayenholze bey Malchin. Autumno.

*fascicularis*

1114. AGARICUS stipitatus, pileo convexo luteo, lamellis virescentibus, stipite flavo. *Hudson flor. anglic.* p. 615. *Batsch Elench. fungor.* p. 83. n. 113. t. 7. f. 29.

Ad truncos salicum ubique et ad terram: in der busedowfchen Heyde. Majo et Autumno.

*inseger*

1115. AGARICUS stipitatus, lamellis omnibus margine aequalibus. *Linn. Syst.* 4. p. 598.

In sylvaticis: bey Malchin im Hayenholze passim. Augusto. Septembri.

*alliacus*

1116. AGARICUS stipitatus, pileo convexo opaco, supra fusco, subtus albo, stipite fistuloso nigro, nudo. *Linn. Syst. Ed. XIV.* p. 976.

In sylvaticis umbrosis: in der Waldung bey Pifide et alibi sparsim. Septembri.

*clypeatus*

1117. AGARICUS stipitatus, pileo hemisphaerico viscido acuminato, lamellis albis, stipite longo cylindrico albo. *Linn. Syst.* 4. p. 603.

In sylvis ubique. Augusto.

*fimetarius*

1118. AGARICUS stipitatus, pileo campanulato lacero, lamellis nigris lateraliter flexuosis,

xuosis, stipite fistuloso. *Linn. Syst.* 4.  
p. 604.

In fimetis Autumno.

1119. AGARICUS pileo convexo cinereo plicis *narcoticus*  
dense bifidis distinctis plicato, vertice in-  
tegro, stipite subulato, laminis rariori-  
bus integris et dimidiatis alternis. *Batsch.*  
*Fung. Cont.* I. p. 79. f. 77.

In nemorosis graminosis: *bey Malchin vor-  
ne im Hagenholz.* Septembri.

1120. AGARICUS stipitatus, pileo campanula-<sup>campanula-</sup>  
to striato pellucido, lamellis adscenden-<sup>rus</sup>  
tibus, stipite nudo. *Linn. Syst.* 4. p.  
605.

*Bey Malchin auf der Dammwiese* autumnno.

1121. AGARICUS stipitatus, pileo plicato *umbellif-*  
membranaceo, lamellis, basi latioribus.<sup>rus</sup>  
*Linn. Syst.* 4. p. 605.

In sylvis, inter folia congesta, semiputrida.  
Autumno.

1122. AGARICUS stipitatus albus, pileo plica-<sup>androsate-</sup>  
to membranaceo stipite nigro. *Linn. Syst.* <sup>us</sup>  
4. p. 606.

In foliis deiectis Piri. Autumno.

1123. AGARICUS stipitatus, pileo luteo con-<sup>clavus</sup>  
vexo striato, lamellis stipiteque albis.  
*Linn. Syst.* 4. p. 606.

*Im Hagenholze bey Malchin* inter folia dici-  
dua, Autumno.

\*\* Pa-

\*\* *Parasitici, acaules, dimidiati.*

- quarcinus* 1124. AGARICUS acaulis lamellis labyrinthi-  
formibus. *Linn. Syst. 4. p. 607.*  
In lignis putrescentibus persistens.
- alnus* 1125. AGARICUS acaulis, lamellis bifidis pul-  
verulentis. *Linn. Syst. 4. p. 607.*  
In alnis, rarior; persistens.
- lateralis* 1125. AGARICUS substipitatus, pileo albido  
laevi, lamellis subsimplicibus pallidis sti-  
pitate laterali. *Hudson anglic. p. 624.*  
Ad arborum truncos emortuos frequens. Au-  
tumno, Vere.
- squarrosus* 1126. AGARICUS. *Schöffler t. 30. conf. Tab.*  
232.
- applicatus* 1127. AGARICUS dimidiatus vel potius acau-  
lis orbicularis saturate cinereus, nigre-  
scens horizontalis, postica dorsali parte ver-  
ticaliter adnatus, laminis ab omni margi-  
ne versus centrum impresso-adnatum ten-  
dentibus. *Batsch Cont. I. n. 125. t. 24.*  
f. 125.  
In lignis spongiosis. Autumno.
- squamosus* 1128. AGARICUS laciniatus superne albus et  
villosus, inferne lamellis subrubentibus.  
*Michel N. P. G. p. 123. n. 14. t. 65. f. 4.*  
Ad truncos quercuum: *bey Malchin im Hayen-  
holze.* Autumno.
- cecropifolius* 1129. AGARICUS fordide luteus cochlearis  
seu spatulae forma glabrus. *Michel N. P.*  
*G. p. 123. n. 19. t. 65. f. 6.*

Ad

Ad truncos cavos fagorum: *im Hayenholze bey Malchin.* Autumno.

BOLETUS. L. G. 1326.

*Pileus* subtus porosus.

\* *Parasitici acaules.*

1130. BOLETUS acaulis pulvinatus albus, lae-*suberosus* vis, poris acutis difformibus. *Linn. Syst.* 4. p. 608.

In caudicibus betularum: *im kahldischen Holze hinter der Ziegeley*; persistens.

1131. BOLETUS acaulis pulvinatus inaequalis *fomentarius* obtusus, poris teretibus aequalibus glaucis. *Linn. Syst.* 4. p. 608.

Ad caudices Pini sylvestris: *bey Malchin im Hayenholze* persistens.

1132. BOLETUS acaulis pulvinatus, laevis poris, *igniarius* tenuissimis. *Linn. Syst.* 4. p. 608.

In truncis Fagorum ubique persistens.

1133. BOLETUS sessilis pileo convexiusculo *laccatus* niceo obtuse lobato, poris angustissimis pallidis.

*Descript.* sessilis nonnunquam in forma cochlearis horizontaliter longe stipitatus, stipite concolore. Pileus 2 - 6. unicas in diametro latus saepe fasciis semicircularibus figuratus. Substantia sicca coriacea dura.

Ad

Ad truncos alnorum et betularum emortuos:  
*bey Malchin am Pfort, auch im Mönchbruch.*  
 Autumno; persistens.

*baghffum* 1134. BOLETUS acaulis utrinque granulato-  
 papillofus, papillis poroliferis, superne  
 convexusculus carneus, inferne subalbi-  
 dus, substantia fibroso-gelatinosa. *Retz*  
*prodrom: flor. scand. 2. p. 250. n. 7576.*  
 Eiusdem observat. fasc. I. p. 33. n. 118.  
 Bolet; hepaticus. *Pollich Histor. Palat. t. 3.*  
 pag. 300. n. 1178.

Polyporus sessilis sanguineus, crassus, mol-  
 lis, obscure lobatus. *Hau Histor. III. p.*  
 147. n. 2315.

Ad truncis putridis Quercuum: *Im Gehölze*  
*bey der cummerow'schen Meyerey, semel*  
*lectus. Augusto.*

*squamosus*

1135. BOLETUS deformis, lateralis dilatatus,  
 carneo-fuberosus, subpetiolatus, ochra-  
 ceus, tergo glabro subunctuoso fusces-  
 cente, maculis obscuris, saepe revolutis,  
 squamoso; tubis latis brevibus, margine  
 acutis pallidioribus. *Batsch Elench. fungor.*  
 p. 97. n. 3. fig. 41.

Ad truncos putridos falicum: *bey Malchin*  
*vor dem Steinthor bey der Wäsche. Au-*  
*tumno; persistens.*

*versicolor* 1136. BOLETUS fasciis discoloribus, poris al-  
 bis. *Linn. Syst. 4. p. 609.*

In arborum truncis copiose; persistens.

1137.

1137. *BOLETUS* acaulis superne laevis *falici-suaveolens* nus. *Linn. Syst.* 4. p. 609. *Erslin.*

*Diff. de Boletis suaveolent: Erlang. 1784.*  
cum tabul. {(figur. optima.)}

Ad truncos falicum ubique autumnno.

1138. *BOLETUS* crustaceus albus effusus, *medulla* difformis. *Murr. Syst. ed.* 14. p. 977. *panis*

Ad arborum truncos passim; persistens.

**\*\* Stipitati.**

1139. *BOLETUS* pileo convexo vel undato *durus* suboliquo peltato, fusco, stipite brevi valido, cylindrico, poris punctiformibus ochraceo-albis. *Batsch Elench fung.* p. 103. n. 12. et *Cont. I. pag.* 187. No. 129. t. 24. f. 129. sub triviali *perennis.*

Ad truncos falicum: rarius. Autumnno,

1140. *BOLETUS* stipitatus perennis, pileo *perennis* utrimque planiusculo. *Linn. Syst.* 4. p. 609.

Ad scrobes, in radicibus arborum: *im kahl-dischen Holze* frequens; persistens.

1141. *BOLETUS* stipitatus, pileo pulvinato sub-luteus viscido, poris rotundatis convexis flavissimis, stipitate albido. *Linn. Syst.* 4. p. 610.

In sylvis: *im Hayenholze bey Malchin* et alibi passim. Augusto.

1142. *BOLETUS* pileo glabro-pulvinato mar-*bovinus* ginato; poris compositis acutis, porulis angu-

angulatis brevioribus. *Linn. Syst. 4.*  
p. 610.

*Im Hayenholze bey Malchin et alibi non infrequens. Autumno.*

HYDNUM. L. G. 1327

*Pileus subtus fibris subulatis echinatus.*

*imbricatum* 1143. HYDNUM stipitatum, pileo convexo imbricato. *Linn. Syst. 4. p. 612.*

*In sylvis: an der Tannenhaide nach Schweinkendorff, fast an der Feldscheide. Septembri.*

*repandum* 1144. HYDNUM stipitatum, pileo convexo laevi flexuoso. *Linn. Syst. 4. p. 612.*

*Bey Malchin im Hayenholze passim. Septembri.*

*auriscalpium* 1145. HYDNUM stipitatum, pileo dimidiato. *Linn. Syst. 4. p. 613.*

*In sylvis, in strobulis putridis Pini: in den Tannen bey Witzerhoff; persistens.*

*gelatinosum* 1146. HYDNUM stipitatum, gelatinosum pileo dimidiato supra glaberrimo. *Linn. Syst. Edit. 14. pag. 978.*

*Echinus crystallinus gelatinosus. Haller Hist. n. 2319.*

*Hydnum crystallinum. Flor. Danic. tab. 717.*

*In truncis putridis Pini sylvestris: in den Tannen bey Witzerhoff. Octobri rarius.*

1147.

1147. *HYDNUM* acaule, arcuato - rugosum, *parasiticum*  
tomentosum. *Linn. Syst.* 4. p. 613.

In lignis putridis ubique; persistens.

*CLAVARIA*. L. G. 1332.

Fungus oblongus, similis.

\* *Indivisa*.

1148. *CLAVARIA* clavæ - formis simpliciss. *pistillaris*  
ma. *Linn. Syst.* 4. p. 620.

In sylvaticis; im *Gehölze bey Pfide*. Octobri.

1149. *CLAVARIA* clavata integerrima com-*opbioglof-*  
pressa obtusa. *Linn. Syst.* 4. p. 620. *seides*

In sylvis: *bey Malchin im Hayenholze bey dem*  
*Sandgraben auch nahe vor Seedorff*. Au-  
tumno.

\*\* *Ramosa*.

1150. *CLAVARIA* corpore pyramidato simpli-*pyrami-*  
cissimo, lanato ferrugineo. *dalis*

*Puccinia simplex*. *Willdenow* no. 1186.

*Puccinia non ramosa maior pyramidata*  
*Michx.* gen. 213. 92. f. 1.

In juniperetis: *bey Malchin im Hayenholze*.  
Martio.

1151. *CLAVARIA* ramosa cornuta compressa. *Hypoxylon*  
*Linn. Syst.* 4. pag. 621. *Weigel observ.*  
*botanic.* 50 tab. 3. fig. 5.

In truncis arborum caesorum. Autumno.

1152. *CLAVARIA* ramis confertis ramosissimis *coralloides*  
inaequalibus. *Linn. Syst.* 4. p. 621.



In sylvaticis copiose. Autumno.

*fastigiata* 1153. CLAVARIA ramis confertis ramosissimis fastigiatis obtusis luteis. *Linn. Syst.* 4. p. 622.

In nemorosis ad sepes: *bey Malchin in den Peengärten* rarius. Autumno.

*muscoïdes* 1154. CLAVARIA ramis ramosis acuminatis inaequalibus luteis. *Linn. Syst.* 4. p. 622.  
In sylvis inter muscos; *bey Malchin im Hayenholze bey den Sandgruben.* Autumno.

*Puccinia* 1155. CLAVARIA ramosa, ramis brevibus paucis divaricatis subbifidis. *Batsch Elench.* p. 139. Icon, 49.

*Puccinia* ramosa bifurcata omnium minima, candidissima, pruinam referens. *Michel.* gen, pag. 213. t. 92. fig. 2.

In lignis putridis deiectis: *in der Bentz am Wege nach Dempzin.* Autumno.

*cornea* 1156. CLAVARIA subdivisa gelatinosa cornea fuscescens.

*Clavaria cornea.* *Batsch Cont. I.* pagin. 229. n. 161. fig. 161.

In lignis putridis. Martio.

LYCOPERDON. L. G. 1333.

Fungus subglobosus seminibus farinaceis impalpabilibus (filamentis intertextis) repletus.

\* *Pul.*

\* *Pulverulenta, radicata supra terram.*

1157. LYCOPERDON subrotundum lacerato *Bevisse*  
dehilscens, *Linn. Syst. 4. p. 623.*

In sylvis, campis, ad aedificia cum multis  
varietatibus et saepe in magnitudine capi-  
tis humani. Autumno.

1158. LYCOPERDON stipitatum, subglobosum, *gemmatum*  
utrinque depressum, pyramidibus validis  
distantibus muricatum, stipite subelonga-  
to valido incrassato, etiam muricato di-  
stincto lineari. *Batsch Elench. fung. 147.*  
n, 14. *Michel gener. t. 97. fig. 1.*

*Im kahldischen Holze. Autumno.*

\*\* *Parasitica.*

1159. LYCOPERDON parasiticum apice postula, *cancellatum*  
lateribus fissa. *Linn. Syst. 4. p. 625.*

In foliis Pyri ubique. Autumno.

1160. LYCOPERDON volva multifida, fructu *Carpobolus*  
globoso ex seminibus combinatis. *Linn.*  
*Syst. 4. p. 624.*

*Carpobolus. Michel gen. 221. n. 1. t. 101.*  
*fig. 1.*

In lignis putridis: *an der basedowschen Tan-*  
*nenheide* passim. Autumno.

1161. LYCOPERDON cortice farinaque purpu- *Epiden-*  
rea. *Linn. Syst. 4. p. 626.* *drum*

In foliis Pini deiectis.

*In den Tannen bey Witzzerhoff* rarius. Au-  
tumno.

*epiphyllum* 1162. LYCOPERDON aggregatum parasiticum  
ore multifido lacero: pulvere fulvo.  
*Linna. Syst.* 4. p. 627.

In dorso foliorum Tussilaginis. Autumnus.

*vesparium* 1163. LYCOPERDON gregarium, cellis dense  
connatis scariosis, membranaceis croceo  
fulvellis, semen bombycinum saturata  
croceum continentibus. *Batsch fung.*  
*Cont. I.* 253. n. 172. t. 30. f. 72.

α. Cellulis sessilibus.

β. Cellulis elongatis.

In arborum truncis putridis: an der base-  
dowfschen Tannenheide. Aestate.

*favogi-  
neum*

1164. LYCOPERDON gregarium, globulis den-  
se approximatis vesicularibus, semen bom-  
bacinum luteum recondentibus, *Batsch.*  
*fung. Cont. I.* 257. n. 173. tab. 30. fig. 173.

In truncis putridis. Autumnus.

*ferrugine-  
sum*

1165. LYCOPERDON sessile gregarium utricu-  
lis dense adnatis, glabris vesicularibus,  
semen fusco-fulvens coloris ferrei con-  
tinentibus. *Batsch Cont. I.* p. 175. tab. 30.  
figur. 175. sub nomine Stemonitis.

In lignis emortuis: in der gilowfschen Bentz.  
Augusto.

*muricatum*

1166. LYCOPERDON sessile globoso-pyrifor-  
me depressum, totum pyramidibus vali-  
dis acutioribus polyedris subdistantibus  
muricatum. *Batsch Elench.* p. 145. n. 4.

In

In sylvis graminosis: *bey Malthin im Hayenholze. Autumno.*

1167. LYCOPERDON subterraneum ovato-ob-<sup>aprunum</sup>longum, glabrum, basi et radice carens.  
*Gled. Meth. fung. p. 156. VII. d.*

Tubera subterranea, testiculorum forma.  
*Menz. pug. rar. t. 6. Icon satis bona.*  
*Germ. falsche Hirschbrunst, falsche Trüffel.*

*In der Tannenheide nach neuen Basedow. Mea*  
specimina immatura legi medio Augu-  
sti; rarius.

#### SPHAERIA.

*Substantia variae figurae, subfungosa. Fru-*  
*ctificatio, sphaerica, massa pulverulenta (abs-*  
*que filamentis) repleta. Weber Spicileg.*  
*pag. 281.*

#### \* *Simplices.*

1168. SPHAERIA simplex solitaria minima *byssacea*  
atra, crusta nivea pulverulenta. *Weigel*  
*observat. botanic. p. 42.*

*In corticibus Quercuum passim; persistens.*

1169. SPHAERIA simplex subsolitaria, suboc-<sup>nirida</sup>  
cultata splendens atra, crusta spathacea  
rimosa. *Weigel observat. botanic. p. 45.*

*In corticibus fagorum: infrequens, persistens.*

1170. SPHAERIA gregaria globata, clausa, ni-<sup>globularis</sup>  
gra; nitoris expers indurata. *Batsch.*  
*Elench. Cont. I. pag. 271. no. 180.*

In lignis deiectis putrescentibus. Vere et Autumno.

\*\* *Compositae f. sphaerulis pluribus in uno corpore.*

*fragasformis* 1171. SPHAERIA composita convexa obscuro rubra. *Hoffm. Vegetabil. cryptog. p. 20. t. 5. f. 1.*

*Sphaeria rubra fragi similis. Hall. Histor. 2190. t. 97. f. 10.*

Supra truncos Fagorum et in virgultis aridis. Aestate.

*tremelloides* 1172. SPHAERIA composita, solitaria, subpedunculata, subglobosa, purpurea, subgelatinosa. *Weigel observat. botanic. p. 46.*

*Tremella purpurea. Linn. Syst. 4. Sp. 564.*

In corticibus arborum, sepium emortuarum ubique. Hyeme et Vere.

*lycoperdoides* 1173. SPHAERIA composita convexa subsolitaria, medulla farinosa atra. *Weigel observationes botanicae p. 47.*

*Lycoperdon variolosum* parasiticum sessile subrotundatum, cortice exteriori fulvo deciduo farina atra compacta. *Linn. Syst. 4. p. 564.*

α. *bicorticata* Cortice fulvo friabili aucta.

β Variolosa, cortice dicto destituta, atra tuberculosa, carne atra.

γ. Lac.

γ. *Laevigata*, cortice dicto destituta, atra complanata, carne alba.

In ramulis arborum fruticumque emortuis copiose. Autumno et Vere.

1174. *SPHAERIA* composita corticalis nigra *stigma* punctata. *Hoffm. Vegetabilia cryptogamic.* p. 7. tab. 2. figur. 2.

In ramulis emortuis. Autumno.

1175. *SPHAERIA* composita atra, spiculis mi- *Carpini* nutissimis terminata. *Hoffm. Vegetab. cryptogam.* p. 1. tab. 1. fig. 1.

*Sphaeria spiculosa. Batsh. Elench. fungor.* 274. tab, 30. f. 187.

In foliis *Carpini*. Hyeme.

1176. *SPHAERIA* composita convexa reniformis *densa* nigra. *Hoffm. Vegetab. cryptog.* p. 3. t. 1. f. 2.

*Sphaeria maxima. Weber Spicileg.* 286.

In sylvis ad truncos emortuos *Fagorum: bey Malchin im Hayenholze* passim. Autumno et Vere.

1177. *SPHAERIA* sessilis grisea subrotunda, gibba. *tuberosa* Valsa tuberosa, *Scopoli Carn. Edit.* 2. pag. 399. ?

Magnitudo nucis avellanae.

In cortice *fagorum*. Autumno.

1178. *SPHAERIA* petiolata nigra incrassata. *clavata* *Hoffm. Vegetab. cryptog.* p. 17. t. 4. fig. 2.

β. *Sphaeria (Carchariae)* obtusa stipite brevi. *Weigel observ. botanic.* tab. 3. fig. 6.

In ligno putrido Quercuum deiecto, in cellis et hortis. Autumno

## PEZIZA.

Fungus campanulatus, recondens corpuscula lentiformia.

*lentifera* 1179. PEZIZA campanulata, lentifera. *Linn.*

*Syst.* 4. p. 616.

Cyathoides cyathiforme cinereum et veluti sericeum. *Mich. gen.* 222. t. 102. fig. 1.

In areis hortorum et lignis putrescentibus. Autumno.

*friata* 1180. PEZIZA campanulata lentifera villosa interne striata. *Hudson anglic. edit.* 2. p. 634.

Cyathus hirsutus intus striatus. *Hall. helvet.* n. 2214. *Flor. Danic.* tab. 469. f. 1.

Ad arborum truncos putrescentes. Autumno.

*pyxis* 1181. PEZIZA conico-cylindrica, integra, glabra, sulphurea vel ochracea. *Batsch.*

*Elench. fung.* p. 129. n. 33.

Cyathoides luteum crucibuliforme. *Mich.*

*Gen. pagin.* 222. tab. 102. f. 3.

In lignis putridis, rarius. Autumno.

## HELVELLA. L. G. 1330.

Fungus difformis plicatus.

*laciniosa* 1182. HELVELLA *Scop. Carn. ed.* 2. p. 1610.

In pinetis ad terram: bey *Witzerhoff*; persistens. Substantia dura fusca coronidis instar varie lacinata.

1183.

1183. *HELVELLA* acaulis. *Linn. Syst. 4. pinet*  
p. 616.

Ad asseres in sudetis passim; persistens.

1184. *HELVELLA* explanata, laevis, sordide glabra  
albida. *Thaëlaephora glabra. Willdenow*  
*Prodr. n. 1154.*

In lignis putridis. Autumno; persistens.

*MUCOR. L. G. 1334.*

*Fungus vesiculis stipitatis.*

\* *Perennes.*

1185. *MUCOR* perennis, stipite filiformi ni- *sphaeroco-*  
gro, capitulo globoso cinereo. *Linn. pbalus*  
*Syst. 4. p. 627.*

In parietibus, lignis emortuis passim.

1186. *MUCOR.* perennis stipite subulato ni- *lichenoides*  
gro capitulo lenticulari cinereo. *Linn.*  
*Syst. 4. p. 627.*

In parietibus hortorum ubique, persistens.

1187. *MUCOR* seta nigra, villo fusco. *Linn. embolus*  
*Syst. 4. p. 627.*

In lignis putridis deiectis. Septembri.

1188. *MUCOR* perennis viridis foliis furfura- *furfura-*  
ceis, stipite filiformi, capitulo globoso. *ecus*  
*Linn. Syst. 4. p. 628.*

Ad terram nudam: *an dem Berge bey Go-*  
*schendorff* rarius in lignis, putridis frequens.

\*\* *Fugaces.*

1189. *MUCOR* stipitatus capsula globosa. *Linn. mucedo*  
*Syst. 4. p. 628.*



In variis putridis, pane, plantis et cet.

*glaucus* 1190. *MUCOR stipitatus*, capitulo subrotundo aggregato. *Linn. Syst.* 4. p. 629.

In Citris, Pomis etc.

*crustaceus* 1191. *MUCOR stipitatus*, spicis digitatis. *Linn. Syst.* 4. p. 629.

*cespitosus* 1192. *MUCOR stipite* ramoso, spicis ternatis. *Linn. Syst.* 4. p. 629.

In variis putrescentibus.

*erysiphe* 1193. *MUCOR albus*, capitulis fuscis sessilibus. *Linn. Syst.* 4. p. 629.

In foliis Humuli. Lamii etc.

*septicus* 1194. *MUCOR unctuosus flavus*:

In lignis putrescentibus. Post unum alterumve diem in pulverem fuscum, filamentis interstinctum fatiscit,

## A P P E N D I X.

*Ad Scripus lacustris*  $\beta$ . *Linn. Syst.* 1. p. 133.

*Juncus palustris humilior*. *Scheuchzer Gramin.* pag. 356.

In pratis humidis: *in den alten Torfgruben bey Malcbin.* Julio.

*rapunculoides* 1195. *CAMPANULA* foliis cordato-lanceolatis, caule ramoso, floribus secundis, sparsis

sis calycibus reflexis. *Linn. Syst. 1.*  
p. 458.

In nemorosis: *bey Malchin im Hayenholze*.  
Julio. Augusto.

PARIS. L. G. 542.

*Cal. 4. phyllus. Pet. 4. angustiora. Bacca. 4.*  
locularis.

1196. PARIS foliis quaternis. *Linn. Syst. 2. quadrifolia*  
p. 221.

In nemoribus umbrosis humidis: *bey Mal-*  
*chin im Ellerbruch am Kätelberge* rarius.  
Majo.

1197. VICIA pedunculis multifloris, foliolis *sylvatica*  
ovalibus, stipulis denticulatis. *Linn.*  
*Syst. 3. p. 470.*

In sylvis: *bey Malchin im Hayenholze*.  
Julio.

1198. MEDICAGO caule diffuso, stipulis inte- *minima*  
gris, leguminibus ternatis cochleatis: acu-  
leis uncinatis.

*Medicago polymorpha* Variet. *λ.* *Linn.*  
*Syst. 3. p. 578.*

In agris siccis: *bey Gofchendorff am Wege*  
*nach Gölitz.* Majo. Junio. Procul du-  
bio species distincta.

1199.

*gibba*

1199. LEMNA foliis fessilibus subtus hemi-  
phaericis, radicibus solitariis. *Linn. Syst.*  
4. p. 93.

In aquis stagnantibus cum *L. min.* ubique.  
Junio. Julio.

*intricatum*

1200. HYPNUM furculis repentibus, ramis  
brevibus foliis laxis lanceolatis acumina-  
tis, capsulis obliquis cernuis, mucrone  
obliquo. *Schreb. Spicil.* p. 99.

In nemorosis sylvaticis: im *Hayenholze bey*  
*Malchin im hohlen Wege.*

p. 261. *lin. ultima* n. 205. *adde* t. 27. f. 142.

p. 262. *lin.* 4. post p. 195. *adde* t. 26.

p. 267. *lin.* 8. post p. 19. *adde* t. 16.

INDEX.

# I N D E X.

<b>A</b> cer <i>campestre</i>	268	Agaricus <i>squamosus</i>	1128
<i>pladanoides</i>	269	<i>squarrosus</i>	1107 1126
<i>Pseudoplatanus</i>	270	<i>umbelliferus</i>	1121
Achillea <i>Millefolium</i>	583	<i>violaceus</i>	1112
<i>Ptarmica</i>	582	Agrimonia <i>Eupatoria</i>	321
Acorus <i>Calamus</i>	224	Agrostemma <i>Gisbago</i>	314
Actaea <i>spicata</i>	100	Agrostis <i>arundinacea</i>	623
Adoxa <i>Meschazellina</i>	264	<i>capillaris</i>	625
Aegopodium <i>Podagraria</i>	191	<i>spica venti</i>	622
Aerhusa <i>Cynapium</i>	185	<i>stolonifera</i>	624
Agaricus <i>alliaceus</i>	1116	Aira <i>aquatica</i>	626
<i>alveus</i>	1125	<i>canescens</i>	629
<i>androsaceus</i>	1122	<i>caryophyllea</i>	631
<i>applicatus</i>	1127	<i>cespitosa</i>	627
<i>campanulatus</i>	1120	<i>flexuosa</i>	628
<i>camp-<sup>stris</sup></i>	1110	<i>praecox</i>	630
<i>canarellus</i>	1104	Aiuga <i>pyramidalis</i>	397
<i>cespitosus</i>	1129	Alchemilla <i>vulgaris</i>	92
<i>cinnamomeus</i>	1113	Alisma <i>natans</i>	247
<i>clavus</i>	1123	<i>Plantago Δtica</i>	246
<i>clypeatus</i>	1117	Allium <i>carinatum</i>	214
<i>dentatus</i>	1106	<i>Scorodoprasum</i>	213
<i>fascicularis</i>	1114	<i>vineale</i>	215
<i>fimetarius</i>	1118	Alopecurus <i>geniculatus</i>	620
<i>Georgii</i>	1111	Alfina <i>media</i>	198
<i>integer</i>	1115	Amaranthus <i>Blitum</i>	72
<i>lactifluus</i>	1108	Anagallis <i>arvensis</i>	120
<i>lateralis</i>	1125	Anchusa <i>officinalis</i>	118
<i>muscarius</i>	1105	Andromeda <i>polyfolia</i>	181
<i>narcoticus</i>	1119	Anemone <i>Hepatica</i>	364
<i>piperatus</i>	1109	<i>nemorosa</i>	366
<i>quercinus</i>	1124	<i>pratensis</i>	365
		<i>ranunculoides</i>	367
		Angelica <i>archangelica</i>	183
		Ange-	

# INDEX.

<i>Angelica sylvestris</i>	184	<b>B</b> <i>Ballota nigra</i>	408
<i>Anthemis Corula</i>	580	<i>Barbula convoluta</i>	795
<i>tinctoria</i>	581	<i>muralis</i>	794
<i>Anthericum Liliago</i>	220	<i>ruralis</i>	793
<i>Anthoceros lacvis</i>	885	<i>unguiculata</i>	796
<i>punctatus</i>	884	<i>Bellis perennis</i>	558
<i>Anthoxanthum odorat.</i>	597	<i>Berberis vulgaris</i>	212
<i>Anthyllis Vulnaria</i>	477	<i>Betonica officinalis</i>	398
<i>Antirrhinum Linaria</i>	425	<i>Betula alba</i>	105
<i>minus</i>	426	<i>Alnus</i>	106
<i>Aphanes arvensis</i>	I	<i>Bidens cernua</i>	549
<i>Apium graveolens</i>	192	<i>minima</i>	548
<i>Aquilegia vulgaris</i>	360	<i>tripartita</i>	547
<i>Arabis thaliana</i>	444	<i>Blasia pusilla</i>	886
<i>Arctium lappa</i>	537	<i>Boletus bovinus</i>	1142
<i>Arenaria peploides</i>	296	<i>buglossum</i>	1134
<i>rubra</i>	295	<i>durus</i>	1139
<i>serpyllifolia</i>	294	<i>fomentarius</i>	1131
<i>trincervia</i>	293	<i>igniarius</i>	1132
<i>Aristolochia Clematidis</i>	248	<i>laccatus</i>	1133
<i>Arnica montana</i>	565	<i>luscus</i>	1141
<i>Artemisia Absinthium</i>	551	<i>medulla panis</i>	1138
<i>campestris</i>	550	<i>perennis</i>	1140
<i>vulgaris</i>	552	<i>squamosus</i>	1135
<i>Arum maculatum</i>	381	<i>suberosus</i>	1130
<i>Arundo arenaria</i>	663	<i>suaveolens</i>	1137
<i>calamagrostis</i>	662	<i>versicolor</i>	1136
<i>epigeios</i>	661	<i>Borrage officinalis</i>	114
<i>phragmites</i>	660	<i>Brassica campestris</i>	443
<i>Asparagus officinalis</i>	223	<i>Briza media</i>	644
<i>Asperugo procumbens</i>	116	<i>Bromus arvensis</i>	653
<i>Asperula odorata</i>	89	<i>giganteus</i>	655
<i>Asplenium trichomanoid.</i>	715	<i>mollis</i>	651
<i>Aster Tripolium</i>	579	<i>pinnatus</i>	656
<i>Astragalus Cicer</i>	488	<i>secalinus</i>	650
<i>glycyphyllos</i>	489	<i>sterilis</i>	652
<i>Athamantia Oreoselin.</i>	148	<i>sectorum</i>	654
<i>Atriplex hastata</i>	210	<i>Bryonia alba</i>	596
<i>parula</i>	211	<i>Bryum androgynum</i>	837
<i>Avena elavio</i>	657	<i>argenteum</i>	838
<i>farua</i>	658		
<i>strigosa</i>	659		

Bry-

# INDEX.

<i>Bryum bimum</i>	841	<i>Carex arenaria</i>	674
<i>carneum</i>	839	<i>cespitosa</i>	688
<i>squarrosum</i>	840	<i>digitata</i>	682
<i>Bupleur. rotundi folium</i>	179	<i>distans</i>	689
<i>Bunias Cak le</i>	271	<i>Drymeia</i>	692
<i>Butomus umbellatus</i>	271	<i>elongata</i>	679
<i>Buxbaumia aphylla</i>	858	<i>flacca</i>	693
<i>foliosa</i>	859	<i>flava</i>	681
<i>Byllus aeruginosa</i>	1081	<i>hirta</i>	694
<i>aurea</i>	1073	<i>leporina</i>	675
<i>barbata</i>	1075	<i>limosa</i>	684
<i>botryoides</i>	1079	<i>montana</i>	683
<i>candellaris</i>	1078	<i>muricata</i>	677
<i>candida</i>	1076	<i>palle/cens</i>	685
<i>flos aquae</i>	1070	<i>panicea</i>	686
<i>fulva</i>	1074	<i>paniculata</i>	680
<i>incana</i>	1080	<i>praecox</i>	673
<i>phosphorea</i>	1071	<i>pseudocyperus</i>	687
<i>rubens</i>	1082	<i>pulicaris</i>	672
<i>septica</i>	1077	<i>remota</i>	678
<i>velutina</i>	1072	<i>vesicaria</i>	691
		<i>vulpina</i>	676
<b>C</b> <i>Calendula officinalis</i>	590	<i>Carlina vulgaris</i>	535
<i>Calitriche verna</i>	8	<i>Carpinus betulus</i>	391
<i>Calla palustris</i>	380	<i>Centaurea Cyanus</i>	584
<i>Caltha palustris</i>	363	<i>Facea</i>	587
<i>Campanula glomerata</i>	140	<i>paniculata</i>	585
<i>persicifolia</i>	138	<i>Scabiosa</i>	586
<i>rapunculoides</i>	1195	<i>Centunculus minimus</i>	77
<i>rotundifolia</i>	137	<i>Cerastium aquaticum</i>	313
<i>Trachelium</i>	139	<i>arvense</i>	312
<i>Cannabis sativa</i>	208	<i>semidecandrum</i>	311
<i>Cardaminè amara</i>	450	<i>vulgare</i>	310
<i>pratensis</i>	449	<i>Ceratophyl. demersum</i>	486
<i>Carduus acaulis</i>	542	<i>Chaerophyl. bulbosum</i>	187
<i>crispus</i>	540	<i>sylvestre</i>	186
<i>lanceolatus</i>	538	<i>scnulensum</i>	p. 50.
<i>marianus</i>	541	<i>Chara flexilis</i>	6
<i>nucans</i>	539	<i>bispida</i>	5
<i>Carex acuta</i>	690	<i>vulgaris</i>	4
		<i>Chelidonium majus</i>	353
		<i>Chenopodium album</i>	160

Cheno-

# INDEX.

<i>Chenop. bonus Henric.</i>	157	<i>Conferva rivularis</i>	1063
<i>glaucum</i>	163	<i>Conium maculatum</i>	177
<i>hybridum</i>	164	<i>Convallaria bifolia</i>	219
<i>marisimum</i>	166	<i>maialis</i>	216
<i>murale</i>	159	<i>multiflora</i>	218
<i>polypermum</i>	165	<i>Polygonatum</i>	217
<i>rubrum</i>	158	<i>Convolvulus arvensis</i>	127
<i>viride</i>	161	<i>sepium</i>	128
<i>vulvaria</i>	164	<i>Coreopsis bidens</i>	588
<i>Chondrilla juncea</i>	521	<i>Cornus sanguinea</i>	91
<i>Chrysanthem. inodorum</i>	563	<i>Corylus Avellana</i>	390
<i>leucanthemum</i>	562	<i>Crataegus Oxiaconsba</i>	330
<i>segetum</i>	564	<i>Crepis biennis</i>	520
<i>Chrysoplen. alternifol.</i>	284	<i>rectorum</i>	519
<i>Cichorium intibus</i>	509	<i>Cucubalus Beben</i>	301
<i>Cicuta virosa</i>	189	<i>Oxites</i>	302
<i>Cineraria palustris</i>	572	<i>Cuscuta europaea</i>	93
<i>Circaea alpina</i>	29	<i>Cynoglossum officinale</i>	117
<i>lutescens</i>	28	<i>Cynosurus cristatus</i>	645
<i>Cistus Helianthemum</i>	355	<i>Cyperus flavesceus</i>	601
<i>Clathrus denudatus</i>	1102	<i>fusus</i>	602
<i>nudus</i>	1103		
<i>Clavaria coralloides</i>	1152	<b>D</b>	
<i>cornea</i>	1156	<i>Dactilis glomerata</i>	638
<i>fastigiata</i>	1153	<i>Datura Stramonium</i>	129
<i>hypoxylon</i>	1151	<i>Daucus Carota</i>	175
<i>muscoides</i>	1154	<i>Delphinium Consolida</i>	359
<i>ophioglossoides</i>	1149	<i>Dentaria bulbifera</i>	447
<i>pistillaris</i>	1148	<i>Dianthus armeria</i>	289
<i>Puccinia</i>	1155	<i>carthusianorum</i>	288
<i>pyramidalis</i>	1150	<i>deltoides</i>	291
<i>Clinopodium vulgare</i>	415	<i>prolifer</i>	290
<i>Cnicus oleraceus</i>	536	<i>superbus</i>	292
<i>Gochlearia Armoracia</i>	435	<i>Dicranum cirrhatum</i>	788
<i>Coronopus</i>	434	<i>flexuosum</i>	789
<i>Comarum palustre</i>	348	<i>glaucum</i>	785
<i>Conferva amphibia</i>	1064	<i>heteromallum</i>	790
<i>bullosa</i>	1065	<i>pellucidum</i>	786
<i>canalicularis</i>	1066	<i>purpureum</i>	787
<i>corallina</i>	1068	<i>scoparium</i>	783
<i>furcata</i>	1067	<i>spurium</i>	784
<i>glomerata</i>	1069		

Di-

# INDEX.

<i>Dicranum varium</i>	791	<i>Fissidens bryoides</i>	779
<i>Dipsacus pilosus</i>	73	<i>pulvinata</i>	778
<i>Ditrichum pusillum</i>	777	<i>sciurioides</i>	782
<i>Draba verna</i>	429	<i>saxifolia</i>	780
<i>Drosera longifolia</i>	204	<i>Fontinalis antipyretica</i>	860
<i>rotundifolia</i>	203	<i>Fragaria vesca</i>	341
<b>E</b> <i>chium vulgare</i>	109	<i>Fraxinus excelsior</i>	61
<i>Elymus arenarius</i>	666	<i>Fucus fastigiatus</i>	1059
<i>Epilobium birsutum</i>	250	<i>filum</i>	1058
<i>montanum</i>	251	<i>rubens</i>	1062
<i>palustre</i>	252	<i>saccharatus</i>	1060
<i>Equisetum arvense</i>	696	<i>sanguineus</i>	1061
<i>hyemale</i>	699	<i>serotenus</i>	1056
<i>limosum</i>	698	<i>vesiculosus</i>	1057
<i>palustre</i>	697	<i>Fumaria bulbosa</i>	472
<i>sylvaticum</i>	695	<i>officinalis</i>	472
<i>Erica vulgaris</i>	256	<b>G</b> <i>alega officinalis</i>	503
<i>Erigeron acris</i>	570	<i>Galeopsis Tetraxis</i>	403
<i>canadensis</i>	569	<i>Galeobdolon</i>	404
<i>Eriophorum polystachion</i>	611	<i>Ladanum</i>	402
<i>vaginatum</i>	610	<i>Gallium Aparine</i>	88
<i>Eryum birsutum</i>	502	<i>Mollugo</i>	86
<i>Eryngium maritimum</i>	169	<i>palustre</i>	83
<i>Erysimum Alliaria</i>	441	<i>sylvaticum</i>	87
<i>barbarea</i>	440	<i>uliginosum</i>	84
<i>cheiranthoides</i>	442	<i>verum</i>	85
<i>officinale</i>	439	<i>Genista germanica</i>	476
<i>Eupatorium cannabinum</i>	546	<i>tinctoria</i>	475
<i>Euphorbia helioscopia</i>	325	<i>Gentiana campestris</i>	154
<i>Peplus</i>	324	<i>Centaureum</i>	153
<i>Euphrasia Odorata</i>	418	<i>Cruciata</i>	155
<i>officinalis</i>	417	<i>Geranium ticusarium</i>	456
<i>Evonymus europaeus</i>	145	<i>columbarium</i>	460
<b>F</b> <i>agus sylvatica</i>	388	<i>dissectum</i>	461
<i>Festuca elatior</i>	648	<i>molle</i>	459
<i>fluitans</i>	649	<i>palustre</i>	457
<i>ovina</i>	646	<i>robertianum</i>	458
<i>rubra</i>	647	<i>rotundifolium</i>	462
<i>Filago germanica</i>	589	<i>Geum rivale</i>	347
<i>Fissidens adiantoides</i>	781	<i>urbanum</i>	346
		<i>Glaux maritima</i>	151
		<b>T</b>	<b>Gla-</b>



# INDEX.

<i>Glecoma bederacea</i>	393	<i>Hypericum perforatum</i>	506
<i>Gnaphalium arenarium</i>	554	<i>montanum</i>	508
<i>dioicum</i>	555	<i>quadrangulum</i>	505
<i>sylvaticum</i>	556	<i>Hypnum abietinum</i>	835
<i>uliginosum</i>	557	<i>aduncum</i>	826
<i>Gratiola officinalis</i>	22	<i>compressum</i>	819
<i>Grimmia apocarpa</i>	729	<i>crista castrensis</i>	834
<i>Gymnostomum Heimii</i>	725	<i>cupressiforme</i>	824
<i>ovatum</i>	724	<i>cuspidatum</i>	815
<i>pyriforme</i>	723	<i>delicatulum</i>	833
<i>truncatum</i>	726	<i>filiforme</i>	817
<b>H</b> <i>edera helix</i>	190	<i>filicinum</i>	830
<i>Hedwigia ciliata</i>	722	<i>fluitans</i>	813
<i>Helvela glabra</i>	1184	<i>Halleri</i>	829
<i>laciniata</i>	1182	<i>illecebrum</i>	818
<i>pineti</i>	1183	<i>intricatum</i>	1200
<i>Heracleum Sphondylium</i>	172	<i>lutescens</i>	821
<i>Herniaria glabra</i>	167	<i>nisens</i>	822. 828
<i>Hesperis inodora</i>	443	<i>lorcum</i>	810
<i>Hieracium auricula</i>	526	<i>parietinum</i>	832
<i>dubium</i>	525	<i>praelongum</i>	836
<i>murorum</i>	527	<i>proliferum</i>	831
<i>paludosum</i>	528	<i>purum</i>	820
<i>Pilosella</i>	524	<i>riparium</i>	814
<i>sabaudum</i>	529	<i>rutabulum</i>	811
<i>umbellatum</i>	530	<i>scorpioides</i>	825
<i>Hippuris vulgaris</i>	3	<i>squarrosus</i>	827
<i>Holcus lanatus</i>	670	<i>stellatum</i>	816
<i>mollis</i>	869	<i>striatum</i>	812
<i>Holosteum umbellatum</i>	67	<i>triquetrum</i>	810
<i>Hottonia palustris</i>	125	<i>velutinum</i>	823
<i>Hordeum murinum</i>	667	<i>Hypochoeris maculata</i>	510
<i>Humulus Lupulus</i>	209	<i>radicata</i>	511
<i>Hydnum auriscalpium</i>	1145	<b>I</b> <i>asione montana</i>	591
<i>gelatinosum</i>	1146	<i>Iberis nudicaulis</i>	432
<i>imbricatum</i>	1143	<i>Ilex Aquifolium</i>	94
<i>parasiticum</i>	1147	<i>Impatiens noli tangere</i>	595
<i>repandum</i>	1144	<i>Inula dysenterica</i>	567
<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	170	<i>Helenium</i>	566
<i>Hyoſcyamus niger</i>	130	<i>pulicaris</i>	568
<i>Hyoſeris minima</i>	534	<i>Iris Pseudacorus</i>	16
<i>Hypericum bumifusum</i>	507		

Iun

# INDEX.

<i>Tuncus articulatus</i>	228	<i>Ledum palustre</i>	280
<i>busoninus</i>	230	<i>Leerfia lanceolata</i>	731
<i>bulbosus</i>	229	<i>vulgaris</i>	730
<i>campestris</i>	234	<i>Lemna gibba</i>	1199
<i>capitatus</i>	232	<i>minor</i>	48
<i>conglomeratus</i>	225	<i>polyrhiza</i>	49
<i>effusus</i>	226	<i>trifolca</i>	47
<i>pilosus</i>	233	<i>Leontodon autumnale</i>	516
<i>squarrosus</i>	227	<i>bispidum</i>	517
<i>senageia</i>	231	<i>Taraxacum</i>	515
<i>lungerman. asplenoid.</i>	863	<i>Leonurus Cardiac</i>	392
<i>bicuspidata</i>	866	<i>Leskea attenuata</i>	806
<i>bidentata</i>	864	<i>complanata</i>	804
<i>ciliaris</i>	873	<i>denticulata</i>	803
<i>complanata</i>	868	<i>polyantha</i>	807
<i>dilatata</i>	869	<i>trichomanoides</i>	805
<i>epiphylla</i>	876	<i>vivipara</i>	808
<i>furcata</i>	880	<i>Lichen atuleatus</i>	1033
<i>globulifera</i>	865	<i>apthosus</i>	1021
<i>multifida</i>	878	<i>atro - albus</i>	894
<i>palmata</i>	879	<i>baeomices</i>	897
<i>pinguis</i>	877	<i>barbatus</i>	1035
<i>platiphylla</i>	872	<i>byssoides</i>	891
<i>pufilla</i>	881	<i>calicaris</i>	1013
<i>repsans</i>	867	<i>candelaris</i>	898
<i>samariscifolia</i>	870	<i>caninus</i>	1022
<i>comentella</i>	875	<i>taperatus</i>	1018
<i>trichomanis</i>	871	<i>carpineus</i>	896
<i>trichophylla</i>	874	<i>chalieiformis</i>	1037
<i>Juniperus communis</i>	469	<i>ciliaris</i>	1008
		<i>cocciferus</i>	1035
		<i>cornutus</i>	1019
		<i>crispus</i>	1003
		<i>digitatus</i>	1028
		<i>fagineus</i>	895
		<i>farinaceus</i>	1012
		<i>fimbriatus</i>	1027
		<i>floridus</i>	1041
		<i>fraxineus</i>	1014
		<i>furfuraceus</i>	1011
		<i>fusco - ater</i>	893
		<i>glaucus</i>	119
		<b>T a</b>	<b>Lichen</b>
<b>Koelreut. hygrometr</b>	<b>853</b>		
<b>Lactuca Scariola</b>	<b>523</b>		
<b>Lamium album</b>	<b>399</b>		
<i>amplexicaule</i>	401		
<i>purpureum</i>	400		
<b>Laplana communis</b>	<b>533</b>		
<b>Lathyrus pratensis</b>	<b>482</b>		
<i>silvestris</i>	483		

# INDEX.

<i>Lichen hippotrichodes</i>	1039	<i>Lycoperdon Botryta</i>	1157
<i>birtus</i>	1038	<i>cancellarum</i>	1159
<i>bispidus</i>	1009	<i>Carpobolus</i>	1160
<i>horizontalis</i>	1023	<i>Epidendron</i>	1161
<i>iubatus</i>	1036	<i>epiphyllum</i>	1162
<i>iuniperinus</i>	1016	<i>favogineum</i>	1164
<i>olivaceus</i>	1002	<i>ferruginosum</i>	1165
<i>orbicularis</i>	1005	<i>gemmarum</i>	1158
<i>pallidus</i>	899	<i>maricatum</i>	1166
<i>parietinus</i>	1004	<i>vesparium</i>	1163
<i>pascalis</i>	1032	<i>Lycopodium annotinum</i>	704
<i>physodes</i>	1006	<i>clavatum</i>	703
<i>prunstri</i>	1015	<i>complanatum</i>	705
<i>pulmonarius</i>	1010	<i>Selago</i>	706
<i>pustulatus</i>	1025	<i>Lycopus europaeus</i>	27
<i>pyxidatus</i>	1026	<i>Lycopsis arvensis</i>	115
<i>radiciformis</i>	1040	<i>Lythymachia numularia</i>	123
<i>rangiferinus</i>	1030	<i>thyrsiflora</i>	122
<i>sanguinariu</i>	892	<i>vulgaris</i>	121
<i>saxatilis</i>	1001	<i>Lythrum Salicaria</i>	320
<i>scriptus</i>	890		
<i>spinosus</i>	1034	<b>M</b> <i>Alcea</i>	465
<i>stellaris</i>	1007	<i>rotundifolia</i>	463
<i>subularis</i>	1031	<i>sylvestris</i>	464
<i>subfuscus</i>	1000	<i>Marchantia conica</i>	883
<i>tinctorius</i>	1017	<i>polymorpha</i>	882
<i>venosus</i>	1020	<i>Marrubium vulgare</i>	409
<i>Ligustrum vulgare</i>	9	<i>Matricaria Chamomilla</i>	561
<i>Linum catharticum</i>	201	<i>maritima</i>	560
<i>Radiola</i>	202	<i>Parthenium</i>	559
<i>usitatissimum</i>	200	<i>Medicago falcata</i>	500
<i>Lithospermum arvense</i>	112	<i>lupulina</i>	501
<i>officinale</i>	111	<i>minima</i>	1198
<i>Lolium perenne</i>	664	<i>Meesia longifera</i>	861
<i>temulentum</i>	665	<i>uliginosa</i>	862
<i>Lonicera Periclymenum</i>	141	<i>Melampyrum arvense</i>	420
<i>Xylosteum</i>	142	<i>nemorosum</i>	421
<i>Lotus cornicularis</i>	504	<i>sylvaticum</i>	422
<i>Lychnis dioica</i>	317	<i>Melica coerules</i>	634
<i>flos cuculi</i>	315	<i>nusans</i>	632
<i>viscaria</i>	316	<i>uniflora</i>	633
<i>Lycoperdon aprugnum</i>	1167		

Men-

# INDEX.

<i>Mentha aquatica</i>	394
<i>arvensis</i>	395
<i>Menyanthes trifoliata</i>	126
<i>Mercurialis annua</i>	272
<i>Milium effusum</i>	621
<i>Mnium capillare</i>	850
<i>cespititium</i>	851
<i>crudum</i>	844
<i>cuspidatum</i>	848
<i>fontanum</i>	852
<i>hornum</i>	843
<i>ligularum</i>	849
<i>palustre</i>	842
<i>punctatum</i>	847
<i>roscum</i>	845
<i>stellare</i>	846
<i>Monotropa hypopitbyx</i>	274
<i>Montia fontana</i>	66
<i>Mucor cespitosus</i>	1192
<i>crustaceus</i>	1191
<i>erysiphe</i>	1192
<i>embolus</i>	1187
<i>furfuraceus</i>	1188
<i>glaucus</i>	1190
<i>lichenoides</i>	1186
<i>mucedo</i>	1189
<i>septicus</i>	1194
<i>sphaeracephalus</i>	1185
<i>Myagrum paniculatum</i>	431
<i>sativum</i>	430
<i>Myosotis scorpioides</i>	119
<i>Myosurus minimus</i>	206
<i>Myriophyl. spicatum</i>	384
<i>verticillatum</i>	385

<b>N</b> ardus stricta	612
Nepeta Cataria	407
Neckeria crispa	698
<i>curtipendula</i>	801
<i>dendroides</i>	800

Neckeria sericea	802
<i>vivipara</i>	799

<b>O</b> ctospora acetabulum	1085
<i>caliculus</i>	1091
<i>citrina</i>	1094
<i>coccinea</i>	1088
<i>comitalis</i>	1095
<i>cornucopioides</i>	1096
<i>cyathoides</i>	1087
<i>birudo</i>	1090
<i>licoperdoides</i>	1086
<i>misra</i>	1097
<i>menzeliana</i>	1098
<i>pixis</i>	1083
<i>scutellata</i>	1089
<i>sigillatoria</i>	1092
<i>calyciformis</i>	1093
<i>tuberosa</i>	1084
<i>Oenante fistulosa</i>	173
<i>pimpinelloides</i>	174
<i>Ononis arvensis</i>	479
<i>spinosa</i>	478
<i>Onopordum acanthium</i>	543
<i>Ophioglossum vulgatum</i>	700
<i>Ophrys monorchis</i>	40
<i>nidus avis</i>	36
<i>ovata</i>	38
<i>paludosa</i>	39
<i>spiralis</i>	37
<i>Orchis bifolia</i>	30
<i>conopsea</i>	34
<i>latifolia</i>	32
<i>maculata</i>	33
<i>Morio</i>	31
<i>Origanum vulgare</i>	414
<i>Ornithogalum luteum</i>	221
<i>minimum</i>	222
<i>Ornithopus perpusillus</i>	499
<i>Orobancha maior</i>	416
<i>Orobancha tuberosus</i>	481

# INDEX.

<i>Orebus vernus</i>	480	<i>Parris hieracioides</i>	514
<i>Orthotrichum anomalum</i>	734	<i>Pimpinella dissecta</i>	194
<i>crispum</i>	732	<i>Saxifraga</i>	193
<i>striatum</i>	733	<i>Pinguicula vulgaris</i>	24
<i>Osmunda Lunaria</i>	701	<i>Pinus Abies</i>	468
<i>regalis</i>	702	<i>Larix</i>	467
<i>Oxalis Acetosella</i>	318	<i>sylvestris</i>	466
<i>corniculata</i>	319	<i>Plantago coronopifolia</i>	82
<b>P</b>		<i>lanceolata</i>	80
<i>Panicum Crugalli</i>	616	<i>maier</i>	78
<i>glaucum</i>	615	<i>maritima</i>	81
<i>sanguinale</i>	617	<i>media</i>	79
<i>Papaver Argemone</i>	350	<i>Poa angustifolia</i>	638
<i>dubium</i>	352	<i>annua</i>	640
<i>hybridum</i>	349	<i>aquatica</i>	636
<i>rhoeas</i>	351	<i>compressa</i>	641
<i>Parietaria officinalis</i>	107	<i>crispata</i>	643
<i>Paris quadrifolia</i>	1196	<i>nemoralis</i>	642
<i>Parnassia palustris</i>	199	<i>pratensis</i>	639
<i>Pastinaca sativa</i>	190	<i>trivialis</i>	637
<i>Pedicularis palustris</i>	427	<i>Polygala vulgaris</i>	473
<i>sceptrum carolinian.</i>	428	<i>Polygonum amphibium</i>	258
<i>Pepelis Portula</i>	235	<i>aviculare</i>	261
<i>Peziza lentifera</i>	1179	<i>Bistorta</i>	257
<i>pyxis</i>	1181	<i>Convolvulus</i>	262
<i>striata</i>	1180	<i>dumetorum</i>	263
<i>Phalaris arundinacea</i>	614	<i>Hydropiper</i>	259
<i>phleoides</i>	613	<i>Perficaria</i>	260
<i>Phallus conicus</i>	1101	<i>Polypodium callipteris</i>	711
<i>esculentus</i>	1099	<i>cristatum</i>	707
<i>impudicus</i>	1100	<i>Dryopteris</i>	714
<i>Phaseum cuspidatum</i>	719	<i>Filix mas</i>	709
<i>musicum</i>	719 b.	<i>Filix foemina</i>	710
<i>nigrum</i>	717	<i>fragile</i>	713
<i>piliferum</i>	718	<i>molle</i>	708
<i>serratum</i>	720	<i>isoleptervis</i>	712
<i>subarsum</i>	716	<i>vulgare</i>	706
<i>Phellandrium aquaticum</i>	188	<i>Polytrichum aloides</i>	772
<i>Phleum nodosum</i>	619	<i>commune</i>	738
<i>pratense</i>	618	<i>nanum</i>	771
<i>Phytneuma spicatum</i>	136	<i>piliferum</i>	739
		<i>undulatum</i>	773

Poly-

# INDEX.

<b>Polytrichum urnigerum</b>	740	<b>Ranunculus flammula</b>	369
<b>Populus alba</b>	265	<i>lanuginosus</i>	377
<i>nigra</i>	267	<i>lingua</i>	370
<i>tremula</i>	366	<i>repens</i>	375
<b>Potamogeton compressum</b>	99	<i>sceleratus</i>	373
<i>crispus</i>	98	<b>Raphanus Raphanistrum</b>	438
<i>gramineum</i>	101	<b>Reseda lutea</b>	323
<i>lucens</i>	97	<i>Luteola</i>	322
<i>natans</i>	95	<b>Rhamnus europaeus</b>	143
<i>pedinatum</i>	100	<i>Frangula</i>	144
<i>perfoliatum</i>	96	<b>Rhinanthus crista Galli</b>	419
<b>Potentilla Anserina.</b>	342	<b>Ribes Grossularia</b>	148
<i>argentea</i>	343	<i>nigrum</i>	147
<i>repens</i>	345	<i>rubrum</i>	146
<i>verna</i>	344	<i>uva crispa</i>	149
<b>Poterium Sanguisorba</b>	387	<b>Riccia cristallina</b>	887
<b>Prenanthes muralis</b>	522	<i>fluitans</i>	889
<b>Primula veris</b>	124	<i>glauca</i>	888
<b>Prunella vulgaris</b>	413	<b>Rosa canina</b>	336
<b>Prunus avium</b>	327	<b>Rubus caesius</b>	338
<i>infuticia</i>	328	<i>fruticosus</i>	339
<i>spinosa</i>	329	<i>idaeus</i>	337
<b>Pteris aquilina</b>	716	<b>Rumex acetosa</b>	243
<b>Pulmonaria officinalis</b>	110	<i>Acetosella</i>	244
<b>Pyrola minor</b>	276	<i>acutus</i>	241
<i>rotundifolia</i>	275	<i>aquaticus</i>	242
<i>secunda</i>	277	<i>crispus</i>	238
<i>umbellata</i>	278	<i>maritimus.</i>	240
<i>uniflora</i>	279	<i>nemoloparbum</i>	239
<b>Pyrus communis</b>	332		
<i>Malus</i>	333		
<b>Quercus robur</b>	389	<b>Sagina procumbens</b>	102
<b>Ranunculus acris</b>	376	<b>Sagittaria sagittaeifolia</b>	383
<i>aquarilis</i>	379	<b>Salicornia herbacea</b>	2
<i>arvensis</i>	378	<b>Salix acuminata</b>	58
<i>auricomus</i>	372	<i>alba</i>	60
<i>bulbosus</i>	374	<i>aurica</i>	55
<i>Ficaria</i>	371	<i>caprea</i>	57
		<i>fragilis</i>	53
		<i>pentandra</i>	51
		<i>purpurea</i>	54
		<i>resmarinifolia</i>	56

# INDEX.

<i>Salix triandra</i>	50	<i>lanceifolia</i>	46
<i>viminalis</i>	59	<i>lasifolia</i>	43
<i>vitellina</i>	52	<i>longifolia</i>	44
<i>Salfolia Kali</i>	156	<i>Serratula arvensis</i>	545
<i>Sambucus Ebulus</i>	196	<i>retictoria</i>	544
<i>nigra</i>	197	<i>Sherardia arvensis</i>	90
<i>Sanicula europaea</i>	171	<i>Silene nutans</i>	303
<i>Satyrion repens</i>	35	<i>Sinapis arvensis</i>	451
<i>Saxifraga granulata</i>	286	<i>Silfymbrium amphibium</i>	454
<i>Hirculus</i>	285	<i>nquaricum</i>	452
<i>tridactylites</i>	287	<i>Nasturtium</i>	451
<i>Scabiosa arvensis</i>	75	<i>Sophia</i>	455
<i>columbaria</i>	76	<i>lyvestre</i>	453
<i>succisa</i>	74	<i>Sium angustifolium</i>	181
<i>Scheuchzeria palustris</i>	245	<i>latifolium</i>	180
<i>Schoenus compressus</i>	600	<i>Solanum Dulcamara</i>	134
<i>Mariscus</i>	598	<i>nigrum</i>	135
<i>nigriscans</i>	599	<i>Solidago virga aurea</i>	571
<i>Scirpus acicularis</i>	605	<i>Sonchus arvensis</i>	531
<i>bacotbrion</i>	603	<i>oleraceus</i>	532
<i>lacustris</i>	606	<i>Sorbus aucuparia</i>	331
<i>maritimus</i>	608	<i>Sparganium erectum</i>	68
<i>palustris</i>	604	<i>natans</i>	69
<i>seraceus</i>	607	<i>Spartium scoparium</i>	474
<i>sylvaticus</i>	609	<i>Spergula arvensis</i>	308
<i>Scleranthus annuus</i>	282	<i>nodosa</i>	309
<i>perennis</i>	283	<i>Sphagnum palustre</i>	721
<i>Scorzonera humilis</i>	518	<i>Sphaeria byssacea</i>	1168
<i>Scrophularia aquatica</i>	424	<i>carpini</i>	1175
<i>nodosa</i>	423	<i>clavata</i>	1178
<i>Scutellaria galericulata</i>	410	<i>deusta</i>	1176
<i>Sedum acre</i>	306	<i>fragaeformis</i>	1171
<i>reflexum</i>	305	<i>globularis</i>	1170
<i>sexangulare</i>	307	<i>Lycoperdoides</i>	1173
<i>Telephium</i>	304	<i>nitida</i>	1169
<i>Selinum palustre</i>	182	<i>stigma</i>	1174
<i>Senecio Jacobaea</i>	576	<i>trcmelloides</i>	1172
<i>sylvaticus</i>	575	<i>ruberosa</i>	1177
<i>viscosus</i>	574	<i>Splachnum ampullaceum</i>	728
<i>vulgaris</i>	573	<i>Spirea Filipendula</i>	334
<i>Sempervivum rectorum</i>	326	<i>Ulmaria</i>	335
<i>Serapias ensifolia</i>	45	<i>Stachys palustris</i>	406

Sta-

# INDEX.

<i>Stachys recta</i>	407	<i>Trifolium alpestre</i>	494
<i>sylvatica</i>	405	<i>arvense</i>	495
<i>Statice Armeria</i>	205	<i>hybridum</i>	491
<i>Stellaria graminea</i>	298	<i>Mel. officinal.</i>	490
<i>crassifolia</i>	299	<i>montanum</i>	496
<i>belostea</i>	297	<i>pratense</i>	493
<i>uliginosa</i>	300	<i>procumbens</i>	498
<i>Stratiotes aloides</i>	361	<i>repens</i>	492
<i>Swertia perennis</i>	152	<i>Triglochin maritimum</i>	237
<i>Symphytum officinale</i>	113	<i>palustre</i>	236
<b>T</b> <i>Tanacetum vulgare</i>	553	<i>Triticum repens</i>	668
<i>Taxus baccata</i>	470	<i>Trollius europæus</i>	368
<i>Tetraphis pellucida</i>	727	<i>Turritis glabra</i>	446
<i>Tenacrinum Scordium</i>	396	<i>Tussilago Farfara</i>	577
<i>Thalictrum flavum</i>	362	<i>Petasites</i>	578
<i>Thlaspi arvense</i>	436	<i>Typha angustifolia</i>	71
<i>Bursa pastoris</i>	437	<i>latifolia</i>	70
<i>Thymus Acynos</i>	412	<b>U</b> <i>Ulmus campestris</i>	168
<i>Serpyllum</i>	411	<i>Ula compressa</i>	1050
<i>Tilia europæa</i>	356	<i>granulata</i>	1052
<i>Timmia megapolitana</i>	854	<i>intestinalis</i>	1051
<i>Tordylium anthriscus</i>	176	<i>latissima</i>	1053
<i>Tormentilla erecta</i>	340	<i>Linza</i>	1054
<i>Tortula subulata</i>	792	<i>Urtica dioica</i>	104
<i>Tragopogon porrifol.</i>	513	<i>urens</i>	103
<i>pratense</i>	512	<i>Utricularia vulgaris</i>	25
<i>Tremella agaricoides</i>	1042	<b>V</b> <i>Vaccinium Myrtillus</i>	253
<i>arbores</i>	1045	<i>oxicoccus</i>	255
<i>butyracea</i>	1048	<i>uliginosum</i>	254
<i>candida</i>	1047	<i>Valeriana dioica</i>	62
<i>coccinea</i>	1050	<i>locusta</i>	64
<i>juniperina</i>	1043	<i>officinalis</i>	63
<i>Lichenoides</i>	1046	<i>Verbascum nigrum</i>	132
<i>mesenacriiformis</i>	1049	<i>Thapsus</i>	131
<i>Nostoc</i>	1044	<i>Verbena officinalis</i>	26
<i>Trichostomum canescens</i>	775	<i>Veronica agrestis</i>	18
<i>heterostichum</i>	776	<i>Anagallis aquatica</i>	14
<i>ramigerum</i>	774	<i>arvensis</i>	19
<i>Trientalis europæa</i>	356		
<i>Trifolium agrarium</i>	497		



# INDEX.

<b>Veronica</b> <i>Ruscabunga</i>	13	<b>Viola</b> <i>tricolor</i>	594
<i>Chamaedrys</i>	17	<b>Viscum</b> <i>album</i>	108
<i>officinalis</i>	11		
<i>scutellata</i>	15	<b>W</b> <i>ebera nutans</i>	856
<i>serpyllifolia</i>	12	<i>pomiformis</i>	857
<i>spicata</i>	10	<i>pyriformis</i>	855
<i>Teucrium</i>	16	<b>Weisia</b> <i>crispa</i>	736
<i>triphyllos</i>	20	<i>recurvirostra</i>	735
<i>verna</i>	21		
<b>Viburnum</b> <i>Opulus</i>	195		
<b>Vicia</b> <i>Cracca</i>	485	<b>X</b> <i>anthium strumarium</i>	207
<i>dumetorum</i>	484		
<i>fascia</i>	486		
<i>sepium</i>	487	<b>Z</b> <i>annichellia palustris</i>	7
<b>Vinca</b> <i>minor</i>	133	<b>Zostera</b> <i>marina</i>	382
<b>Viola</b> <i>canina</i>	593		
<i>odorata</i>	592		

ERRATA

## ERRATA NOTABILIORA.

- P. 23. l. 27. *terminaribus* leg. *terminalibus*.  
 28. l. 6. *lanercolazo* dele, r.  
 34. l. 29. *bey* leg. *bey*.  
 57. l. 4. *infundibuliformis* leg. *infundibuliformia*.  
 67. l. 6. *granulo* leg. *granulo*.  
 97. l. 16. *reptaus* leg. *reptans*.  
 101. l. 10. *bifi* leg. *bafi*.  
 109. num. 584. leg. 384. et 486. leg. 386.  
 114. l. 27. *alibi* leg. *albi*. idem p. 117. lin. 16.  
 118. l. 4. *cillaris* leg. *ciliatis*.  
 135. l. 20. *perpafillus* leg. *perpasillus*.  
 168. l. 8. *albi* leg. *alibi*.  
 170. l. 20. *concolore* leg. *cancolore*.  
 174. l. 18. *tricoloro* leg. *tricolor*.  
       25. *calylice* leg. *calyce*.  
 178. l. 6. *striatro* leg. *striato*.  
 179. l. antepen. *planis* leg. *planis*.  
 184. l. 13. *caryphyllea* leg. *caryophyllea*.  
 208. l. 6. *furculis* leg. *furculis*.  
 221. l. 14. ad marg. *vivica* leg. *vivipara*.  
 216. l. 16. *aliis* leg. *alis*.  
 224. l. 10. *Hopnum* leg. *Hypnum*.  
 228. l. antep. *tamarisfei* leg. *tamarisfei*.  
 239. l. 14. *cum* leg. *cum*.  
 244. l. 16. *cinero* leg. *cinereo*.  
 245. et ultro loco *scutellis* leg. *scutellis*.  
 261. l. 17. *cicatrice* leg. *cicatrice*.  
 271. l. 13. loco p. 187. leg. p. 182. et  
       l. 14. pro t. 24. leg. t. 25.
-

ACQUISITION 1/1/75

1/1/75 1/1/75 1/1/75

1/1/75 1/1/75 1/1/75

1/1/75 1/1/75 1/1/75

1/1/75

1/1/75

1/1/75

1/1/75

1/1/75

1/1/75 1/1/75 1/1/75

















# INDEX.

<i>Veronica Raceabunga</i>	13	<i>Viola tricolor</i>	594
<i>Chamaedrys</i>	17	<i>Viscum album</i>	108
<i>officinalis</i>	11		
<i>scusellata</i>	15	<b>W</b>	
<i>serpyllifolia</i>	12	<i>ebera nutans</i>	856
<i>spicata</i>	10	<i>pomiformis</i>	857
<i>Teucrium</i>	16	<i>pyriformis</i>	855
<i>triphyllus</i>	20	<i>Weisia crispa</i>	736
<i>verna</i>	21	<i>recurvirostra</i>	735
<i>Viburnum Opulus</i>	195		
<i>Vicia Cracca</i>	485	<b>X</b>	
<i>dumetorum</i>	484	<i>anthium strumarium</i>	207
<i>fasia</i>	486		
<i>sepium</i>	487	<b>Z</b>	
<i>Vinca minor</i>	133	<i>annichellia palustris</i>	7
<i>Viola canina</i>	593	<i>Zostera marina</i>	382
<i>odorata</i>	592		

ERRATA

## ERRATA NOTABILIORA.

- P. 23.** l. 27. *terminaribus* leg. *terminalibus*.  
 28. l. 6. *lanercolato* dele, r.  
 34. l. 29. *bey* leg. *bey*.  
 57. l. 4. *infundibuliformis* leg. *infundibuliformia*.  
 67. l. 6. *granulo* leg. *granulo*.  
 97. l. 16. *reptaus* leg. *reptans*.  
 101. l. 10. *bifi* leg. *bafi*.  
 109. num. 584. leg. 384. et 486. leg. 386.  
 114. l. 27. *alibi* leg. *albi*. idem p. 117. lin. 16.  
 118. l. 4. *cillaris* leg. *ciliatis*.  
 135. l. 20. *perpafillus* leg. *perpafillus*.  
 168. l. 8. *albi* leg. *alibi*.  
 170. l. 20. *concolore* leg. *concolore*.  
 174. l. 18. *tricolor* leg. *tricolor*.  
       25. *calylice* leg. *calyce*.  
 178. l. 6. *striatro* leg. *striato*.  
 179. l. antepen. *planis* leg. *planis*.  
 184. l. 13. *caryphyllea* leg. *caryophyllea*.  
 208. l. 6. *furculis* leg. *furculis*.  
 221. l. 14. ad marg. *vivica* leg. *vivipara*.  
 216. l. 16. *aliis* leg. *alis*.  
 224. l. 10. *Hopnum* leg. *Hypnum*.  
 228. l. antep. *tamarisci* leg. *tamarisci*.  
 239. l. 14. *cum* leg. *cum*.  
 244. l. 16. *cinero* leg. *cinereo*.  
 245. et ultro loco *scutellis* leg. *scutellis*.  
 261. l. 17. *cicatrice* leg. *cicatrice*.  
 271. l. 13. loco p. 187. leg. p. 182. et  
       l. 14. pro t. 24. leg. t. 25.
-

# ACQUITTANCE

THE

OF

THE

OF

OF

OF

OF

OF

OF

OF

OF

OF

















